



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

F1  
485  
734  
S





3 2044 106 478 365

Fl  
48.5  
T34  
S



HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM

Received June 15, 1910







STOCKHOLMSTRAKTENS

297

**PHANEROGAMER OCH ORMBUNKAR,**

MED VÄXTSTÄLLEN FÖR DE SÄLLSYNTARE,

UPPTECKNADE

AF

**K. FR. THEDENIUS.**



**STOCKHOLM,**

TRYCKT HOS JOH. BECKMAN, 1850.

140  
to all. apt. Br.

# 24. 1  
STOCKHOLMSTRAKTENS

# PHANEROGAMER OCH ORMBUNKAR,

MED VÄXTSTÄLLEN FÖR DE SÄLLSYNTARE,

UPPTECKNADE

AF

*Knut Thedenius*

**K. FR. THEDENIUS.**



STOCKHOLM,

TRYCKT HOS JOH. BECKMAN, 1850.



15 June 1910  
Gray Herbarium  
Harvard University.

Några yngre botanister, som under flere år vistats i Stockholm och gjort utvandringar i dess granskap, samt derunder känt bristen på en förteckning öfver traktens växter, öfverenskommo under förledne året att uppsätta en sådan. Då likväl deruti endast kunde inflyta, utom det som redan var i tryck publiceradt, hvad dessa få personer hade sig bekant, men Stockholmstrakten i botaniskt syfte under sednare tider genomsoökt, ehuru oftast utan ömsesidigt meddelande, af ganska många botanister, så kunde denna förteckning icke blifva på långt när fullständig. Då den det oaktadt torde böra komma till fleres kännedom, för att efter hand kompletteras, och bidrag dertill redan blifvit benäget lemnade och finnas införde från många botanister, som gjort exkursioner omkring Stockholm, så hoppas utgifvaren att densamma icke skall ogera ses tryckt, äfven uti sitt nuvarande ofullständiga skick, serdeles om den kunde utgöra första uppräningen till en Exkursionsflora för Stockholmstrakten och möjligen lätta framtida utgifvandet af en sådan.

Enligt utgifvarens åsigt bör till Stockholmstrakten räknas: *Stockholms Stad, Svartlösa, Svartsjö* eller *Färentuna* och *Sollentuna Härad*, *Danderyds* och *Wärmdö Skeppslager*, samt af *Sotholms Härad* Pastoraterna *Tyresö, Öster- och Wester-Haninge*. Af detta sednare härad utslutas således Östmo och Sorunda Pastorater, såsom för långt aflägsnade från Stockholm, ehuru de måhända rättast borde få medfölja. En del öar, som höra till ofvan upptagne pastorater, äfvensom till *Wärmdö Skeppslag*, äro väl likaledes så långt aflägsne, att de icke kunna på kortare eller vanliga exkursioner uppnås, men det skulle vara ännu mera oegentligt att afskilja dem, serdeles som det

torde dröja länge innan de blifva upptagne af någon annan specialflora. Om utgifvarens ofvan yttrade åsigt antages, kommer Florans område att sträcka sig ungefär 2 mil åt norr och 3 mil åt de öfrige väderstrecken, några hafsöar oberäknade, hvilka ligga längre bort.

För att göra denna afhandling till sitt omfång så inskränkt som möjligt, har det varit nödvändigt att icke upptaga serdeles många localer för hvarje växt. Dervid hafva de växtställen som ligga uti Stockholms granskap först blifvit uppräknade, emedan de flesta exkursioner der företagas. Endast då inga närmare varit kända hafva aflägsnare localer blifvit anförda. En sådan partiskhet för hufvudstaden torde dock icke klandras.

Med afseende på växternas sällsynthet äro de indelade uti: *sällsynta* (r.), för hvilka blott ett eller annat växtställe varit bekant; *temligen sällsynta* (t. r.), för hvilka minst fyra varit kända, samt *flerestüdes förekommande* (flerst.); *temligen allmänna* (t. a.), och *allmänna* (a.).

Växter, som kunna anses fullkomligt vilda eller så localiserade, att de böra ständigt bibehålla sig qvar i trakten, äro försedde med ordningsnummer, hvilket deremot saknas för dem som äro planterade, tillfälligt förekommande eller förvildade, men med osäker varaktighet. Att några allmänt och på allmänna platser planterade träd och buskar blifvit upptagne i förteckningen torde hvarken kunna förvilla eller ogillas, då man besinnar att sådana växter bruka på exkursionerne insamlas, och att deras igenkännande ofta är allmännyttigt. Vid deras upptagande, äfvensom vid hela växtförteckningens uppställande, har femte upplagan af Hartmans Flora blifvit följd, emedan denna lärobok allmänt begagnas på exkursionerne.

Sluteligen anser sig Utg. böra nämna, att han hos sina vänner Acad. Docenten Mag. N. J. Andersson, Läraren vid Stockholms Lycæum J. A. Holmström, Med. Phil. Candidaten C. F. Nyman och Adjuncten Doct. C. M. Nyman, hvilka tillsammans med honom uppsatte den första växtkatalogen, står i den största förbindelse för de rikhaltiga och outhärliga upplysningar han erhållit; äfvensom att viktiga tillägg oförbehållsamt lemnats af följande Herrar, som interessera sig för Stockholmsflorans

bearbetande, neml. Professorn och Ridd. Doct. P. F. Wahlberg, Professorn Doct. J. E. Wikström, Rådsmannen Mag. P. J. Beurling, Philos. Magistern J. A. Afzelius, Med. Doct. P. H. F. Græve, Philos. Mag. C. Lagerheim, Kongl. Secreteraren N. O. Lagerheim, Commministern Mag. P. A. Ruus, Philos. Magistern J. E. Wahlström, samt Herrar Studerande F. J. Björnström, J. V. Björnström, E. Cederstråhle, C. J. R. Elgenstierna, R. F. Fristedt, A. Jansson, C. A. Lindroth, C. C. Ljunggren, R. Rubenson, S. M. Rubenson, J. T. Ruus, G. L. Sjögren, G. Westberg, G. Westfelt, och E. J. Öhrman.

I öfrigt har Utg. begagnat flera tryckta skrifter, som innehålla uppsatser öfver Stockholmstraktens vegetation, hvaribland främst böra nämnas Professor Wikströms »*Stockholms Flora*», Magister Lindebergs »*Synopsis Plantarum Vascularium in regione Mæleri orientali-boreali sponte crescentium*», Magister Lundeqvists »*Flora Paroeciæ Brännkyrka*» och Adjuncten Schlagerströms »*Conspectus Vegetationis Uplandicæ*». Om några hithörande växtgeografiska tillägg ytterligare meddelas Utg. skola de tacksamt emottagas och omsorgsfullt antecknas.

## I. DICOTYLEDONEAE.

### I. Corolliflorae.

#### 1. Seminiflorae.

##### 1. *Synanthereae* Rich.

##### 1. *Bidens tripartita* L. a.

β minor: t. a.

##### 2. — *cernua* L. flerst. t. ex. vid Clarasjö, Carlberg, Djurgårdens stränder och Brännkyrksjön m. fl. st. γ minima: vid Årstaviken och Tranebergs bro.

##### 3. *Chrysanthemum segetum* L. t. r. vid stora Varfvet, Fredrikshof, Bellevue, Vinterviken, Ekensberg (Sjögren), Haga (Lagerheim \*), Ulriksdal (Cederstråhle) och flerst. på Wärmön.

\*) Herrarne N. och C. Lagerheim hafva vanligtvis gjort sina botaniska Exkursioner gemensamt.

4. *Chrysanthemum Leucanthemum* L. a.
5. — *Parthenium* Pers. förvildad flerst. t. ex. vid Blecktornet, Barnängen, Bellevue, Friesens park.
6. *Matricaria Chamomilla* L. a.
7. *Tripleurospermum inodorum* Sch. a.
8. *Anthemis tinctoria* L. flerst. t. ex. på Observatorii-backen; vid Carlberg, Marieberg, Kaknäs och Nacka badställe.  
     *β pallida*: vid Åkeshof i Bromma.
9. — *arvensis* L. flerst. serdeles i Nackatrakten och på Svartsjölandet.  
     *β agrestis*: med föregående.
10. — *Cotula* L. r. vid Dalarön (Wahlström) och på Svartsjölandet.
11. *Achillea Ptarmica* L. flerst. t. ex. vid Rosendal, Lindingöbro och på södra Mälarestränderna.
12. — *Millefolium* L. a.  
     *δ setacea*: på Björkön och Adelsön.
13. *Tanacetum vulgare* L. flerst. t. ex. vid Norrbacka, Bellevue, Manilla, Nacka och Ulriksdal.
14. *Artemisia Absinthium* L. t. a.
15. — *vulgaris* L. a.
16. — *campestris* L. flerst. t. ex. vid Skanstull, Bellevue, Norrtullsvägen, Djurgårdsslätten, Ålkistan, Stockby m. fl. st.  
     *Senecio sarracenicus* L. förvildad vid Rosendal, Traneberg och Trångsund nära Drefviken.
17. — *Jacobaea* L. t. r. vid Kungsbroviken på St. Sicklagor; vid Örnberg, Ulriksdal, Klingsta vid Edsviken och Näsby i Botkyrka (Westfelt).
18. — *viscosus* L. t. r. vid Veterin. Inrättningen, och Carlbergs alléen (Sjögren); på Valdemars-udden och Kungshatt, samt vid Farsta på Wärmdön.
19. — *sylvaticus* L. flerst. t. ex. vid Haga, Listonhill, Bromma Kyrka och Bergholm, samt på Roslagstulls bergen.
20. — *vulgaris* L. a.
21. *Gnaphalium uliginosum* L. t. a.
22. — *sylvaticum* L. t. a.
23. *Antennaria dioica* Gärttn. a.  
     *γ corymbosa*: t. a.

24. *Filago montana* L. a.  
*Inula Helenium* L. förvildad vid Djurgårdsbrunn.
25. — *salicina* L. t. r. i Rörstrandshage; på Hund-  
 udden; vid Nacka badställe, Cathrinelund på  
 Lidingön (Westberg), Rastaborg på Ekerön,  
 i Färentuna sn och vid Farsta på Wärmdön  
 (Lagerheim).
26. *Bellis perennis* L. r. vid Svindensvik och på Kersön.
27. *Aster Tripolium* L. t. a. på hafsstränderne.
28. *Erigeron acris* L. t. a.
29. *Solidago Virgaurea* L. a.  
*β littoralis*: på Muskön (Wahlström).
30. *Eupatorium cannabinum* L. r. på öar i Görväln.
31. *Petasites officinalis* Mönch: r. vid Sabbatsberg, Drott-  
 ningholm, Wårby och Östansund på Munsön.
32. *Tussilago Farfara* L. t. a.
33. *Centaurea Scabiosa* L. flerst. t. ex. på Observatorii-  
 backen; vid Skanstull, Frösunda, Råstasjön,  
 Anneberg, Ulriksdal m. fl. st.
34. — *Jacea* L. a.
35. — *Cyanus* L. a.
36. *Serratula tinctoria* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, Ek-  
 hagssjön, på Räkniugholmen; vid Pungpinan,  
 Nacka, Nockebybro m. fl. st.
37. *Carlina vulgaris* L. t. a.
38. *Onopordon Acanthium* L. flerst. t. ex. vid Barnängen,  
 Blecktornet och Skanstull; på Observatorii-  
 backen, Beckholmen etc.
39. *Carduus crispus* L. a.
40. *Cirsium lanceolatum* Scop. a.
41. — *palustre* Scop. a.
42. — *arvense* Scop. a.  
*β ferox*: flerst. t. ex. på Beckholmen.
43. — *heterophyllum* All. flerst. t. ex. vid Blecktornet,  
 Sandsborg, Enskede, Pungpinan, Haga, Experi-  
 mentalfältet, Järfva och Ulriksdal.
44. *Lappa tomentosa* Lam. a.
45. — *major* Gärtn. flerst. t. ex. på nya Kyrkogården;  
 vid Carlberg, Manilla, Skytteholm på Ekerön  
 och på Färingön.

46. *Lappa minor* DC. t. a.  
     *β majuscula*: a.
47. *Cichorium Intybus* L. r. vid Experimentalfältet, Carlberg (R. Rubenson), Bromma Klockarebo-ställe och Dufnäs (Lindroth).
48. *Sonchus arvensis* L. a.  
     *β littoralis*: på holmar i Skärgården.
49. — *oleraceus* L. a.
50. — *asper* Vill. t. a.
51. *Lactuca muralis* Don. t. a.
52. *Lapsana communis* L. a.
53. *Tragopogon pratensis* L. a.
54. *Scorzonera humilis* L. t. r. vid Gångsätra, Tjustvik på Wärmdön, Farsta, Ahlby, Elfsta och Hamra i Botkyrka (Westfelt), på Svartsjölandet, samt på Muskön (Wahlström).  
     — *hispanica* L. vid Ulriksdal och Svartsjö, samt vid Farsta å Wärmdön (Lagerheim).
55. *Crepis biennis* L. r. i Sollentuna t. ex. Svartinge äng.
56. — *nicæensis* Balb. r. mellan Gröndal och Ormsjön.
57. — *tectorum* L. a.
58. — *præmorsa* Tausch: flerst. t. ex. vid Carlberg, Djurgårdsbrunn, Årsta, Nacka, Ulfunda.
59. *Hieracium Pilosella* L. a.  
     \* *stoloniflorum* Kit. r. vid Carlbergs alléen (Græve).
60. — *Auricula* L. a.
61. — *pratense* Tausch: r. vid Hilleshög och Edby på Svartsjölandet.
62. — *fallax* W. t. a.
63. — *Nestleri* Vill. flerst. t. ex. i Nackatrakten och på Wärmdön.
64. — *Schmidtii* Tausch: r. vid Barnängen.
65. — *saxifragum* Fr. flerst. t. ex. vid Barnängen, Bergsund; på Djurgårds- och Kungsholmsbergen.
66. — *murorum* L. a.  
     *β sylvaticum*: t. a.
67. — *cæsius* Fr. flerst. t. ex. på Observatoriibacken och vid Haga.
68. — *vulgatum* Fr. a.



69. *Hieracium norvegicum* Fr. r. på Djurgårdsbergen.  
 70. — *rigidum* Hn. flerst. t. ex. på Djurgården; vid Haga, Roslagstull och i Liljeholmstrakten.  
 71. — *umbellatum* L. a.  
 72. *Taraxacum officinale* Wigg. a.  
     \* *corniculatum* Kit. flerst. t. ex. vid Danvikskrokar och på Svartsjölandet.  
     \* *palustre* Sm. r. i en sank äng vid Mörby i Skå Socken (Westberg).  
 73. *Leontodon hastilis* L. r. i Wester-Haninge.  
 74. — *autumnalis* L. a.  
 75. *Hypochaeris maculata* L. a.

## 2. *Dipsaceae* Juss.

76. *Trichera arvensis* Schrad. a.  
 77. *Succisa pratensis* Mönch: a.  
 78. *Scabiosa Columbaria* L. r. på öarne omkring Dalarön.

## 3. *Valerianeae* Fr.

79. *Viburnum Opulus* L. flerst. t. ex. vid Haga, Marieberg; på Skeppsholmen, St. Hessingen och på Sicklaön; vid Djurgårdsbrunn o. s. v.  
 80. *Sambucus nigra* L. flerst. t. ex. vid Sirishof, Rosendal, Haga, Dockan, Fogelsången och Ulfunda.  
     — *racemosa* L. vid Söderbrunn och på Experimentalfältet.  
     — *Ebulus* L. i Carlbergs Djurgård (R. Rubenson).  
 81. *Valeriana officinalis* L. t. a.  
     β *angustifolia*: flerst. t. ex. på Hästholmen.  
 82. *Valerianella olitoria* Mönch; flerst. t. ex. på södra delen af Djurgården, Smedsudden, Räkningholmen och vid Carlberg.

## 4. *Rubiaceae* Juss.

83. *Asperula tinctoria* L. r. i Olofsdals egendom vid Norrtullsgatan och på Wäntholmen.  
 84. — *odorata* L. t. r. vid Rosendal, Nyckelviken, Skarpneck, Skrubba, st. Björknäs och Tjustvik.

85. *Galium boreale* L. a.  
 86. — *trifidum* L. flerst. t. ex. vid Carlbergs och Hammarby sjöar, vid småsjöarne i Fogelsångstrakten och på Lidingön, vid Råsta sjö o. s. v.  
 87. — *palustre* L. a.  
 88. — *uliginosum* L. a.  
 89. — *Mollugo* L. flerst. t. ex. i Djurgårdsbrunnstrakten, vid Danviksbergen och Nacka.  
     *β ochroleucum*: vid Danvikskrokar.  
 90. — *verum* L. a.  
     *β albidum*: vid Danvikskrokar.  
 91. — *Aparine* L. flerst. t. ex. på Svartsjölandet.  
     \* *infestum* Kit. a.  
     \* *spurium* L. flerst. t. ex. på Björkön och vid Harfva i Eds socken.

## 5. *Loranthaceae* Don.

92. *Viscum album* L. r. på Ellgarn och Ådö.

## 6. *Caprifoliaceae* Juss.

93. *Lonicera Xylosteum* L. t. a.  
     — *Periclymenum* L. förvildad vid Ulfsunda.  
 94. *Linnæa borealis* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, Haga, Nacka, Dufnäs, Skrubba, Stockby och på Lidingön.

## 2. *Annuliflorae*.

## 7. *Campanulaceae* Juss.

95. *Campanula Cervicaria* L. r. mellan Söderby och Skarpneck (Elgenstierna och Öhrman) och vid Eknäs på Wärmdön. Uppgifves äfven för Solberga, Årsta, Orem och Stortorp.  
 96. — *glomerata* L. flerst. t. ex. vid Carlberg och Haga, i Grindshage, samt Blommensbergs och Brännkyrkstrakten.  
 97. — *Trachelium* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, Haga, i Friesens park, samt på Sicklanäset, Lilje- och Räkningholmen.

98. *Campanula latifolia* L. t. r. på Sicklanäset och Blockhus-udden; vid Ulriksdal, Stortorp, Bockholms-Sätra och Svartsjö.
99. — *rapunculoides* L. flerst. t. ex. vid Rörstrand, Hornsberg, Bellevue, Barnängen, Djurgårdsbrunn och Walla.
100. — *patula* L. flerst. t. ex. vid Djurgårdsbrunn, Järla, Skanstull, Winterviken, Ingenting och Solna.
101. — *persicifolia* L. a.
102. — *rotundifolia* L. a.
103. *Jasione montana* L. t. a.

### 8. *Lobeliaceae* Juss.

104. *Lobelia Dortmanna* L. flerst. t. ex. vid Mälarestränderne ss. vid Marieberg, Traneberg, Winterviken; i Trekanten, Hammarbysjö, Järlasjön, Flaten och Drefviken.

### 9. *Convolvulaceae* Juss.

105. *Convolvulus arvensis* L. flerst. t. ex. vid Skogsinstitutet, Carlberg, Löfholmen etc.
106. — *sepium* L. r. i Carlbergs och Haga parker; vid Söderby (Elgenstierna), Högtorps fiskeläge i Salems sn samt på Svartsjölandet.
107. *Cuscuta europæa* L. flerst. t. ex. vid Rörstrand, Liljeholmen, Winterviken, Ulfunda, Kaknäs, Mölna och Sätra i Brännkyrka.
108. — *Epilinum* Weih. r. vid gårdar bortom Öfver-Järfva.

### 10. *Boragineae* Juss.

109. *Symphytum officinale* L. t. r. vid Sabbatsberg, Hammarbysjö (nära Skanstull), Sundbyberg, Öhr (Fristedt), Stockby i Danderyd och Stortorp (Elgenstierna).
110. — *orientale* L. r. vid Löfsta i Eds socken.
111. *Anchusa officinalis* L. a.

112. *Lycopsis arvensis* L. t. a.  
 113. *Myosotis palustris* L.  $\alpha$ . *scorpioides*: flerst. t. ex. vid Haga och Gångsätra.  
      $\beta$  *laxiflora*: upptages enl. Prof. Wikströms Flora, men utg. känner intet växtställe för denna form.  
      $\gamma$  *strigulosa*: a.  
 114. — *cæspitosa* Schultz: t. a.  
 115. — *arvensis* Hoffm. a.  
 116. — *hispida* Schlecht. a.  
 117. — *stricta* Link: a.  
 118. *Lithospermum officinale* L. t. r. på Djurgårdens östra strand; på Fjäderholmarne, Kranholmen, öarne i Görväln och vid Runsaborg i Eds s:n.  
 119. — *arvense* L. a.  
      $\beta$  *coeruleum*: r. på nya Kyrkogården.  
 120. *Pulmonaria officinalis* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, på stora och lilla Essingen, vid Blommensberg, Fogelsången, Ryssviken, Gäddviken och Fiskartorpet.  
 121. *Echium vulgare* L. flerst. t. ex. på Observatorienbacken, Generalsbacken och Fogelsångsbergen; vid Skanstull, Djurgårdsbrunn och Nacka.  
 122. *Cynoglossum officinale* L. a.  
 123. *Echinosperrum Lappula* Lehm. t. r. vid Skanstull, Cedersdal och Ulriksdal; flerst. uti Brännkyrka och Botkyrka sr samt på Svartsjölandet.  
 124. *Asperugo procumbens* L. a.

## 11. *Labiatae* Juss.

- Elsholtzia cristata* W. förvildad i Trädgårdsföreningens trädgård och på Waldemarsudden.  
 125. *Mentha aquatica* L. r. vid Trekanten, Ekholmsnäs (Westberg), och Flaten (Öhrman).  
 126. — *arvensis* L. a.  
      $\beta$  *glabrata*: vid Sundby på Svartsjölandet.  
 127. *Lycopus europæus* L. t. a.  
 128. *Origanum vulgare* L. t. a.  
 129. *Thymus Serpyllum* L. a.  
 130. *Calamintha Acinos* Clairv. a.

131. *Clinopodium vulgare* L. a.  
 132. *Scutellaria galericulata* L. a.  
 133. — *hastifolia* L. t. r. på st. Wasaholmen, Kranholmen och fl. holmar i Mälaren; vid Vinterviken (Prof. Wahlberg), Wällinge qvarnar, Kumla och Säby; på Svartsjölandet; på Hästholmen, Tranholmen, m. fl. holmar i Wärtan, samt vid Skärvik, Farsta (Lagerheim) och Aspvik på Wärmdön.  
 134. *Prunella vulgaris* L. a.  
     *β parviflora*: flerst.  
 135. *Nepeta Cataria* L. t. r. i strandendomar vid Clarsjö (Græve), vid Rosendal, Blockhusudden, Sandsborg och Aspvik; på st. Hessingen och Svartsjölandet.  
 136. *Glechoma hederacea* L. a.  
     *β grandiflora*: t. a.  
     *Dracocephalum thymiflorum* L. förvildad vid Carolinska Institutet, och Veterinärinrättningen, på Observatoriibacken, i Bergianska Trädg. och vid Ulriksdal.  
 137. *Ballota foetida* Lam. r. på Kastellholmen.  
 138. — *ruderalis* Sv. r. vid Norrtullsgatan, i Carlbergs alléen och vid Ulfunda (Afzelius).  
 139. *Leonurus Cardiaea* L. flerst. t. ex. på Kastellholmen, vid st. Varfvet, Skanstull, nya vägen, Johannis Kyrka och Råsta.  
 140. *Stachys sylvatica* L. t. a.  
 141. — *palustris* L. a.  
     *β agrestis*: flerst. t. ex. vid Källhagen, Walla.  
 142. *Lamium album* L. a.  
 143. — *purpureum* L. a.  
     \* *incisum* W. r. på Hembergsgärde, vid Stallmästaregården, Sundsta och på Sicklaön.  
 144. — *intermedium* Fr. r. på Ellgarn.  
 145. — *amplexicaule* L. a.  
 146. *Galeopsis Ladanum* L. flerst. t. ex. vid Carlbergs alléen, Solna, Gröndal och Nacka.  
 147. — *Tetrahit* L. a.  
     *β pallens*: t. a.

148. *Galeopsis versicolor* Curt. a.  
 149. *Marrubium vulgare* L. t. r. vid Malmvik på Lofön, Wärmdö prästgård, samt flerst. i Botkyrka och på Svartsjölandet, t. ex. vid Husby på Munsön (Lagerheim).  
 150. *Ajuga pyramidalis* L. t. a.

### 12. *Menyantheae* Mart.

151. *Menyanthes trifoliata* L. a.

### *Polemoniaceae* Juss.

*Polemonium coeruleum* L. r. i Friesens och Carlbergs park.

## 3. *Tubiflorae*.

### 13. *Oleineae* Link.

*Syringa vulgaris* L. på Generalsbacken och i Haga park.  
*Ligustrum vulgare* L. på Generalsbacken, vid Bellevue, Haga, och nedanför Byströms villa.

152. *Fraxinus excelsior* L. t. a.

### 14. *Contortae* Lin.

153. *Cynanchum Vincetoxicum* Br. t. a.

### 15. *Gentianeae* Juss.

154. *Gentiana campestris* L. flerst. t. ex. vid Fredriksdal, i Grindshage, på Djurgården, vid Marieberg och Blommensberg.  
 155. — *Amarella* L. flerst. t. ex. vid Mörby i Danderyd, Yttringe på Lidingön och på Svartsjölandet.  
 156. — *lingulata* Ag. flerst. t. ex. på Djurgårdens storäng och Mörtviksängen; vid Ulsunda, Öhr och Ellenhill.  
 157. *Erythraea linariifolia* Pers. flerst. t. ex. på Fjäderholmarne, Råholmen och Tranholmen; på Edsvikens och Hustegafjärdens stränder.

158. *Erythræa pulchella* Fr.  $\alpha$  et  $\beta$ . flerst. t. ex. på Blockhus-uddén, Fjäderholmarne m. fl. holmar i Wärtan; vid Ålkistan, Stockby, Mörby och Klingsta.

## 16. *Solanaceae* Juss.

159. *Solanum Dulcamara* L. t. a.  
 160. — *nigrum* L. a.  
       \* *humile* Bernh. i en egendom vid Observatoriibacken och vid Säby i Sänga.  
 161. *Hyoscyamus niger* L. a.

## 17. *Personatae* L.

162. *Verbascum Thapsus* L. t. a.  
        $\beta$  *bracteatum*: tagen af Biskop Agardh vid Ålkistan, men på sednare tiden derstädes förgäfvés sökt.  
       — *phlomisoides* L. r. vid Carolinska institutet, Fiskartorpet och på Djurgårdsslätten.  
 163. — *nigrum* L. t. a.  
 164. — *Lychnitis* L.  $\beta$  *album*: r. vid Skarpneck och Tallkrogen (Elgenstierna).  
 165. — *thapso-nigrum* Schied. r. vid Nockebybro.  
 166. *Scrophularia nodosa* L. a.  
 167. — *vernalis* L. t. r. vid Barnängen, i Carlbergs alléen, på Valdemarsudden, vid Ingenting, Christineberg och Ulriksdal.  
       *Antirrhinum Orontium* L. r. vid Fogelsången och Drefviken.  
 168. *Linaria vulgaris* Mill. flerst. t. ex. på Observatoriibacken, vid Norrtull, i Friesens park m. fl. st  
        $\beta$  *Peloria*: r. på Fläsklösan i Mälaren.  
 169. — *minor* Mill. flerst. t. ex. på Norrbro, Kongl. Slottet; i Carthagobacke på Kungsholmen, vid Bergsund, Norrtull, Ulriksdal, Ulfunda, och Drottningholm.



170. *Veronica longifolia* L. r. vid Stortorp i Brännkyrka (Elgenstierna).  
 \* *maritima* L. r. på ön Danmark, på Ekholmen i Wärmdö s:n (Öhrman), på Muskön (Wahlström) och på flere holmar under Ö. Haninge s:n.
171. — *spicata* L. t. a.  
 \* *hybrida* L. r. på Fläsklösan, Råholmen i Wärtan och Svartsjölandet.
172. — *serpyllifolia* L. a.
173. — *officinalis* L. a.
174. — *Chamædrys* L. a.
175. — *Beccabunga* L. t. a.
176. — *Anagallis* L. flerst. t. ex. vid Källhagen, Djurgårdsbrunn, Ryssviken och Carlberg.
177. — *scutellata* L. t. a.  
 β *villosa*: t. a.
178. — *arvensis* L. a.
179. — *verna* L. a.
180. — *hederifolia* L. flerst. t. ex. på Djurgårdsslättan, vid Rörstrand, Cedersdal, Bergshammar, st. Sickla, Ulfunda och på Räkningholmen.
181. — *Buxbaumii* Ten. r. vid Carolinska institutet; i trädgårdar på Kungsholmen och i Carlbergs alléen.
182. — *agrestis* L. a.
183. — *opaca* Fr. r. i Trädgårdar på Norrmalm; vid Carlberg och Ingenting.
184. *Limosella aquatica* L. flerst. t. ex. vid Kastellholmen, Källhagen, Carlberg, Vinterviken, Fiskartorpet; på Blockhusudden och vid Lidingö kyrkvik.  
 β *borealis*: vid Kastellholmen (Gräve).
185. *Odontites rubra* Pers. flerst. t. ex. på Experimentalfältet, vid Rålambshof, Skarpneck, på Lidingön och i Bromma.
186. *Euphrasia officinalis* L. a.
187. — *gracilis* Fr. flerst. t. ex. på Sundsta- och Vinterviksbergen; vid Söderby och på Svartsjölandet.
188. *Rhinanthus major* Ehrh. a.
189. — *minor* Ehrh. a.

190. *Sceptrum Carolinum* Rudb. r. vid Ensta gästgivar-  
gård i Täby s:n.
191. *Pedicularis palustris* L. a.
192. *Melampyrum cristatum* L. t. r. vid Gångsätra; på  
stora Vasaholmen i Mälaren, mellan Hud-  
dinge prästgård och Glömsta (Ljunggren);  
vid Edby och flerst. på Svartsjölandet.
193. — *arvense* L. t. r. vid Dufvebohl (Fristedt),  
Lidingö kyrka, Ösby, Rösjön i Sollentuna (Ce-  
dersträhle), Wärmdö kyrka, på Muskön  
(Wahlström) och på Svartsjölandet.
194. — *nemorosum* L. t. a.
195. — *pratense* L. a.
196. — *sylvaticum* L. t. a.
197. *Lathræa Squamaria* L. t. r. vid Carlberg, Haga, Blom-  
mensberg, Helfveteshålan på Sicklaö (West-  
felt), Lillsickla, Örby, Orem, Farsta, Skrubba  
och Sandvik i Jerfälla.

### 18. *Lentibulariaceae* Rich.

198. *Utricularia vulgaris* L. t. a.
199. — *intermedia* Hayne: flerst. t. ex. i Ormsjön,  
Isbladskärret, Sqvalten, Råstasjön och Dref-  
viken; vid Stubbsund, Orem och på Svartsjö-  
landet.
200. — *minor* L. flerst. t. ex. vid Blommensbergs-  
Långsjö, Ekhagssjön, Råstasjön, Oremsviken,  
Skuggan, Stubbsund; i Isblads- och Dufve-  
bohlskärren.
201. *Pinguicula vulgaris* L. flerst. t. ex. vid Långgården  
utom Skanstull, Tallkrogen, Pungpinan, Skrub-  
ba, Ormsjön, Ekhagssjön, Råstasjön, Bromma  
Kyrksjö m. fl. st.

### 19. *Primulaceae* L.

202. *Trientalis europæa* L. t. a.
203. *Lysimachia vulgaris* L. a.
204. — *Numularia* L. r. i en äng vid Rålambshof.

205. *Naumburgia thyrsiflora* Reich. t. a.  
 206. *Anagallis arvensis* L. r. vid Örby och Sköndalsbro.  
 207. *Glaux maritima* L. t. a. på hafsstränderne.  
 208. *Samolus Valerandi* L. r. vid Ekholmsnäs (Westberg) och på Wärmdön mellan Bo Capell och Stäkesundet, samt på Solön (Öhrman).  
 209. *Primula veris* L. a.  
 210. — *farinosa* L. flerst. t. ex. vid Djurgårdsbrunn, Kaknäs, Experimentalfältet, Ekhags- och Råstasjöar, Ingenting och Tallkrogen.  
 211. *Androsace septentrionalis* L. r. vid Hilleshög på Svartsjölandet; tagen för 50 år sedan på sandbacken vid Norrtull, men nu utgången der.  
 212. *Hottonia palustris* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, Solna, Hammarbysjö, Brännkyrksjön m. fl. st.

## 20. *Plantagineae* Juss.

213. *Plantago major* L. a.  
     *β scopulorum*: på Blockhusudden, på strandklippor i Grindshage och på en holme i Farstaviken på Wärmdön (Lagerheim).  
 214. — *media* L. a.  
 215. — *lanceolata* L. a.  
 216. — *maritima* L. flerst. t. ex. vid Skuggan; på Edsvikens stränder vid Ulriksdal och Stocksund; på stränderna af Wärtan, Lidingön och Wärmdön.  
 217. *Littorella lacustris* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, Marienberg, Traneberg och Vinterviken; vid Flaten och Drevviken.

## 21. *Plumbagineae* Juss.

218. *Armeria elongata* Koch: flerst. t. ex. på Skeppsholmen, Roslagstullsbergen och Hästholmen; vid Dockan, Hammarby, Frösunda och Bergshammar.

## II. Thalamiflorae.

### 4. Disciflorae.

#### 22. *Frangulaceae* Endl.

219. *Rhamnus cathartica* L. flerst. t. ex. vid Djurgårds-  
slätten, Valdemarsudden, Rörstrand, Carlberg,  
Haga, Marieberg m. fl. st.  
220. — *Frangula* L. t. a.

#### 23. *Corneae* DC.

221. *Cornus suecica* L. r. vid Mellangårdsträsket på  
Nämndön, på Maskön (Wahlström) och  
på Utön.

#### 24. *Araliaceae* Juss.

222. *Hedera Helix* L. r. vid Högtorp och på Korpeber-  
get vid Wiksberg i Salems sn samt »på ett  
berg vid Erstavik».

#### 25. *Umbelliferae* Juss.

223. *Cotium maculatum* L. flerst. t. ex. vid Rosendal,  
Djurgårdsbrunn, Stora Sickla, Marieberg, Rör-  
strand, Ulfunda m. fl. st.  
*Myrrhis odorata* Scop. förvildad flerst. t. ex. vid Fram-  
näs, Barnängen, Nacka, Järla och Fiskartorpet.  
224. *Cherophyllum temulum* L. r. i Friesens Park (El-  
genstierna).  
225. *Cerfolium sativum* Bess. r. i Hembergs gårde nära  
Norrtull och i Biskopsuddens äng.  
226. — *sylvestre* Bess. a.  
227. *Torilis Anthriscus* Gmel. flerst. t. ex. på Djurgårds-  
slätten, vid Carlbergs allén, Frescati, Berghs-  
hammar, Ulfunda, Danvikskrokar och på  
Svartsjölandet.  
228. *Daucus Carota* L. r. vid Djurgårdskanalen (Professor  
Wahlberg), Fiskartorpet, Ulfunda, Söder-  
garn och på Svartsjölandet.

229. *Laserpitium latifolium* L. flerst. t. ex. vid Ingenting, Haga, Mörtviken, Ekshagen, Ulfunda och Gångsätra.
230. *Heracleum sibiricum* L. t. a.  
     *β angustifolium*: t. a.  
     \* *australe*: på Färingön.
231. *Pastinaca sativa* L. flerst. t. ex. vid Blåporten, i Friesens park, vid Djurgårdsbrunn, Bergsund, Långholmen och Ålkistan.  
*Anethum graveolens* L. flerst. sjelfsådd i trädgårdar och plantager.  
*Levisticum officinale* Koch: förvildad vid Ekensberg.
232. *Angelica sylvestris* L. flerst. t. ex. vid Rosendal, Djurgårdens östra strand, på Smedsudden och Liljeholmen.  
     *β major*: vid Djurgårdens stränder.
233. *Angelica littoralis* Fr. r. på östra stranden af Djurgården.
234. *Peucedanum palustre* Mönch: t. a.
235. *Selinum Carvifolia* L. flerst. t. ex. vid Marieberg, Ekensberg, Bergholm, Söderby, Skuru, Skär-  
     sätra, Mölna och på öarne i Wärtan.
236. *Libanotis montana* All. flerst. t. ex. vid Dockan, Nacka, Blommensberg, Ulfunda, Huddinge prästgård, Ågesta, Balingsta och Aspvik på Wärmdön.
237. *Æthusa Cynapium* L. a.
238. *Oenanthe Phellandrium* Lam. flerst. t. ex. uti Hammarbysjö, Nacka Damsjö och Mörtviken; vid Ingenting, Ulfunda och Järfva.
239. *Cicuta virosa* L. t. a.
240. *Ægopodium Podagraria* L. t. a.
241. *Carum Carvi* L. a.
242. *Pimpinella Saxifraga* L. a.  
     *β dissecta*: t. a.
243. *Sium latifolium* L. a.
244. *Sanicula europæa* L. flerst. t. ex. på Djurgårdsslätten; mellan Experimentalfältet och lilla Wärtan; i Mörtviksängen; vid Nacka, Ahlby, Bränn-  
     • kyrks-Sätra och Skrubba.

**26. Adoxeae** E. Mey.

245. *Adoxa Moschatellina* L. flerst. t. ex. vid Djurgårdsslätten, Rosendal, Carlberg, Haga, och særdeles ymnig på höjderna omkring Uggleviken.

**27. Acerineae** DC.

246. *Acer platanoides* L. a.  
 — *Pseudoplatanus* L. planterad flerst. t. ex. på Djurgården, Kungsholmen, vid Kirsteinska-  
 huset m. fl. st.  
*Æsculus Hippocastanum* L. allmänt planterad.

**Resedaceae** DC.

- Reseda Luteola* L. r. förvildad vid Marieberg, Ellen-  
 hill och Danviken.  
 — *lutea* L. r. på Ballastplatsen i Stadsgården  
 (Græve).

**5. Sertiflorae.****28. Nymphaeaceae** DC.

247. *Nymphaea alba* L. a.  
       *γ biradiata* Som. i Törnbyviken och flerstädes på Svartsjölandet.  
 248. *Nuphar luteum* Sm. a.

**29. Ranunculaceae** Juss.

249. *Ranunculus Lingua* L. flerst. t. ex. i Hammarbysjö, Järlasjön, Rörstrandssjön, Ekhagssjön och Brännkyrksjön.  
 250. — *Flammula* L. a.  
       *β intermedia*: a.  
       *γ reptans*: t. a.  
 251. — *bulbosus* L. a.  
 252. — *polyanthemus* L. flerst. t. ex. vid Haga, Bellevue, Marieberg, Ulfunda, Svindensvik, Ulriksdal, Skuru och Rydboholm.  
 253. — *repens* L. a.  
 254. — *sceleratus* L. a.  
 255. — *acris* L. a.  
 256. — *auricomus* L. a.

- Ranunculus illyricus* L. förvildad i en trädgård nära Ulriksdal.
257. — *arvensis* L. r. vid Södergarn på Lidingön.
258. *Batrachium marinum* Fr. flerst. t. ex. i lilla Wärtan, samt vid Lidingöns och Wärmdöns stränder.
259. — *circinatum* Fr. flerst. t. ex. i Norrström, Hammarbysjö, Trekanten och på Wärmdön.
260. — *aquatile* Wimm. \* *heterophyllum* Fr. a.  
 \* *crassicaule* Fr. t. a.  
 \* *pantothrix* DC. a.  
 \* *paucistamineum* Tausch: t. a.  
 \* *pellatum* Fr. flerst. t. ex. i Norrström och i sunden närmast staden.
261. *Ficaria ranunculoides* Mönch: t. a.
262. *Myosurus minimus* L. t. a.
263. *Thalictrum flavum* L. t. a.
264. — *simplex* L. flerst. t. ex. vid Djurgårdskanalen, Skuru, Gångsätra, Skärsätra, Mörtviken och vid Pungpinan.
265. *Anemone nemorosa* L. a.
266. — *ranunculoides* L. t. r. vid Brännkyrks-Sätra och Wällinge; på en holme vid Rastaborg på Svartsjölandet, samt i Ulriksdals- och Svartsjö parker.
267. — *Hepatica* L. a.
268. *Pulsatilla vulgaris* Mill. flerst. t. ex. vid Ulriksdal, Järfva, Södergarn, Bromma och Ekerö kyrkor; på Fantholmen och Caninholmen; vid st. Björknäs på Wärmdön; vid Jerfälla kyrka och Rotebro.
269. *Caltha palustris* L. a.
270. *Trollius europæus* L. r. vid Årsta och Kersby.
271. *Aquilegia vulgaris* L. flerst. t. ex. i Friesens park; vid Carlberg, Haga, Marieberg, Blommensberg, Ulfunda, Ulriksdal, Svindensvik och Nacka.
272. *Aconitum Napellus* L. r. i Carlbergs park.  
 — *Cammarmum* L. förvildad flerst. t. ex. på Djurgården, vid Carlberg, Haga och Drottningholm.
273. *Delphinium Consolida* L. flerst. t. ex. vid st. Sickla, Blommensberg och Ulfunda.



274. *Actæa spicata* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, Haga, lilla Sickla, Naacka, Kaknäs och Skärholm.

### 30. *Berberideae* Juss.

275. *Berberis vulgaris* L. t. a.

### 31. *Papaveraceae* Juss.

276. *Papaver Argemone* L. flerst. t. ex. på Observatoriibacken; vid Skanstull, Stor-Sickla, Järfva, Sundbyberg och Ahlby.
277. — *dubium* L. flerst. t. ex. på Observatoriibacken; vid Grönbrink, Nybohof, Örby, stora Sickla, Ellenhill, Hufvudsta, st. Frösunda och Järfva.
278. — *Rhoeas* L. t. r. vid Sirishof, Djurgårdsbrunn, Lugnet, Rejmersholm, Conradsberg, st. Frösunda, Järfva och Ulriksdal.
- *somniferum* L. flerst. t. ex. på Observatoriibacken, Djurgården och vid Carlberg.
279. *Chelidonium majus* L. a.

### 32. *Fumariaceae* DC.

- Corydalis nobilis* L. r. förvildad vid Carlberg, Haga och på Waldemarsudden.
- *solida* Sm. r. förvildad i Bergianska Trädgården.
280. — *laxa* Fr. flerst. t. ex. i Grubbens gårde, Grindshage och Liljeholmspark; på Räkningholmen och flerst. på Sicklaön; vid Älkistan.
- \* *pumila* Host: bland föregående.
281. — *fabacea* Pers. a.
282. *Fumaria officinalis* L. a.
283. — *Vaillantii* Lois. r. vid Bergslund, Igeldammarne i Stadshagen (Prof. Wahlberg), stora Sickla, Drottningholm, Åkeshof (Elgenstierna) samt på Lofö kyrkogård.

### 33. *Cruciferae* Juss.

284. *Brassica campestris* L. r. på Djurgården och Lidingön.
285. — *Napus* L. r. på Kungsholmen; vid Barnängen, st. Sickla, Sköndalsbro och på Nämndön.
286. *Sinapis alba* L. r. vid Barnängen och Lännersta.

287. *Sinapis arvensis* L. a.

$\beta$  *ambigua*: flerst. t. ex. på Blockhus-  
udden; på ön Danmark och vid Örby.

288. *Melanosinapis communis* Spenn. r. vid Skanstull och Elgsjö.

*Diplotaxis tenuifolia* DC. r. vid Sköndalsbro.

289. *Sisymbrium Loeselii* L. r. omkring väderqvarnar mellan Sabbatsberg och Kungsbacken samt vid Djurgårdsbrunn.

— *Irio* L. r. vid stora Varfvet.

290. — *Sophia* L. a.291. — *officinale* Scop. a.292. *Hesperis matronalis* L. flerst. t. ex. på Valdemars- och Biskops-udden; vid Djurgårdsbrunn, Ulf-sunda, Skuru och Ulriksdal.293. *Erysimum cheiranthoides* L. a.

$\gamma$  *procumbens*: t. a.

294. — *hieracifolium* L. flerst. t. ex. vid Danviken; på Djurgårdens östra strand, Fjäderholmarne och Storholmen i Wärtan; på Wärmdön t. ex. vid Farsta; vid Heleneborg och på flere af Mälareöarne.

$\beta$  *simplex*: bland föregående.

295. *Alliaria officinalis* Andr. t. a.296. *Dentaria bulbifera* L. flerst. t. ex. i Friesens park; på Räkningholmen, Kranholmen, stora och lilla Hessingen; vid Nyckelviken, Ulfsjön, Ågesta, Skrubba, Sandvik, Sundby och Djurs-holm; på Ekholmen under Wärmdön och på Svartsjölandet.297. *Cardamine pratensis* L. a.298. — *amara* L. t. r. vid st. Nybohof, Wårby, Hamra och Ahlby (Westfelt).

$\beta$  *hirta*: r. vid Skansen nära Edsviken (Cederstråhle).

299. — *hirsuta* L. flerst. t. ex. vid Djurgårdsslätten; i Friesens park; vid Marieberg, Vinterviken, Dufnäs, Skrubba och Brännkyrks-Sätra; på Kersön och i Botkyrka.

300. *Cardamine impatiens* L. flerst. t. ex. vid Bellmans  
byst, Rosenhill och Skuggan; uti Friesens-,  
Carlbergs- och Haga parker; på stora Hes-  
singen; på Storholmen i Wärtan.
301. — *parviflora* L. r. vid Sundby i Huddinge (El-  
genstierna).
302. *Arabis hirsuta* Scop. flerst. t. ex. på Djurgården och  
Sicklaön; vid Carlberg, Vinterviken och Skrubba.
303. — *arenosa*  $\beta$  *borealis* Fr. r. på Valdemars-udden;  
vid Canalen mellan Ahlby- och Tullingesjöar  
i Botkyrka (Westfelt).
304. — *Thaliana* L. a.
305. *Turritis glabra* L. t. a.
306. *Barbarea vulgaris* Br. t. a.  
 $\beta$  *arcuata*: flerst. t. ex. i Friesens park;  
på Täckas udden och Björkön.
307. — *stricta* Fr. t. a.
308. *Nasturtium Armoracia* Fr. flerst. t. ex. vid Spinnhus-  
sundet; i plantagerna omkring Norrtull; på  
Biskops-udden och Experimentalfältet; vid  
Skuru o. s. v.
309. — *amphibium* Br. flerst. t. ex. vid Långholmen,  
Hammarbysjö, Clarasjö, Carlberg, Eklund och  
Haga.
310. — *sylvestre* Br. flerst. t. ex. på Mälaresträn-  
derne; vid Hammarbysjö, Mölnaträsk och  
Brunnsviken.
311. — *palustre* DC. a.
312. *Raphanus Raphanistrum* L. t. r. vid Blommensberg  
och Gröndal; vid vägen till Lofö kyrka, Djurs-  
holm och Aspvik på Wärmdön.
313. *Bunias orientalis* L. a.  
*Cakile maritima* Scop. r. uppgifven för Utön.
314. *Neslia paniculata* Desv. flerst. t. ex. på Valdemars-  
udden och Sicklaön; vid Örby, Snättinge,  
Solbaddet, Ahlby och Bromma.
315. *Isatis tinctoria* L. r. vid Orem, Farsta och Skrubba  
i Brännkyrka; på Höggarn och Muskön (Wahl-  
ström). Uppgifves äfven såsom tagen vid  
Marieberg.

317. *Lepidium campestre* Br. flerst. t. ex. vid Skanstull, Carlberg, Hagahund; på Djurgården och Lidingön.

318. — *rudérale* L. a.

319. *Capsella Bursa Pastoris* Mönch: a.

*β integrifolia*: t. a.

320. *Thlaspi arvense* L. a.

321. — *perfoliatum* L. r. på Experimentalfältet.

322. — *alpestre* L. r. vid Naeka Damtorp (V. Björnström).

323. *Hutchinsia petraea* Br. r. på Utöns norra udde.

324. *Subularia aquatica* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, Tranberg, Vinterviken, Skuggan, Naeka; i Kyrkviken på Lidingön och i Flaten.

325. *Camelina sativa* Cr. flerst. t. ex. på Observatoriibacken; vid Skanstull, Haga, Ulfunda och Kråkvik i Brännkyrka. —

\* *microcarpa* Reich. på Observatoriibacken och på Svartsjölandet.

326. — *dentata* Pers. r. vid Nybrohamnen; på Färingön och Björkö.

327. *Farsetia incana* Br. t. r. på Johannis Kyrkogård, Observatoriibacken, Skeppsholmen, Nya Kyrkogården och vid Söderbrunn (Eigenstierna).

328. *Cochlearia danica* L. r. på Ornön, Muskön och Utön.

329. *Draba verna* L. a.

*β præcox*: r. på Valdemars-udden.

330. — *nemorosa* L. r. på Observatoriibacken.

331. — *muralis* L. flerst. t. ex. i Friesens park; på Räkning- och Hästholmen; vid Svindensvik, Naeka, Liljeholmen, Vinterviken, Ulfunda, Brännkyrks-Sätra, Ahlby, Experimentalfältet och Mölna.

— *incana* L. r. tagen nära Byströms villa på Djurgården, men derstädes numera utrotad.

### 34. *Polygaleae* Juss.

332. *Polygala vulgaris* L. a.

333. *Polygala comosa* Schk. flerst. t. ex. vid Djurgårds-  
slätten, Carlberg, Ekhagssjön, Ullsunda, Ål-  
kistan, Ulriksdal, Drottningholm, Årsta, Hä-  
gersten, Pungpinan och Skarpneek.

334. — *amara* L. r. vid Örby.

*β uliginosa*: flerst. t. ex. utt Grindshage;  
vid Charlottenburg, Fogelsången, Vinter-  
viken, Pungpinan, Söderbrunn, Uggel-  
viken, Ekhagssjön, Långången, Drott-  
ningholm och Edby på Svartsjölandet.

### 35. *Balsamineae* DC.

335. *Impatiens Noli tangere* L. flerst. t. ex. vid Carlberg,  
lilla Sickla, Nacka, Skarpneek, Flaten, Fors-  
åbro, Sundby, Sättra och Hamra.

## 6. *Columriflorae.*

### 36. *Tiliaceae* Juss.

336. *Tilia parvifolia* Ehrh. a.

\* *vulgaris* Hayne: t. a.

### 37. *Malvaceae* Juss.

337. *Lavatera thuringiaca* L. r. vid Marieberg, Råsta  
(Elgenstierna), Öhr (Fristedt), Ekebyhof  
på Ekerön och vid Svartsjö.

338. *Malva borealis* Wallm. flerst. t. ex. på gator i trak-  
ten af Nytorget och Blecktorpet samt på  
Norrholm; vid Carlberg o. s. v.

339. — *rotundifolia* L. a.

340. — *sylvestris* L. flerst. t. ex. på gator på Söder-  
malm; på Djurgården; vid Clarasjö; Carlberg,  
Conradsberg, Dufvås och på st. Messingen.

341. — *Alcea* L. r. vid Bellevue, Carlberg och på  
Djurgården.

342. — *moschata* L. r. på gator på Södermalm; i  
Friesens park; vid Danvikskrokar och Malmvik.

### 38. *Gruinales* L.

343. *Geranium sanguineum* L. t. a.

344. *Geranium pratense* L. t. r. i Stadshagen; vid Djurgårdsslätten (Ljunggren), Carlberg, Solna, Christineberg, Ulfunda (Afzelius), Bergshammar (Jansson), Ulriksdal och Drottningholm.
345. — *syvaticum* L. a.
346. — *pyrenaicum* L. r. vid Marieberg, Blommensberg, Carlbergs allée och Experimentalfältet (Jansson).
347. — *bohemicum* L. t. r. vid Nacka, Dufnäs (Lindroth), Skarpneck, Skrubba, Vinterviken, Hägersten, Fiskartorpet, Ropsten och Ekenäs på Wärmdön (Lagerheim).
348. — *Robertianum* L. a.
349. — *lucidum* L. t. r. på Fläsklösan och Kungshatt; vid Skärholm, Högtorp, Farsta (Lagerheim) och Tjustvik på Wärmdön samt på Muskön (Wahlström).
350. — *molle* L. r. på Biskopsudden; vid lilla Nyckelviken (Lagerheim) och på Utön.
351. — *pusillum* L. a.
352. — *columbinum* L. t. r. vid Liljeholmen, Rålambs-hof, Sabbatsberg, Carlberg, Ingemarshof, Löts-sjön (Fristedt), Stor-Sickla, Örnberg, Ahlby, Hamra (Westfelt), Drevviken och på Kors-udden på Wärmdön (Lindroth).
353. *Erodium cicutarium* L'Her. t. a.  
— *moschatum* Ait. r. på gator nära Mosebacke; i Trädgårdsföreningens trädgård och vid Nacka (F. Björnström).
354. *Oxalis Acetosella* L. a.  
— *stricta* L. r. på Carolinska Institutets gård.  
*Linum usitatissimum* L. träffas ofta sjelfsådd.
355. — *catharticum* L. t. a.

### 39. *Hypericineae* DC.

356. *Hypericum montanum* L. r. i Frescati äng samt mellan stora Sickla och Skuru (Prof. Wahlberg).

357. *Hypericum hirsutum* L. r. vid Ålkistan, Edsberg vid Edsviken (Cederstråhle), Fällan vid Magelungen och på Svartsjölandet.

358. — *quadrangulum* L. a.

359. — *perforatum* L. a.

#### 40. *Cistineae* DC.

360. *Helianthemum vulgare* Gärtn. a.

#### 41. *Violarieae* DC.

361. *Viola odorata* L. r. i Bellevue-, Carlbergs- och Ulriksdals parker samt vid Vinterviken.

362. — *hirta* L. t. a.

363. — *epipsila* Ledeb. r. på Svartsjölandet t. ex. vid Sundby.

364. — *palustris* L. a.

365. — *mirabilis* L. t. r. i Carlbergs park; på stora Hessingen; vid Nyckelviken, Nacka, Ulfsjön (F. Björnström), Skrubba, Brännkyrks-Sätra och Ablby (Westfelt).

366. — *arenaria* DC. flerst. t. ex. i Grindshage, vid Rörstrand och på backar utom Norrtull.

367. — *sylvatica* Fr. a.

368. — *canina* L. a.

369. — *stagnina* Kit. flerst. t. ex. vid Hammarbysjö, Ekhagssjön, Ingenting, Johannelund, Mölna träsk, Hägersten och Drevviken; på Kersön, Fogelön och Kranholmen.

370. — *tricolor* L. a.

β *arvensis*: a.

#### 42. *Droseraceae* DC.

371. *Parnassia palustris* L. a.

372. *Drosera rotundifolia* L. t. a.

373. — *longifolia* L. flerst. t. ex. vid småsjöarne omkring Fogelsången och på Sicklaön; vid Ekhagssjön, Orems viken och på Wårmdön.

β *obovata*: r. vid Squalten.



374. *Drosera intermedia* Hayne: flerst. t. ex. vid samma sjöar som *D. longifolia* samt dessutom vid Ellenhill, Brännkyrksjön och på Lidingön.

### 43. *Silenaceae* Braun.

375. *Silene inflata* Sm. t. a.

376. — *nutans* L. t. a.

*β glabrata*: flerst. t. ex. på Observatorii- och Generalsbacken; vid Carlberg, Haga, Ellenhill; i Grindshage; vid Fogelsången och på Djurgården.

377. — *noctiflora* L. flerst. t. ex. i plantager vid Norrtullsgatan, Sabbatsberg, Stenbrottet, Haga, Tivoli och Ulriksdal; vid Vinterviken, Lugnet och Sköndalsbro.

— *Armeria* L. r. vid Hammarby, Dockan, Ellenhill och Aspvik.

378. — *rupestris* L. r. vid Ahlby och på berget midt emot Aspen i Botkyrka sn (Westfelt).

379. *Melandrium sylvestre* Röhl. flerst. t. ex. på Djurgårdens ängsmark; på Räkningholmen och Wärtnas holmar.

*β carneum*: vid Ingenting och på Djurgården.

380. — *pratense* Röhl. flerst. t. ex. på Observatorii-backen; vid Carlberg, Haga, Ellenhill och Fogelsången.

381. *Viscaria vulgaris* Röhl. a.

382. *Lychnis Flos cuculi* L. a.

383. *Agrostemma Githago* L. t. a.

*β nana*: på Wäntholmen, Björkö och flerst. på Svartsjölandet.

384. *Saponaria officinalis* L. r. på Skeppsholmen; vid Rålambshof och på Blockhusudden.

385. *Dianthus Armeria* L. r. vid Tyresö.

386. — *deltoides* L. a.

*β glaucus*: vid Aspvikensås på Wärmdön.

— *barbatus* L. i Carlbergs park.

387. *Gypsophila muralis* L. r. vid Skansen nära Edsviken (Cedersträhle).

#### 44. *Alsinaeae* Bartl.

388. *Malachium aquaticum* Fr. flerst. t. ex. vid Clara-, Rörstrands-, Carlbergs och Hammarby-sjöar; vid Vinterviken, Drottningholm, Skärholm och Svartsjö.
389. *Stellaria media* L. a.
390. — *palustris* Retz. t. a.  
           *β glauca*: t. a.
391. — *graminea* L. a.
392. — *Friesiana* Ser. t. r. vid Gångsätra träsk, Orem, Wårby och Kungshatt; på Fogelön och vid Kullbro på Adelsön.
393. — *uliginosa* Murr. flerst. t. ex. i Grindshage; vid Sundsta, Sandsborg, Danviks källa, Nacka, Nyckelviken, Dufnäs, Skärholm, Ellenhill och Experimentalfältet.
- Cerastium arvense* L. r. på Nya Kyrkogården.
394. — *vulgatum* L. a.
395. — *viscosum* L. r. vid Skarpneck; mellan Tallkrogen och Sköndalsbro; vid Södergarn och vid Hamra i Botkyrka (Westfelt).
396. — *semidecandrum* L. a.
397. *Arenaria trinervia* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, Haga och på Djurgården.
398. — *serpyllifolia* L. a.
399. *Sagina nodosa* Fenzl: flerst. t. ex. i Stadshagen; vid Smedsudden, Djurgårdsbrunnsviken och på Lidingön.
400. — *procumbens* L. a.
401. *Spergula arvensis* L. a *vulgaris*: a.  
           *β sativa*: t. a.  
           *γ maxima*: vid Elfsjö.
402. — *pentandra* L. flerst. t. ex. på Djurgårdsbergen; i Stadshagen; vid Sabbatsberg, Carlberg, Sundsta och Nacka.
403. *Spergularia rubra* Pers. t. a.
404. — *media* Pers. r. vid Ulriksdal; mellan Hökarängen och Sköndalsbro.

#### 45. *Elatineae* Juss.

405. *Elatine Hydropiper* L. flerst. t. ex. vid Kastellholmen, Carlberg, Rålambshof, Traneberg, Hufvudsta, Ålkistan, Ekensberg och Nacka  
*β submersa*: bland föregående \*).

### III. Calyciflorae.

#### 7. Fauciflorae.

#### 46. *Cucurbitaceae* Juss.

406. *Bryonia alba* L. r. vid Reparebangsgatan på Kungsholmen; vid Bernhardsberg; på Blockhusudden och Fjäderholmarne.

#### 47. *Ribesiaceae* Reich.

407. *Ribes Grossularia* L. a.  
*β Uva crispa*: a.  
 408. — *nigrum* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, Haga, Marieberg, Ulfunda, Sickla och på Djurgården.  
 409. — *rubrum* L. flerst. t. ex. vid Marieberg, Carlberg, Haga och Sundsta; på lilla Hessingen och flere holmar i Mälaren och Wärtan.  
 410. — *alpinum* L. t. a.

#### 48. *Saxifragae* Juss.

411. *Saxifraga granulata* L. a.  
 — *adscendens* L. funnen en gång i Stadshagen nära vägen till Aronsberg, men sedan förgäfvets sökt.  
 412. — *tridactylites* L. t. r. på Skepps- och Kastellholmen; vid stora Varfvet, Rålambshof, Conradsberg och södra Stäket (Lindroth).  
 413. *Chrysosplenium alternifolium* L. flerst. t. ex. vid Blommensberg, Uggelviken, Ålkistan och Mörbj; på Lidingsön, Sicklaön och Wärmdön samt i Huddinge och Botkyrka på många ställen.

\*) *Frankenia pulverulenta* L. som tagits några år å rad nära Bellmans byst på Djurgården, är numera der utgången.

### 49. *Crassulaceae* Juss.

414. *Sedum Telephium* L. a.  
 415. — *sexangulare* L. flerst. t. ex. på Djurgårdsslätten; vid Norrtull, Sabbatsberg, Carlberg och Danviken.  
 416. — *acre* L. a.  
 417. — *album* L. a.  
 418. — *annuum* L. t. a.  
 419. *Bulliarda aquatica* DC. flerst. t. ex. vid Djurgårdsstränderna, Carlberg, Marieberg, Ålkistan, Ulriksdal och på Lidingön.  
     *β prostrata*: blandad med föregående.

### 50. *Lythrarieae* Juss.

420. *Lythrum Salicuria* L. a.  
 421. *Peplis Portula* L. t. r. i Grubbens gärde; vid Ekensberg, Hufvudsta, Ekhagen, Ellenhill, Ålkistan, Fällan och st. Björknäs på Wärmdön.

### 51. *Onagrarieae* Juss.

422. *Oenothera biennis* L. t. r. vid Djurgårdsslätten, Djurgårdsbrunn och på Blockhusudden; vid Rålambshof och Ulriksdal.  
 423. *Epilobium angustifolium* L. t. a.  
 424. — *hirsutum* L. r. på Djurgårdsslätten och i Friesens park (Lagerheim).  
 425. — *parviflorum* Schreb. t. r. vid st. Björknäs, Bromma kyrka, Kista i Spånga (Elgenstierna), Öfverby i Sollentuna, Ahlby (Westfelt), och Säby i Sönga s:n.  
 426. — *montanum* L. a.  
     *β collinum*: flerst. t. ex. vid Danviks krockar och på Wärmdön nära Skurubro.  
 427. — *roseum* Schreb. flerst. t. ex. vid Sinkens dam, Fatburssjön, Hammarbysjö, Årstaviken, Ormsjön och Djurgårdsbrunnsviken.  
 428. — *tetragonum* L. r. vid Ormsjön, lilla Sickla (Björnström), Järta och Söderby.

429. *Epilobium palustre* L. a.

430. *Circæa alpina* L. flerst. t. ex. vid Öhr, Nacka, Älta, Dufnäs, Skarpneck, Drevviken, Wårby, Snickarkrogen, Hamra, Södergarn och flerst. på Lidingön.

## 52. Halorkageae Br.

431. *Myriophyllum verticillatum* L. flerst. t. ex. vid Rosendal, Djurgårdsbrunn, Skuggan, Annelund; uti småsjöarne vid Fogelsången; uti Ekhas- och Råstasjön; vid Örby och Svartsjö.

432. — *spicatum* L. t. a.

433. — *alterniflorum* DC. r. i Nacka Damsjö, Flaten och Vinterviken (Lagerheim).

434. *Hippuris vulgaris* L. flerst. t. ex. vid Clarasjö, Bom-sjön, Djurgårdsbrunnsviken och på Lidingön.  
*β fluviatilis*: i Ekhasjöns utloppscanal.

## S. Rosiflorae.

## 53. Pomaceae L.

435. *Pyrus communis* L. t. r. vid Djurgårdsslätten, Sinkensdam (P. A. Ruus), Mörtviken, Marieberg, Carlberg, Haga och på stora Hessingen.

436. — *Malus* L. t. a.

437. *Sorbus scandica* Fr. flerst. t. ex. i Friesens park; vid Bellevue, Haga, Skuru och på Wärmdön.

438. — *Aucuparia* L. a.

439. *Cratægus Oxyacantha* L. a.

440. — *monogyna* Jacqu. flerst. t. ex. vid Djurgårdsslätten, Danvikskrokar, Haga, Ullsunda, Tivoli och Klingsta.

441. *Cotoneaster vulgaris* Lindl. flerst. t. ex. på Långholmen och st. Hessingen; vid Fogelsången, Marieberg, Rålambshof, Annelund, Rosendal och Brännukyrks-Sätra.

*γ nigra*: r. på bergen midt emot lilla Hessingen (Sjögren).

54. *Senticosae* L.

442. *Rosa rubiginosa* L. flerst. t. ex. vid Skanstull, Sabbatsberg, Rörstrand, Hesslingeberg och Danvikskrokar.
443. — *canina* L.  $\alpha$  *nitida*: a.  
 $\beta$  *opaca*: a.  
 \* *dumetorum* Thuill. a.
444. — *Acharii* Billb. r. i Haga park och vid Beckbruket.
445. — *villosa* L. r. på bergen ofvanför Sundsta och stora Sickla (P. A. Ruus).
446. — *mollissima* Fr. t. a.
447. — *tomentosa* Sm. t. a.
448. — *cinnamomea* L. t. r. vid Nybodabacke, Vinterviken och Ulriksdal; i Nackatrakten och på Svartsjölandet.
449. *Agrimonia Eupatoria* L. flerst. t. ex. vid Sabbatsberg, Carlberg, Artilleri-Laboratorium och Djurgårdsbrunn.
450. *Poterium Sanguisorba* L. r. i Drottningholmspark (N. Arfvidsson).  
 $\beta$  *hirta*: på backar mellan Sänga och Skå kyrkor, samt vid Svartsjö ladugård.
451. *Alchemilla vulgaris* L. a.
452. *Rubus idaeus* L. a.  
 $\beta$  *anomalus*: vid Bomsjön nära Carlberg.
453. — *affinis* Weih. r. på bergshöjden mellan Danviken och Svindensvik; vid Nacka och flerst. på Ormingelandet.
454. — *thyrsoides* Wimm. r. vid Mörtviken och vid Ablby (Westfelt).
455. — *Wahlbergii* Arrh. r. vid Barnängen och Hägersten, samt på Wärmdön och Muskön (Wahlström).
456. — *nemorosus* Hayne: r. på Utön.
457. — *cæsius* L. flerst. t. ex. vid Framnäs, Carlberg, Löfholmen och Nacka; på stora och lilla Hessingen samt flere Mälareöar.
458. — *saxatilis* L. a.

459. *Rubus arcticus* L. r. på Hästholmen; vid Uggelvikskälla och Tallkrogen (Elgenstierna).
460. — *Chamaemorus* L. flerst. t. ex. vid Beckbruket, Lillsickla, Nacka, Gångsätra samt mellan Sundsta och Årsta.
461. *Fragaria vesca* L. a.
462. — *elator* Ehrh. flerst. t. ex. vid Barnängen, Sundsta, Årsta, Carlberg, Bellevue, Haga och på Räkningholmen.
463. — *collina* Ehrh. t. a.
464. *Comarum palustre* L. a.
465. *Potentilla Anserina* L. a.
466. — *norvegica* L. t. r. vid Fogelsångsbergen, Nacka, Källtorpssjön, Enskede (P. A. Ruus) och Sköndalsbro; i åkrar mellan Elfsjö och Långsjö samt vid Hamra (Westfelt).
467. — *reptans* L. t. a.
468. — *argentea* L. a.  
        $\beta$  *virescens*: r. på Djurgårdsslätten och på holmar nära Fogelön i Mälaren.
469. — *verna* L. t. a.
470. — *maculata* Pourr. a.
471. — *Tormentilla* Scop. a.
472. *Geum urbanum* L. a.
473. — *intermedium* Willd. t. r. mellan Carlberg och Eklund; på Djurgården; vid Årsta, Haga, Ulriksdal och Edsberg (Cederstråhle).
474. — *rivale* L. a.
475. *Spiraea salicifolia* L. ymnig i Haga park och vid Järla.
476. — *Ulmaria* L. a.
477. — *Filipendula* L. a.

## 55. *Drupaceae* L.

478. *Prunus domestica* L. r. nära Friesens park; vid Ryssviken, Ulfunda och Ellenhill.
479. — *spinosa* L. a.
480. — *Cerasus* L. r. i Friesens park; vid Rörstrand, Bellevue och Haga.

481. *Prunus avium* L. r. på Kastellholmen och Djurgården; vid Bellevue och Haga.  
 482. — *Padus* L. a.

### 56. *Papilionaceae* L.

*Pisum arvense* L. flerst. sjelfsådd på åkrar.

483. *Lathyrus sylvestris* L. t. r. vid Grönbrink (Prof. Wahlberg), Långsjön på Sicklaön, Dufnäs; på Dufholmen vid Lidingön; vid Ahlby (Westfelt), Norsborg, Wiken och på Käggeboda-holme.  
 484. — *palustris* L. flerst. t. ex. på Biskopsudden och Sicklaön; vid Djurgårdsbrunnsviken, Laduviken, Råstasjön, Dufvebohl, st. Hornsberg, Drevviken m. fl. st.  
 485. — *tuberosus* L. r. vid Ulfunda.  
 486. — *pratensis* L. a.  
 487. — *maritimus* Fr. r. på Muskön (Wahlström).  
 488. *Orobus vernus* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, Haga och på Djurgården.  
 489. — *tuberosus* L. a.  
       *β tenuifolius*: t. a.  
 490. — *niger* L. flerst. t. ex. i Friesens park; vid Dockan, Nacka, Nyckelviken, Igelboda, Skuru, Blommensberg, Brännkyrks-Sätra, Ekhagsjön och Djursholm.  
 491. *Vicia sylvatica* L. flerst. t. ex. på Waldemarsudden; vid Rosendal, Carlberg, Haga och Skuggan.  
 492. — *cassubica* L. t. r. vid Dockan, Nacka, Söderby, Erstavik, samt st. Björknäs och Tollarö på Wärmdön.  
 493. — *dumetorum* L. r. vid Nyckelviken på Sicklaön (Westfelt).  
 494. — *villosa* Roth: t. a.  
 495. — *Cracca* L. a.  
 496. — *sepium* L. a.  
 497. — *sativa* L. a.  
 498. — *angustifolia* Roth: r. Harfva i Eds s:n och på Wärmdön.  
       *β Bobartii*: r. Beckholmen.



499. *Vicia lathyroides* L. r. i Friesens park; på Ladugårdsgärdet (Öhrman och Elgenstierna), Räkning- och Hästholmen; vid Ingenting och st. Björknäs.
500. *Ervum hirsutum* L. t. a.
501. — *tetraspermum* L. t. a.  
*Onobrychis sativa* Lam. r. vid Ulfunda.
502. *Astragalus glycyphyllos* L. r. vid Sabbatsberg och Djurgårdsbrunn.
503. *Lotus corniculatus* L. a.  
*β crassifolius*: i Haga park.
504. *Medicago sativa* L. t. r. vid Rålambshof, Conradsberg, Frösunda, Experimentalfältet, Skönstavik och på Windön.
505. — *sylvestris* Fr. r. på stora Höggarn.
506. — *falcata* L. t. r. på Observatoriibacken, Solna kyrkogård, Blockhusudden; vid Stenbrottet (R. Rubenson), Ulfunda (Afzelius) och Dufnäs (Lindroth).
507. — *lupulina* L. a.  
*β Willdenowiana*: flerst. t. ex. vid Carlberg, Danvikskrokar; på Djurgården, Svartsjölandet och Wärmdön.  
— *maculata* W. r. på Björkön.
508. *Melilotus macrorrhiza* Pers. r. vid Carolinska Institutet, Carlberg, Djurgårdsbrunn; på Skeppsholmen och Valdemarsudden.
509. — *officinalis* Lam. r. vid Stockby i Danderyd.
510. — *alba* Lam. flerst. t. ex. på Skepps-, Kastell- och Beckholmen; på Observatoriibacken, Valdemarsudden och vid Djurgårdsbrunn.
511. *Trifolium repens* L. a.
512. — *hybridum* L. a.
513. — *spadiceum* L. flerst. t. ex. vid Hästholmsundet, lilla Sickla, Nyckelviken, Järle, Nacka, Söderby, Dufnäs, Tallkrogen, Skönstavik, Orem, Ingemanshof och på Svartsjölandet.
514. — *agrarium* L. flerst. t. ex. vid Fogelsången, Carlberg, Ulfunda, Sickla och Nacka.

515. *Trifolium procumbens* L. flerst. t. ex. i Grinds hage; på Hästholmen, Beckholmen, stora Hessingen, Björnholmen och Färingön; vid Carlberg, Fogelsången, Örnsberg, Örby och Skrubba.

β *humile*: flerst. t. ex. vid Danviken och Dufnäs.

516. — *fragiferum* L. flerst. t. ex. på Blockhusudden; vid Källhagen, Carlberg, Conradsberg, Ljje-holmen, Ulfunda, Ulriksdal, Danderyds-Stockby, Ekholmsnäs, Stubbsund och Waxholm.

517. — *montanum* L. flerst. t. ex. vid Sabbatsberg, Carlberg, Dockan och på Ladugårdsgärde.

518. — *arvense* L. t. a.

519. — *medium* L. a.

520. — *pratense* L. a.

521. *Ononis arvensis* L. t. r. vid Källhagen, Sandsborg och Dockan; på Blockhusudden; mellan Experimentalfältet och Skuggan (Jansson); vid Kongsberga i Färentuna.

522. — *hircina* Jacqu. t. r. på Blockhusudden; vid Enskede, Örby, Edby, Dufvebohl (Fristedt), Bromma ka och Huddinge prästgård (Ljunggren); vid Farsta på Wärmdön (Lagerheim) och på Svartsjölandet.

523. *Anthyllis Vulneraria* L. flerst. t. ex. vid Dockan och flerst. på Sicklaön; vid Liljeholmen, Gröndal, Haga, Ulriksdal, Bromma ka och Fiskartorpet.

## 9. Centriflorae.

### 57. *Ericineae* Juss.

524. *Myrtillus nigra* Gil. a.

525. — *uliginosa* Gil. t. a.

526. *Oxycoccus palustris* Pers. flerst. t. ex. i Hagapark; vid Fogelsångens, Sicklaöns och Lidingöns småsjöar.

527. *Vaccinium Vitis idæa* L. a.

528. *Arctostaphylos officinalis* W. et Gr. t. a. serdeles söder om staden.

- 529 *Andromeda polifolia* L. t. a. serdeles söder om staden.  
 530. *Calluna vulgaris* Salisb. a.  
 531. *Ledum palustre* L. t. a.  
 532. *Pyrola rotundifolia* L. t. a.  
 533. — *chlorantha* Sw. flerst. t. ex. i Solna skog, Hagapark; vid Fogelsången, Vinterviken, Nacka och Brännkyrks-Sätra.  
 534. — *media* Sw. flerst. t. ex. vid Solna, Haga, Fogelsången, Nacka, Skrubba, Brännkyrks-Sätra och Ahlby.  
 535. — *minor* L. t. a.  
 536. — *secunda* L. t. a.  
 537. — *uniflora* L. flerst. t. ex. vid Solna, Haga, Blommensberg, Nacka och Skrubba.  
 538. — *umbellata* L. flerst. t. ex. vid Solna, Haga, Conradsberg, Ulfunda, Traneberg, Hufvudsta, Ulriksdal, Skansen vid Edsviken, Nyckelviken, Nacka, Dufnäs, Vinterviken och Ahlby.  
 539. *Monotropa Hypopithys* L. flerst. t. ex. vid Solna, Haga, Ellenhill och Nockeby; mellan Conradsberg och Fredhäll; mellan Bergshammar och Ulriksdal; vid Vinterviken, Aspudden och Skrubba.

*β glabra*: r. i skogen mellan Ulriksdal och Bergshammar.

### 58. *Empetreae* Nutt.

540. *Empetrum nigrum* L. t. a. serdeles söder om staden.

### 59. *Euphorbiaceae* Juss.

541. *Euphorbia Esula* L. t. r. vid Tanto (P. A. Ruus), Frösundavik, Skansen vid Edsviken (Cederstråhle), Nacka badställe samt mellan Farsta och Tjustvik.  
 542. — *Peplus* L. flerst. t. ex. i Trädgårdar omkring Norrtull; vid Ellenhill, Ekensberg, Källhagen, och på Blockhusudden.  
 543. — *Helioscopia* L. t. a.  
 544. *Mercurialis perennis* L. r. på Käggeboda holme i Mälaren.  
 — *annua* L. r. vid Clara sjö.

## 60. *Portulacaceae* Juss.

545. *Montia fontana* L. flerst. t. ex. vid Djurgårdsslätten, Cedersdal, Stenbrottet, Ekhagssjön, Danvikskälla och Dufgås.

## 61. *Paronychieae* St. Hil.

546. *Herniaria glabra* L. t. a.  
 547. *Scleranthus perennis* L. a.  
 548. — *annuus* L. a.

## 62. *Polygoneae* Juss.

*Fagopyrum esculentum* Gärtn. träffas stundom förvildad, t. ex. på Djurgården; vid Skrubba (Ljunggren).

549. *Polygonum Bistorta* L. r. vid Byströms villa, Lillsickla (T. Ruus) och Skuggan.  
 550. — *viviparum* L. a.  
 551. — *amphibium* L. *α. aquaticum*: a.  
       *β terrestre*: flerst. t. ex. vid Liljeholmen, Carlberg, Sabbatsberg, Hammarbysjö och Nacka.  
 552. — *lapathifolium* L. a.  
 553. — *incanum* Schmidt: flerst. t. ex. vid Djurgårdsslätten, Clarasjö, Carlberg, Ellenhill och Långholmen.  
 554. — *Persicaria* L. a.  
 555. — *mite* Schrank: flerst. t. ex. i Stadshagen; vid Clarasjö, Djurgårdsstränderna, Hammarbysjö, Årstaviken, Brännkyrkssjön och Flaten.  
 556. — *Hydropiper* L. a.  
 557. — *aviculare* L. a.  
 558. — *Convolvulus* L. t. a.  
 559. — *dumetorum* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, samt Djurgårds-, Fogelsångs-, Danviks- och Nackabergen.  
 560. *Rumex maritimus* L. t. r. vid Clara-, Rörstrands- och Hammarbysjöar; på Blockhusudden; vid Årstaviken, Djurgårdskanalen, Nacka och Söndergarn.

561. *Rumex obtusifolius* L. t. a.  
 562. — *pratensis* Koch: r. på Kastellholmen, Beckholmen och Blockhusudden.  
 563. — *Hydrolapathum* Huds. t. a.  
 564. — *maximus* Schreb. flerst. t. ex. på Djurgårdens stränder; vid Fatbursjön, Hammarbysjö, Clarasjö och Brunnsviken.  
 565. — *conspersus* Hn. t. r. på Skeppsholmen; vid Fatbursjön, Clarasjö, Blåporten, Haga, Ålkistan, Ulriksdäl, Dockan (J. Lange) och Käggeholm.  
 566. — *crispus* L. a.  
 567. — *domesticus* Hn. a.  
 568. — *Hippolapathum* Fr. t. a.  
 — *Patientia* L. träffas ofta sjelfsådd i plantager och trädgårdar.  
 569. — *Acetosa* L. a.  
 570. — *Acetosella* L. a.  
*Rheum Rhaponticum* L. r. vid Trångsund nära Drefviken.

## IV. Incompletae.

### 10. Bracteiflorae.

#### *Aristolochiaceae* Juss.

*Aristolochia Clematitis* L. r. vid Skytteholm på Ekerön.

#### 63. *Thymeleae* Juss.

571. *Daphne Mezereum* L. t. r. vid Rosendal, Carlberg, Haga, Tivoli, Skrubba, Brännkyrks-Sätra, Hamra och Mellanberg under Sandby (Westfelt).

#### 64. *Ulmaceae* Ag.

572. *Ulmus campestris* Sm. r. på Observatoriibacken.  
 573. — *montana* Sm. a. dock merändels planterad.

#### 65. *Urticaceae* Juss.

574. *Humulus Lupulus* L. t. r. vid Djurgårdsbrunn, Marieberg, Haga, Skansen nära Edsviken (Cederstråhle), Sköndalsbro och Skrubba (Ljunggren).

575. *Urtica urens* L. a.

576. — *dioica* L. a.

β *holosericea*: på Tunaholmen å Svartsjö-landet.

## 66. *Amarantaceae* Juss.

577. *Amarantus Blitum* L. r. i Bergianska trädgården; i Glasbruksgränden på Kungsholmen; på Sillpackaregatan å Söder och vid Fogelsången.

## 67. *Chenopodiaceae* Juss.

*Atriplex hortensis* L. t. a. sjelfsådd.

578. — *latifolia* Wg. flerst. t. ex. vid Clarasjö och Träsket; på Djurgårdsstränderne.

β *salina*: på Bockholmen i Wärtan (Sjögren).

579. — *patula* L. a.

β *angustifolia*: a.

580. — *littoralis* L. r. vid nya Kungsholmsbron (Prof. Wahlberg) och på Kastellholmen.

581. *Blitum capitatum* L. r. vid Bondgatan på Söder (Björnström) och på Djurgårdsslättan.

582. — *virgatum* L. flerst. t. ex. vid Clarasjö, stora Varfvet, Barnängen, Marieberg, Conradsberg, Ulriksdal, Djurgårdsbrunn; på Ladugårdsgärdet och Blockhusudden.

583. — *rubrum* Reich. flerst. t. ex. vid Clarasjö, Träsket och Hammarbysjö.

584. — *glaucum* Koch: t. a.

585. — *Bonus Henricus* Mey. a.

586. *Chenopodium hybridum* L. flerst. t. ex. i Kirsteinska och Trädgårdsföreningens Trädgårdar; på Kungsholmen och gröna gatan på Söder; vid Blecktornet, Lugnet, Fogelsången, Vinterviken, Conradsberg och Ulriksdal.

587. — *urbicum* L. flerst. t. ex. i Djurgårdsstaden; vid Skanstull, Långpannan och Södergarn.

588. — *album* L. α *spicatum*: t. a.

β *cymigerum*: a.

589. *Chenopodium polyspermum* L. flerst. t. ex. på Djurgården; vid Carlberg, Ekhagssjön, Ellenbill, Blommensberg och Gångsätra.  
     *β acutifolium*: flerst. t. ex. vid Ulriksdal, Sköndalsbro och Elfsjö.
590. — *Vulvaria* L. r. i trädgårdar på Norrmalm.

## 11. Juliflorae.

### 68. Cupuliferae Reich.

591. *Quercus Robur* L. a.  
     *Fagus sylvatica* L. planterad vid Alnäs på Djurgården, samt i Haga- och Drottningholms parker.  
     *Carpinus Betulus* L. planterad vid Hesselby och i Drottningholms park.
592. *Corylus Avellana* L. a.

### 69. Salicineae Rich.

593. *Populus tremula* L. a.  
     — *canescens* Sm. planterad på Maria Kyrkogård, Strömparterren, Djurgården m. fl. st.  
     — *alba* L. planterad flerst. t. ex. på Djurgården.  
     — *nigra* L. planterad och förvildad flerst. t. ex. på Djurgården.  
     — *pyramidalis* Roz. som föregående.
593. — *balsamifera* L. som föregående.
594. *Salix pentandra* L. a.  
     *β latifolia*: på en holme vid Kumla i Skå socken.
595. — *fragilis* L. a. Honträd finnes vid Riddarholmskanalen; Carlbergs värdshus och Christineberg.  
     — *viridis* Fr. r. vid Framnäs och Sabbatsberg.
596. — *alba* L. allmänt planterad och flerst. förvildad.  
     *β virescens*: vid Hornstull.
597. — *undulata* Ehrh. ●. vid Oakhill, Roslagstull och Haga.
598. — *depressa* L. r. vid Elfsjö (Lundeqvist).  
     — *purpurea* L. r. på Djurgården; vid Haga och Skuru.

*Salix acutifolia* W. planterad mellan Blåporten och Framnäs.

599. — *repens* L. a.  
 600. — *nigricans* Sm. t. a.  
 — *laurina* Sm. planterad vid Framnäs och Rosendal.  
 601. — *aurita* L. a.  
 602. — *caprea* L. a.  
       *β humilis*: t. a.  
 603. — *cinerea* L. t. a.  
 604. — *viminalis* L. allmänt odlad och förvildad.

### 70. *Betulineae* Reich.

605. *Betula alba* L. a.  
 606. — *odorata* Bechst. a.  
       *γ microphylla*: vid Mofjärd i Färentuna.  
 607. *Alnus glutinosa* W. a.

### 71. *Myricaceae* Reich.

608. *Myrica Gale* L. t. a.

### 72. *Coniferae* Juss.

609. *Pinus sylvestris* L. a.  
 — *Larix* L. allmänt planterad.  
 610. — *Abies* L. a.  
 611. *Juniperus communis* L. a.  
 612. *Taxus baccata* L. r. vid Torpet Kroka på Utön.

### 73. *Equisetaceae* DC.

613. *Equisetum arvense* L. t. a.  
       *β alpestre*: på Björkön.  
 614. — *pratense* Ehrh. r. vid Carlbergs alléen och på Svartsjölandet. Äfven tagen på Lidingön af Biskop Agardh.  
 615. — *sylvaticum* L. a.  
       *β capillare*: på Svartsjölandet.  
 616. — *palustre* L. a.



617. *Equisetum fluviatile* L. a.

\* *limosum* L. t. a.

618. — *hyemale* L. r. vid Enskede och Pungpinan,  
samt på Svartsjölandet.

## 12. Nudiflorae.

### 74. *Callitrichineae* Link.

619. *Callitriche verna* L. a.

620. — *hamulata* Kütz. r. vid Rastaborg på Ekerön.

621. — *autumnalis* L. flerst. t. ex. vid Kastellholmen,  
Djurgårdens stränder och Marieberg.

### 75. *Ceratophylleae* DC.

622. *Ceratophyllum demersum* L. t. a.

### 76. *Characeae* Reich.

623. *Chara tomentosa* L. t. r. vid Djurgårdsbrunn; i Husarviken, Lidingö Kyrkvik, Råstasjön, Bromma Kyrksjö och Edsviken; vid Nora och Väntholmen på Svartsjölandet.

624. — *aspera* W. t. r. i Blommensbergs Långsjö och Lidingö Kyrkvik; vid Aspvik på Wärmdön och på Svartsjölandet.

625. — *vulgaris* L. t. a.

626. — *fragilis* Desv. r. vid Skuggan, Djurgårdsbrunn och Brännkyrka.

627. — *flexilis* L. flerst. t. ex. på Svartsjölandet.

628. — *syncarpa* Thuill. r. i Mölnaträsk.

629. — *mucronata* Al. Br. r. i Bomsjön vid Carlberg.

630. — *gracilis* Sm. r. på Wärmdön.

## II. MONOCOTYLEDONEAE.

### 13. Fructiflorae.

#### 77. *Orchideae* Juss.

631. *Orchis sambucina* L. flerst. t. ex. vid Rörstrand, Marieberg, Fogelsången; på Valdemarsudden, Hästholmen och vid Eknäs på Wärmdön.

β *incarnata*: tillsammans med föregående.

632. *Orchis angustifolia* Wimm. t. r. t. ex. på Lindarängen; vid Isbladskärret, Hnsarviken (Jansson), Råstasjön, Blommensberg och Ålsten; på Lidingön t. ex. vid Grönsta och Ekholmsnäs (Westberg); på Wärmdön vid Aspvik, Gustafsberg och Tjustvik. Huruvida den på Wärmdön växande »*O. latifolia*» är någon annan än *O. angustifolia* är Utg. obekant.
633. — *maculata* L. t. a.
634. *Gymnadenia conopsea* Br. t. r. vid Vinterviken, Södergarn, Ågesta; i Sollentuna t. ex. vid Öfverby, Ytterby och Gillberga; vid Hägerstalund i Spånga; vid Ahlby och Hamra i Botkyrka; vid Ensta och Tible i Täby socken.
635. *Cocloglossum viride* Hn. t. r. vid Skuggan, Södergarn, Flaten, Kronan i Huddinge, Häggesta i Botkyrka och på Sollentuna allmänning.
636. *Platanthera bifolia* Rich. a.
637. — *chlorantha* Cust. t. r. vid Vinterviken (Græve), Ulfsjön (Björnström), Skrubba, Skuru, och vid Farsta på Wärmdön (Lagerheim).
638. *Herminium Monorchis* Br. r. vid Södergarn, Ulriksdal och Svartinge i Sollentuna. Äfven uppgifven af Næzén ss. tagen på Djurgården.
639. *Goodyera repens* Br. t. r. vid Haga, Bergshammar, Södergarn, st. Björknäs, Skrubba, Ahlby, samt mellan Viksjö och Sandvik i Jerfälla socken.
640. *Cephalanthera rubra* Rich. r. vid Nacka, Ulriksdal (Jansson), Skrubba och Häggesta i Botkyrka (Westfelt).
641. — *ensifolia* Rich. r. vid Skuru och Nacka.
642. *Epipactis latifolia* Sw. t. r. vid Blommensberg, Fogelsången, Haga, Dufvebohl (Fristedt), Ålkistan (Elgenstierna), Kolbotten (Lindroth), Ahlby och Elfsta (Westfelt), Ågesta, stora Björknäs och Viksjö.
643. — *atrorubens* Hoffm. r. vid Ågesta i Huddinge socken (Elgenstierna).

644. *Epipactis palustris* Cr. t. r. på lilla Hessingen och Farsta äng vid Drefviken; vid Ulfsjön (Björnström), Aspvik på Wärmdön, Hesselby i Spånga, Riddersvik och på Svartsjölandet.
645. *Listera ovata* Br. t. r. i Friesens park; vid Carlberg, Drottningholm, Södergarn, Ulfsjön (Björnström) och Skuru; i Farsta äng vid Drefviken; på Wärmdön vid Tollarö, Farsta (Lagerheim) och Ekedal.
646. — *cordata* Br. flerst. t. ex. vid Carlberg, Solna, Kaknäs och Gångsätra.
647. *Neottia Nidus avis* Rich. t. r. vid Carlberg, Kaknäs, Gångsätra, Södergarn, Rydboholm, Skrubba och Ågesta; på Kersön, Kungshatt och Utön.
648. *Malaxis paludosa* Sw. flerst. t. ex. vid Ormsjön, Blommensbergs Långsjö, Ekhagsjön, Lötskärret, Gångsätra träsk, småsjöarne på Sicklaön, Brännkyrkssjön och Oremsviken.
649. *Corallorhiza innata* Br. flerst. t. ex. vid Carlberg, Haga, Skuggan, Gångsätra, Nacka, Dufnäs, Flaten, Skrubba och Hamra.
650. *Cypripedium Calceolus* L. r. funnen i Stockholms-trakten af Prof. Swartz, men stället är Utg. obekant.

### 78. *Irideae* Juss.

651. *Iris Pseudacorus* L. a. •
652. *Crocus vernus* All. r. vid Ulriksdal.

### 79. *Narcissineae* Juss.

653. *Narcissus Pseudonarcissus* L. r. vid Carlberg och Ulriksdal.
654. — *poëticus* L. t. r. vid Carlberg, lilla Alby och flerst. på Wärmdön t. ex. Eknäs.
- Galanthus nivalis* L. r. vid Erstavik (G. Berghman).

### 80. *Hydrocharideae* Juss.

655. *Stratiotes aloides* L. flerst. t. ex. i Brunnsviken, Bomsjön, Ulfundafjärden, Bromma kyrksjö, Råstasjön, Djurgårdsbrunnsviken, Hammarbysjö och Järlasjön.
656. *Hydrocharis Morsus ranæ* L. t. a.

### 81. *Najadeae* Link.

657. *Najas marina* L. r. i Husarviken, Lidingö kyrkvik och Norsviken på Wärmdön.

### 14. *Liliiflorae*.

#### 82. *Liliaceae* Juss.

658. *Tulipa sylvestris* L. t. r. vid Bellevue, Carlberg, Marieberg, Haga, Ulfsunda och Ulriksdal.
659. *Fritillaria Meleagris* L. flerst. t. ex. vid Rålambshof, Conradsberg, Johannelund, Haga, Ulriksdal, Stor-Sickla, Vinterviken och Skärholm.  
— *montana* Hoppe: r. vid Ulriksdal.
660. *Lilium bulbiferum* L. r. vid Carlberg och lilla Sickla (P. A. Ruus).
661. — *Martagon* L. t. r. vid Carlberg, Haga, lilla Sickla och Svindensvik.
662. *Allium Scorodoprasum* L. flerst. t. ex. i Friesens park; mellan Sickla och Skuru; mellan Kungsholmstull och Marieberg; vid Drottningholm, Svartsjö, Södergarn, Rydboholm och Edby, samt vid Tjustvik, Gustafsberg och Farsta på Wärmdön.
663. — *arenarium* L. flerst. t. ex. på Kastellholmen och Hästholmen; vid Sickla, Nacka, Rålambshof, Carlbergs alléen, öfra Frescati, Långängen, Drottningholm, Lofö kyrka, Skönstavik och Korsudden på Wärmdön.
664. — *ursinum* L. r. i Svartsjöpark.
665. — *oleraceum* L. a.  
— *β complanatum*: vid Lugnet.
666. — *Schoenoprasum* L. flerst. t. ex. på Kastellholmen, Skinnarviks-, Kungsholms- och Djurgårdsbergen.
667. *Ornithogalum nutans* L. r. vid Manilla (E. Giron) och Carlberg.
668. — *umbellatum* L. r. i Grindshage; vid st. Nyckelviken (Ruus) och på Waxholm.
669. *Gagea stenopetala* Reich. r. i Bergianska och Brehmerska trädgårdarne samt vid Ulriksdal.

670. *Gagea lutea* Ker: a.

671. — *minima* Schult. a.

672. *Muscari botryoides* Mill. t. r. på Valdemarsudden och Djurgården; vid Rörstrand, Vinterviken, Långbro, Ulfsunda och Ekholmsnäs.

*Asparagus officinalis* L. i Dufnäs park (Lindroth).

673. *Convallaria majalis* L. a.

674. — *Polygonatum* L. a.

675. — *multiflora* L. t. r. vid Carlberg, Haga och Tivoli; på Djurgårdens östra strand och på Svartsjölandet.

676. *Majanthemum bifolium* DC. a.

677. *Paris quadrifolia* L. t. a.

### 83. *Colchicaceae* DC.

678. *Colchicum autumnale* L. r. vid Ulriksdal.

### 84. *Alismaceae* Juss.

679. *Butomus umbellatus* L. a.

680. *Alisma Plantago* L. a.

*β lanceolata*: vid Aspvik.

681. *Sagittaria sagittifolia* L. a.

682. *Scheuchzeria palustris* L. flerst. t. ex. vid Hammarbysjö, småsjöarne på Sicklaön och Strålsjön; vid Söderby, Skarpneck, Pungpinan och st. Björknäs.

683. *Triglochin maritimum* L. t. a. på hafsstränderne, t. ex. på Blockhusudden, Fjäderholmarne och Hästholmen.

684. — *palustre* L. a.

### 85. *Juncaceae* DC.

685. *Juncus conglomeratus* L. t. a.

686. — *effusus* L. t. a.

687. — *filiformis* L. t. a.

688. — *sylvaticus* L. t. a.

689. — *articulatus* L. a.

*β aquaticus*: t. a.

690. — *alpinus* Vill. t. a.

691. *Juncus supinus* Mönch: flerst. t. ex. vid Hammarbysjö, Järla, Nacka, Dufnäs, Aspudden och Drevviken.  
 692. — *compressus* Jacq. a.  
           \* *Gerardi* Lois. t. a. på bafsstränderna.  
 693. — *bufonius* L. a.  
 694. *Luzula pilosa* W. a.  
 695. — *campestris* DC. a.  
           *δ pallescens*: flerst. t. ex. vid Solna, Drevviken och Mosjård i Färentuna.

## 15. Spadiciflorae.

### 86. Aroideae Juss.

696. *Calla palustris* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, Haga, Hammarbysjö och på Lidingön.  
 697. *Acorus Calamus* L. a.  
 698. *Lemna polyrrhiza* L. t. a.  
 699. — *gibba* L. flerst. t. ex. i Clarasjö, Hammarbysjö och Bomsjön.  
 700. — *minor* L. a.  
 701. — *trisolca* L. flerst. t. ex. i Clarasjö, Bomsjön, Fatburssjön och Hammarbysjö.

### 87. Potamogetoneae Fr.

702. *Potamogeton natans* L. a.  
 703. — *fluitans* Roth: r. på Väntholmen på Svartsjölandet.  
 704. — *rufescens* Schrad. flerst. t. ex. i Clarasjö, Hammarbysjö, Brännkyrkssjön och Drevviken; vid Aspvik på Wärmdön.  
 705. — *gramineus* L. flerst. t. ex. i Bomsjön, Hammarbysjö, Mörtviken, Gångsätra träsk och vid Nacka.  
 706. — *nitens* Web. flerst. t. ex. vid Carlberg, Långholmen, Gröndal och Räkningholmen; i Hammarbysjö och Drevviken samt på Svartsjölandet.  
 707. — *praelongus* Wulf. flerst. t. ex. i Norrström, Hammarbysjö, Brunnsviken, småsjöarne omkring Fogelsången, Brännkyrkssjön och Drevviken.

708. *Potamogeton lucens* L. flerst. t. ex. i Norrström, Clarasjö, Hammarbysjö och Brunnsviken.
709. — *dicipiens* Nolte: r. i Brunnsviken och Trehörningen i Brännkyrka sn (Lagerheim).
710. — *perfoliatus* L. a.  
       *β rotundifolius*: i Hammarbysjö (Lagerheim).
711. — *crispus* L. flerst. t. ex. i Clara-, Rörstrands- och Hammarbysjö; i Ulsundafjärden, Trekanten, Brunnsviken, Långsjöarne i Brännkyrka, Drevviken och Svartsjöviken.
712. — *zosterifolius* Schum. flerst. t. ex. i Clarasjö, Hammarbysjö, Bomsjön, Brunnsviken och Råstasjön.
713. — *acutifolius* Link: r. i Clarasjö och vid Hilleshög på Svartsjölandet.
714. — *obtusifolius* MK. r. i Clara-, Hammarby- och Brännkyrkssjön; vid Hilleshög.
715. — *compressus* L. flerst. t. ex. i Norrström, Surbrunnsviken, Hammarbysjö och Brunnsviken.
716. — *pusillus* L. t. r. vid Skuggan; i Råstasjö, Brännkyrkssjön och Drevviken.
717. — *gracilis* Fr. r. vid Täckä uddens Kärräng (Lagerheim).
718. — *zosteraceus* Fr. r. vid södra Stäket nära Bo Kapell.
719. — *pectinatus* L. t. a.
720. — *marinus* L. flerst. t. ex. vid stränderna af Wärtan, Askrikefjärden och Wärmdön.
721. *Zannichellia polycarpa* Nolte: flerst. t. ex. i Riddarefjärden, Husarviken, Edsviken samt vid Lidingöns och Wärmdöns stränder.
722. — *pedicellata* Fr. r. vid Bo på Wärmdön (Lagerheim).
723. *Zostera marina* L. r. vid Skuru (Lindroth) och Dalarö.

### 88. *Typhaceae* Juss.

724. *Typha latifolia* L. flerst. t. ex. i Ormträsket vid Bellevue, Brunnsviken, Rörstrandssjön, Carlbergssjön, Surbrunnsviken, Hammarbysjö och Sicklasundet.

725. *Typha angustifolia* L. a.

726. *Sparganium ramosum* Huds. t. a.

727. — *simplex* L. a.

728. — *natans* L. a.

\* *minimum* Fr. flerst. t. ex. vid Gångsätra tråk och Stocksund.

### 89. *Cyperaceae* Juss.

729. *Rhynchospora alba* Vahl: flerst. t. ex. vid Söderbrunn, Ekhagssjön, Lötskärret, småsjöarne på Lidingön och Sicklaön samt vid Pungpinan och Orem.

730. — *fusea* Vahl: t. r. vid småsjöarne på Sicklaön och Lidingön.

731. *Scirpus compressus* Pers. flerst. t. ex. i Grindshage; vid Aronsberg och Söderbrunn; på Ladugårdsgärdet och afrättsplatsen.

732. — *sylvaticus* L. flerst. t. ex. vid Skanstull, Barnängen, Sickla och Brunnsviken.

733. — *maritimus* L. flerst. t. ex. i Surbrunnsviken; på Djurgårdens östra strand samt på Lidingöns och Wärmdöns stränder.

734. — *lacustris* L. a.

β *glaucus*: a. på hafsstränderna.

735. — *pauciflorus* Lightf. flerst. t. ex. i Rörstrandshage vid Carlbergs alléen och vid Blommensbergs Långsjö, Ormsjön, Ekhagssjön, Uggelviken och Drevviken; i Isbladskärret.

736. *Heleocharis palustris* Br. a.

\* *uniglumis* Link: t. a.

737. — *acicularis* Br. a.

*Trichophorum cespitosum* Hn. uppgifves vara tagen vid Rinkeby i Spånga.

738. — *alpinum* Pers. flerst. t. ex. i Isbladskärret, Dufvebohls och Lötskärren; nära Experimentalfältet; vid småsjöarne på Sicklaön; vid Gångsätra, Pungpinan, Aspvik på Wärmdön och Huddinge prästgård.

739. *Eriophorum angustifolium* Roth: a.



740. *Eriophorum latifolium* Hop. t. r. i Isbladskärret; vid Laduviken, Råstasjön, Skrubba, Ahlby (Westfelt), samt på Svartsjölandet och Wärmdön.
741. — *gracile* Koch: t. r. i Isbladskärret; vid Carlberg, Blommensberg, Orem och Stubbsund.
742. — *vaginatum* L. t. a.
743. *Carex riparia* Curt. t. r. vid Ekhagssjön, Gångsätra, Ösby, Brännkyrkssjön, Magelungen, Aspen (Westfelt) och på Svartsjölandet.
744. — *vesicaria* L. a.
745. — *ampullacea* Good. a.
746. — *evoluta* Hn. r. uti Brännkyrkssjön, Flaten, Ösby- och Ekebyträsk. Uti Gångsätraträsk, som blifvit utdikadt, är den utgången.
747. — *filiformis* L. a.
748. — *hirta* L. t. a.  
        $\beta$  *hirtiformis*: r. på Mälarestränderna.
749. — *glauca* Scop. flerst. t. ex. vid Carlberg och Haga samt på Lidingön.
750. — *Pseudocyperus* L. t. a.
751. — *capillaris* L. flerst. t. ex. på Ladugårdsgärdet och Lidingön; vid Laduviken, Ekhagssjön, Drottningholm och Flaten.
752. — *pallescens* L. a.
753. — *limosa* L. t. a.
754. — *irrigua* Sm. r. mellan Skarpneck och Ältan; vid Mofjård i Färentuna.
755. — *Hornschuchiana* Hop. r. vid Ekhagssjön, Koppartappen nära Drevviken och Skrubba (Prof. Wahlberg).
756. — *fulva* Good. r. i Farsta äng vid Drevviken samt vid Skrubba.
757. — *flava* L. a.  
        $\beta$  *pygmæa*: t. a.
758. — *Oederi* Ehrh. t. a.
759. — *panicea* L. a.  
       \* *sublivida*: r. vid Oremsviken.
760. — *vaginata* Tausch: r. vid Häggesta, Ahlby och Flottsbro i Botkyrka (Westfelt).
761. — *livida* Wg. r. vid Oremsviken och på Kalfudden.

762. *Carex montana* L. r. vid Skrubba (Græve) och Svartsjö.  
 763. — *præcox* Jacq. a.  
 764. — *ericetorum* Poll. a.  
 765. — *pilulifera* L. t. a.  
 766. — *digitata* L. a.  
 767. — *Buxbaumii* Wg. r. vid Rastaborg på Ekerön.  
 768. — *aquatilis* Wg. flerst. t. ex. vid Skeppsholmen, Kastellholmen, Surbrunnsviken och Lidingöbro.  
 769. — *stricta* Good. t. r. vid Haga, Skansen nära Edsviken (Cederstråhle), Strålsjön och Trehörningen (Lagerheim).  
 770. — *acuta* L. a.  
        $\beta$  *fluvialis*: t. a.  
       \* *prolixa* Fr. flerst. t. ex. vid Gröndal, Ormsjön, Skansen nära Edsviken och på Svartsjölandet.  
 771. — *tricostata* Fr. r. vid Svartsjö och på Däfvensön.  
 772. — *vulgaris* Fr. a.  
        $\delta$  *juncella*: r. vid Gröndal (Lagerheim).  
 773. — *turfosa* Fr. r. vid Squalten och Landholmen i Skå socken.  
 774. — *cæspitosa* L. a.  
 775. — *remota* L. t. r. vid Nacka, Drevviken, Häggesta (Westfelt), Gustafsberg och Tjustvik.  
 776. — *microstachya* Ehrh. r. vid Squalten, Sandsjön, Tjustvik och Ahlby (Westfelt).  
 777. — *elongata* L. t. a.  
 778. — *stellulata* Schreb. a.  
 779. — *cancescens* L. a.  
 780. — *loliacea* L. t. r. vid Nacka (Björnström) Drevviken, Brännkyrks-Sätra, Wårby, Häggesta (Westfelt) och på Lidingön.  
 781. — *norvegica* Wg. t. r. i lsbladskärret; vid Laduviken, Lidingöbro, Gångsätra, Ekholmsnäs och Gustafsberg.  
 782. — *leporina* L. a.  
 783. — *disticha* Good. a.  
 784. — *chordorrhiza* Ehrh. t. r. vid Träsket, Bellevue, Ekbagssjön, Gångsätraträsk, Blommensbergs Långsjö och Brännkyrkssjön.

785. *Carex vulpina* L. t. a.  
 786. — *muricata* L. a.  
 787. — *paniculata* L. r. vid Ryssviken och Brunnsviken.  
 788. — *teretiuscula* Good. t. a.  
       *β crassior*: r. vid Blommensbergs Långsjö  
       och Drefviken.  
 789. — *paradoxa* W. t. r. vid Brunnsviken, Ekhags-  
       sjön, Råstasjön, Löstkärret (Fristedt), Bränn-  
       kyrkssjön och på Svartsjölandet.  
 790. — *pauciflora* Lightf. t. r. vid Sickla Lillsjö,  
       Squalten, Sandsjön, Pungpinan, Wårby och  
       Ellenhill.  
 791. — *pulicaris* L. t. r. vid afrättsplatsen (Professor  
       Wahlberg), Kolbotten, Flaten, Blommens-  
       berg, Ormsjön, Wårby och Ösbyträsk. Äfven  
       uppgifven för Djurgården.  
 792. — *dioica* L. t. a.

## 16. Glumiflorae.

### 90. Gramineae Juss.

793. *Triticum repens* L. a.  
       *β arvense*: t. a.  
 794. — *caninum* L. flerst. t. ex. vid Carlberg, Djur-  
       gårdsslätten, Ryssviken och Djurgårdsbrunn.  
 795. *Elymus arenarius* L. på de yttre hafsstränderne, t. ex.  
       vid stora Tjustvik, på Ingarön, Sandön och  
       Muskön.  
       *Hordeum murinum* L. träffas någon gång på Kastell-  
       holmen.  
 796. *Lolium temulentum* L. t. r. på Bisköpsudden; vid  
       Fatburssjön, Ellenhill, Söderby, Sköndalsbro  
       och Balingsta.  
 797. — *Linicola* Sond. r. vid Hamra (Westfelt) och  
       på Björkön.  
 798. — *perenne* L. a.  
 799. *Brachypodium pinnatum* PB. t. r. vid Experimen-  
       talfältet, Skuggan, Svartsjö (Westfelt); mel-  
       lan Ågesta och Balingsta, samt vid Farsta på  
       Wärmdön (Lagerheim).

800. *Brachypodium gracile* PB. r. på Kungshatt och Skräddareholmen i Mälaren.
801. *Cynosurus cristatus* L. flerst. t. ex. på Djurgårdsslätten; vid Carlberg, Marieberg och Danvikskrokar.
802. *Dactylis glomerata* L. a.  
       *β lævigata*: flerst. t. ex. på Djurgården.
803. *Festuca gigantea* Vill. r. vid Nyckelviken (Westfelt), Brännkyrks-Sätra och Svartsjö.
804. — *arundinacea* Schreb. t. a.
805. — *elatior* L. a.  
       *β subuloliacea*: r. vid Farsta på Wärmdön (Lagerheim).
806. — *rubra* L. a.
807. — *duriuscula* Fr. r. på Svartsjölandet.
808. — *ovina* L. a.
809. *Schedonorus erectus* Fr. r. i Gröndals park.
810. — *asper* Fr. r. vid Gröndal, Svartsjö och Kaggeholm. (I Gröndals park hafva både H:ne Lagerheim och Utg. förgäfves sökt denna växt)  
       — *sterilis* Fr. r. tagen 2:ne år å rad på Stads-trädgårdsgatan på Söder, men icke sedan återfunnen der.
811. — *tectorum* Fr. a.
812. *Bromus secalinus* L. a.
813. — *arvensis* L. t. a.
814. — *mollis* L. a.  
       *β glabratus*: t. a.  
       \* *hordeaceus* Wg. t. a.
815. *Briza media* L. a.
816. *Poa pratensis* L. a.
817. — *compressa* L. a.
818. — *trivialis* L. a.
819. — *serotina* Ehrh. t. a.
820. — *nemoralis* L. a.
821. — *bulbosa* L. flerst. t. ex. på Kastellholmen och Tyskbagarbergen; vid Rörstrand, Marieberg och Stocksund.
822. — *annua* L. a.
823. *Glyceria fluitans* Br. a.

824. *Glyceria spectabilis* MK. flerst. t. ex. i Fatburssjön och Clarasjö; vid Djurgårdsbrunn, Carlberg och Skuggan.
825. — *conferta* Fr. r. på Utön (Wahlström).
826. — *distans* Wg. flerst. t. ex. på Kastellholmen och Nytorget; vid Fatburssjön, Clarasjö och Sabbatsberg.
827. — *aquatica* Presl. flerst. t. ex. i Clarasjö, Fatburssjön, Hammarbysjö, Bomsjön och Djurgårdsbrunnsviken.
828. *Molinia coerulea* Mönch: flerst. t. ex. vid Långgården, Pungpinan, Carlbergs alléen, Ingenting, Ellenhill och Djurgårdsbrunn.
829. *Triodia decumbens* PB. t. a.
830. *Koeleria cristata* Pers. r. uppgifven i Liljeblads Flora att växa »i Stockholmskären», men växtstället är icke närmare bekant.
831. *Avena fatua* L. t. a. bland vårsäd.
832. — *elatior* L. a.
833. — *pubescens* L. a.
834. — *pratensis* L. t. a.
835. — *flavescens* L. flerst. t. ex. på Observatorii-backen; vid Carlberg, Ingenting, Rörstrand, Gröndal och Skuru.
836. *Aira caespitosa* L. a.
837. — *flexuosa* L. a.
838. *Holcus lanatus* L. flerst. t. ex. i Friesens och Haga parker; vid Blommensberg, Ormsjön, Christneberg, Husarviken, och på Kranholmen i Mälaren.
839. *Melica ciliata* L. t. r. vid Dockan, Norsborg, Ahlby och Häggesta (Westfelt); på Kungshatt och vid Beatelund på Wärmdön (Sjögren).
840. — *nutans* L. a.
841. — *uniflora* Retz. r. vid st. Tjustvik på Wärmdön.
842. *Phragmites communis* Fr. a.
843. *Calamagrostis arundinacea* Roth: t. a.
844. — *epigejos* Roth: t. a.
845. — *Halleriana* DC. r. på Väntholmen och öar i Görvältn.
- γ *gracilesens*: på Väntholmen.

846. *Calamagrostis stricta* Hn. t. a.  
 847. — *lanceolata* Roth: t. a.  
 848. *Apera Spica venti* PB. t. a.  
 849. *Agrostis stolonifera* L. t. a.  
 850. — *vulgaris* With. a.  
 851. — *canina* L. a.  
     \* *montana*: r. vid Rörstrand.  
 852. *Milium effusum* L. flerst. t. ex. i Friesens park;  
     vid Carlberg, Gröndal, Hamra och Tullinge.  
 853. *Setaria viridis* PB. t. r. på Kastellholmen; vid  
     Smedsudden, Conradsberg, Dockan (Björn-  
     ström), Huddinge prästgård (Ljunggren)  
     och Elfsta i Botkyrka.  
 854. *Sesleria coerulea* Ard. flerst. t. ex. vid Carlberg, In-  
     genting, Lilljans, Laduviken och Pungpinan.  
 855. *Alopecurus pratensis* L. a.  
     \* *nigricans* Horn. flerst. t. ex. vid Fatburs-  
     sjön, Surbrunnsviken, Hammarbysjö och  
     Kastellholmen.  
 856. — *geniculatus* L. a.  
     *β fulvus* Sm. a.  
 857. — *agrestis* L. r. på Biskopsudden.  
 858. *Phleum pratense* L. a.  
     *β nodosum*: flerst. t. ex. på Kastellholmen  
     och Djurgården; vid Carlberg och In-  
     genting.  
 859. — *Böhmeri* Wib. flerst. t. ex. vid Sabbatsberg  
     och Carlberg; på Djurgården och Hästholmen.  
 860. *Baldingera arundinacea* Dum. a.  
     *Phalaris canariensis* L. flerst. uppkommen af spilldt  
     Kanariefrö.  
 861. *Hierochloa borealis* Röm. et Schult. flerst. t. ex. på  
     Biskopsudden; vid Manilla och Djurgårds-  
     brunn; på Hästholmen och Fjäderholmarne;  
     vid Dufnäs och Öhr.  
     \* *fragrans* R. S. r. vid Mofjård på Svart-  
     sjölandet (C. Lagerheim).  
 862. *Anthoxanthum odoratum* L. a.  
 863. *Nardus stricta* L. flerst. t. ex. vid Djurgårdsslätten,  
     Carlbergs alléen och Nacka Damsjö.

### III. HETERONEMEA E.

#### 17. Filices.

##### 91. *Polypodiaceae* R. Br.

864. *Polypodium vulgare* L. a.  
 865. — *Phegopteris* L. a.  
 866. -- *Dryopteris* L. a.  
 867. *Polystichum Thelypteris* Roth: flerst. t. ex. vid Hammarbysjö, Haga, Ormsjön, Trekanten, Flaten och på Lidingön.  
 868. --- *Filix mas* Roth: a.  
 869. --- *cristatum* Roth: t. r. vid Blommensberg, Brännkyrkssjön, Bromma Kyrksjö, Ekhagssjön, Lötskärret (Fristedt), Uggelviken, Råstasjön och på Muskön (Wahlström). Uppgifves af Næzén för Djurgården.  
 870. --- *spinulosum* DC. a.  
       *β dilatatum*: a.  
 871. *Cystopteris fragilis* Bernh. a.  
 872. *Woodsia ilvensis* Br. a.  
 873. *Asplenium Filix femina* Bernh. a.  
 874. -- *Trichomanes* L. a.  
 875. -- *Ruta muraria* L. r. vid Tanto (Elgenstierna) och Ingemarshof; på Danviksbergen och på Utön.  
 876. -- *Breynii* Retz. flerst. t. ex. vid Tanto, Liljeholmen, Vinterviken, Marieberg, Ingemarshof, Danviken, Stubbsund o. s. v.  
 877. --- *septentrionale* Hoffm. a.  
 878. *Pteris aquilina* L. a.  
 879. *Stutthiopteris germanica* Willd. t. r. vid Nacka, Drevviken, Älta, Tjustvik, Wårby och Högtorp.

##### 92. *Ophioglosseae* R. Br.

880. *Botrychium Lunaria* L. flerst. t. ex. vid Skanstull, Mörtviken, Fogelsången, Carlberg, Lidingöbro, Dufnäs och Waxholm.

881. *Ophioglossum vulgatum* L. r. vid Carlberg (Græve) och Dufnäs (Lindroth); vid Farsta nära Magelungen och på Långängens holme i Wärtan (Sjögren).

### 93. *Marsileaceae* R. Br.

882. *Isoetes lacustris* L. flerst. t. ex. vid Tranbergssbro; i Vinterviken, Flatén och Dreviken.

### 94. *Lycopodiaceae* Sw.

883. *Lycopodium Selago* L. flerst. t. ex. vid Solna, Vinterviken, Nacka, Gångsätra och Stockby i Danderyd.  
 884. — *annotinum* L. a.  
 885. — *clavatum* L. t. a. serdeles söder om staden.  
 886. — *complanatum* L. r. vid Nacka, Gångsätra (Sjögren) och Dufvebohl (Fristedt)

Af ofvanstående synes, att de i katalogen upptagne, med nummer försedde, 386 arterne tillhöra 94 Växtfamiljer och äro sålunda fördelade, att de artrikaste familjerne äro:

Synanthereæ . med 75 arter.	Potamogetoneæ med 22 arter.
Gramineæ . . » 71 »	Orchideæ . . . » 20 »
Cyperaceæ . . » 64 »	Liliaceæ . . . » 20 »
Crucifereæ . . » 47 »	Alsineæ . . . » 17 »
Papilionaceæ . » 41 »	Boragineæ . . » 16 »
Senticosæ . . » 36 »	Ericineæ . . . » 16 »
Personatæ . . » 36 »	Polypodiaceæ . » 16 »
Labiataæ . . . » 26 »	Gruinales . . . » 13 »
Ranunculaceæ » 26 »	Silenaceæ . . . » 13 »
Umbelliferæ . . » 22 »	Salicineæ . . . » 13 »
Polygoneæ . . » 22 »	Chenopodiaceæ » 13 »



## Register öfver Familjer och Släkten.

- Acer 21.  
*Acerineæ* 21.  
 Achillea 6.  
 Aconitum 22.  
 Acorus 31.  
 Actæa 23.  
 Adoxa 21.  
*Adoxeæ* 21.  
 Aegopodium 20.  
 Aesculus 21.  
 Aethusa 20.  
 Agrimonia 35.  
 Agrostemma 30.  
 Agrostis 59.  
 Aira 58.  
 Ajuga 14.  
 Alchemilla 35.  
 Alisma 50.  
*Alismaceæ* 50.  
 Alliaria 24.  
 Allium 49.  
 Alnus 45.  
 Alopecurus 59.  
*Alsinaceæ* 31.  
*Amarantaceæ* 43.  
 Amarantus 43.  
 Anagallis 18.  
 Anchusa 11.  
 Andromeda 40.  
 Androsace 18.  
 Anemone 22.  
 Anethum 20.  
 Angelica 20.  
 Antennaria 6.  
 Anthemis 6.  
 Anthoxanthum 59.  
 Anthyllis 59.  
 Antirrhinum 15.  
 Apera 59.  
 Aquilegia 22.  
 Arabis 25.  
*Araliaceæ* 19.  
 Arctostaphylos 39.  
 Arenaria 31.  
 Aristolochia 42.  
*Aristolochiaceæ* 42.  
 Armeria 18.  
*Aroideæ* 57.  
 Artemisia 6.  
 Asparagus 30.  
 Asperugo 12.  
 Asperula 9.  
 Asplenium 60.  
 Aster 7.  
 Astragalus 38.  
 Atriplex 43.  
 Avena 58.  
 Baldingera 59.  
 Ballota 13.  
*Balsamineæ* 27.  
 Barbarea 25.  
 Batrachium 22.  
 Bellis 7.  
*Berberideæ* 23.  
 Berberis 23.  
 Betula 45.  
*Betulineæ* 45.  
 Bidens 5.  
 Blitum 43.  
*Boragineæ* 11.  
 Botrychium 60.  
 Brachypodium 56.  
 Brassica 23.  
 Briza 57.  
 Bromus 57.  
 Bryonia 32.  
 Bulliarda 53.  
 Bunias 25.  
 Butomus 50.  
 Cakile 25.  
 Calamagrostis 58.  
 Calamintha 12.  
 Calla 51.  
 Callitriche 46.  
*Callitricheæ* 46.  
 Calluna 40.  
 Caltha 22.  
 Camelina 26.  
 Campanula 10.  
*Campanulaceæ* 10.  
 Capsella 26.  
*Caprifoliaceæ* 10.  
 Cardamine 24.  
 Carduus 7.  
 Carex 54.  
 Carlina 7.  
 Carpinus 44.  
 Carum 20.  
 Centaurea 7.  
 Cephalanthera 47.  
 Cerastium 31.  
*Ceratophylleæ* 46.  
 Ceratophyllum 46.  
 Cerefolium 19.  
 Chærophyllum 19.  
 Chara 46.  
*Characeæ* 46.  
 Chelidonium 23.  
*Chenopodiaceæ* 43.  
 Chenopodium 43.  
 Chrysanthemum 5.  
 Chrysosplenium 52.  
 Cichorium 8.  
 Cicutæ 20.  
*Circææ* 34.  
 Cirsium 7.  
*Cistineæ* 29.  
 Clinopodium 13.  
 Cochlearia 26.  
 Coeloglossum 47.  
*Colchicaceæ* 50.  
 Colchicum 50.  
 Comarum 36.  
*Coniferæ* 45.  
 Conium 19.  
*Coniortæ* 14.  
 Convallaria 50.  
*Convolvulaceæ* 11.  
 Convolvulus 11.  
 Corallorhiza 48.  
*Corneæ* 19.  
 Cornus 19.  
 Corydalis 23.  
 Corylus 44.  
 Cotoneaster 34.  
*Crassulaceæ* 33.  
 Cratægus 34.  
 Crepis 8.  
 Crocus 48.  
*Cruciferæ* 23.  
*Cucurbitaceæ* 52.  
*Cupuliferæ* 44.  
 Cuscuta 11.  
 Cynanchum 14.  
 Cynoglossum 12.  
 Cynosurus 37.  
*Cyperaceæ* 53.  
 Cypridium 48.  
 Cystopteris 60.  
 Dactylis 57.  
 Daphne 42.  
 Daucus 19.  
 Delphinium 22.  
 Dentaria 24.  
 Dianthus 30.  
 Diplotaxis 24.  
*Dipsaceæ* 9.  
 Draba 26.  
 Dracocephalum 13.  
 Drosera 29.  
*Droseraceæ* 29.  
*Drupaceæ* 56.  
 Echinospermum 12.  
 Echium 12.  
 Elatine 32.  
*Elatinææ* 32.  
 Elsholtzia 12.  
 Elymus 56.

*Empetrea* 46.  
*Empetrum* 40.  
*Epilobium* 33.  
*Epipactis* 47.  
*Equisetaceæ* 45.  
*Equisetum* 45.  
*Ericineæ* 39.  
*Erigeron* 7.  
*Eriophorum* 33.  
*Erodium* 28.  
*Erym* 38.  
*Erysimum* 24.  
*Erythræa* 14.  
*Eupatorium* 7.  
*Euphorbia* 40.  
*Euphorbiaceæ* 40.  
*Euphrasia* 16.

*Fagopyrum* 41.  
*Fagus* 44.  
*Farsetia* 26.  
*Festuca* 57.  
*Ficaria* 22.  
*Filago* 7.  
*Fragaria* 36.  
*Frangulaceæ* 19.  
*Frankenia* 32.  
*Fraxinus* 14.  
*Fritillaria* 49.  
*Fumaria* 23.  
*Fumariaceæ* 23.

*Gagea* 49.  
*Galanthus* 48.  
*Galeopsis* 13.  
*Galium* 10.  
*Gentiana* 14.  
*Gentianeæ* 14.  
*Geranium* 27.  
*Geum* 36.  
*Glaux* 18.  
*Glechoma* 13.  
*Glyceria* 57.  
*Gnaphalium* 6.  
*Goodyera* 47.  
*Gramineæ* 56.  
*Gruinales* 27.  
*Gymnadenia* 47.  
*Gypsophila* 30.

*Halorhageæ* 34.  
*Hedera* 19.  
*Heleocharis* 53.  
*Helianthemum* 29.  
*Heracleum* 20.  
*Herninium* 47.  
*Herniaria* 41.  
*Hesperis* 24.  
*Hieracium* 8.  
*Hierochloa* 59.  
*Hippuris* 34.

*Holcus* 58.  
*Hordeum* 56.  
*Hottonia* 18.  
*Humulus* 42.  
*Hutchinsia* 26.  
*Hydrocharideæ* 48.  
*Hydrocharis* 48.  
*Hyoscyamus* 15.  
*Hypericineæ* 28.  
*Hypericum* 28.  
*Hypochæris* 9.

*Jasione* 11.  
*Impatiens* 27.  
*Inula* 7.  
*Irideæ* 48.  
*Iris* 48.  
*Isatis* 25.  
*Isoetes* 61.  
*Juncaceæ* 50.  
*Juncus* 50.  
*Juniperus* 45.

*Koeleria* 58.

*Labiata* 12.  
*Lactuca* 8.  
*Lamium* 15.  
*Lappa* 7.  
*Lapsana* 8.  
*Laserpitium* 20.  
*Lathræa* 17.  
*Lathyrus* 37.  
*Lavatera* 27.  
*Ledum* 40.  
*Lemna* 51.  
*Lentibulariæ* 17.  
*Leontodon* 9.  
*Leonurus* 13.  
*Lepidium* 26.  
*Levisticum* 20.  
*Libanotis* 20.  
*Ligustrum* 14.  
*Liliaceæ* 49.  
*Lilium* 49.  
*Limosella* 16.  
*Linaria* 15.  
*Linnaea* 10.  
*Linum* 28.  
*Listera* 48.  
*Lithospermum* 12.  
*Littorella* 18.  
*Lobelia* 11.  
*Lobeliaceæ* 11.  
*Lolium* 56.  
*Lonicera* 10.  
*Loranthaceæ* 10.  
*Lotus* 38.  
*Luzula* 51.  
*Lychnis* 30.  
*Lycopodiaceæ* 61.

*Lycopodium* 61.  
*Lycopsis* 12.  
*Lycopus* 12.  
*Lysimachia* 17.  
*Lythrarieæ* 53.  
*Lythrum* 33.

*Majanthemum* 50.  
*Malachium* 31.  
*Malaxis* 48.  
*Malva* 27.  
*Malvaceæ* 27.  
*Marrubium* 14.  
*Marsileaceæ* 61.  
*Marticaria* 6.  
*Medicago* 38.  
*Melampyrum* 17.  
*Melandrium* 30.  
*Melanosinapis* 24.  
*Melica* 58.  
*Melilotus* 38.  
*Mentha* 12.  
*Menyantheæ* 14.  
*Menyanthes* 14.  
*Mercurialis* 40.  
*Milium* 59.  
*Molinia* 58.  
*Monotropa* 40.  
*Montia* 41.  
*Muscari* 50.  
*Myosotis* 12.  
*Myosurus* 22.  
*Myrica* 45.  
*Myricæ* 45.  
*Myriophyllum* 34.  
*Myrrhis* 19.  
*Myrtillus* 39.

*Najadeæ* 49.  
*Najas* 49.  
*Narcissineæ* 48.  
*Narcissus* 48.  
*Nardus* 59.  
*Nasturtium* 25.  
*Naumburgia* 18.  
*Neottia* 48.  
*Nepeta* 15.  
*Neslia* 25.  
*Nuphar* 21.  
*Nymphaea* 21.  
*Nymphæaceæ* 21.

*Odontites* 16.  
*Oenanthe* 20.  
*Oenothera* 33.  
*Oleineæ* 14.  
*Onagrariæ* 33.  
*Onobrychis* 38.  
*Ononis* 39.  
*Onopordon* 7.  
*Ophioglosseæ* 60.

Ophioglossum 61.  
*Orchideæ* 46.  
 Orchis 46.  
 Origanum 12.  
 Ornithogalum 49.  
 Orobus 37.  
 Oxalis 28.  
 Oxycoccus 59.

Papaver 23.  
*Papaveraceæ* 23.  
*Papilionaceæ* 37.  
 Paris 80.  
 Parnassia 29.  
*Paronychieæ* 41.  
 Pastinaca 20.  
 Pedicularis 17.  
 Peplis 33.  
*Personatæ* 15.  
 Petasites 7.  
 Peucedanum 20.  
 Phalaris 89.  
 Phleum 89.  
 Phragmites 88.  
 Pimpinella 20.  
 Pinguicula 17.  
 Pinus 45.  
 Pisum 37.  
*Plantagineæ* 18.  
 Plantago 18.  
 Platanthera 47.  
*Plumbagineæ* 18.  
 Poa 87.  
*Polemoniaceæ* 14.  
 Polemonium 14.  
 Polygala 26.  
*Polygaleæ* 26.  
*Polygonææ* 41.  
 Polygonum 41.  
*Polypodiaceæ* 60.  
 Polypodium 60.  
 Polystichum 60.  
*Pomaceæ* 34.  
 Populus 44.  
*Portulacaceæ* 41.  
 Potamogeton 81.  
*Potamogetoneæ* 81.  
 Potentilla 36.  
 Poterium 33.  
 Primula 18.  
*Prtnulaceæ* 17.  
 Prunella 13.  
 Prunus 36.  
 Pteris 60.  
 Pulmonaria 12.  
 Pulsatilla 22.  
 Pyrola 40.  
 Pyrus 34.

Quercus 44.  
*Ranunculaceæ* 21.  
 Ranunculus 21.  
 Raphanus 25.  
 Reseda 21.  
*Resedaceæ* 21.  
 Rhamnus 19.  
 Rheum 42.  
 Rhinanthus 16.  
 Rhynchospora 53.  
 Ribes 32.  
*Ribesiaceæ* 32.  
 Rosa 35.  
*Rubiaceæ* 9.  
 Rubus 35.  
 Rumex 41.

Sagina 31.  
 Sagittaria 80.  
*Salicineæ* 44.  
 Salix 44.  
 Sambucus 9.  
 Samolus 18.  
 Sanicula 20.  
 Saponaria 39.  
 Saxifraga 52.  
*Saxifrageæ* 52.  
 Scabiosa 9.  
 Sceptum 17.  
 Schedonorus 87.  
 Scheuchzeria 80.  
 Scirpus 53.  
 Scleranthus 41.  
 Scorzonera 8.  
 Scrophularia 18.  
 Scutellaria 18.  
 Sedum 33.  
 Selinum 20.  
 Senecio 6.  
*Senticosæ* 35.  
 Serratula 7.  
 Sesleria 89.  
 Setaria 89.  
*Silenaceæ* 30.  
 Silene 30.  
 Sinapis 25.  
 Sisymbrium 24.  
 Sium 20.  
*Solanaceæ* 15.  
 Solanum 15.  
 Solidago 7.  
 Sonchus 8.  
 Sorbus 34.  
 Sparganium 83.  
 Spargula 31.  
 Spergularia 31.  
 Spiræa 36.  
 Stachys 13.

Stellaria 31.  
 Stratiotes 48.  
 Struthiopteris 60.  
 Subularia 26.  
 Succisa 9.  
 Symphytum 11.  
*Synantherææ* 8.  
 Syringa 14.

Tanacetum 6.  
 Taraxacum 9.  
 Taxus 45.  
 Thalictrum 22.  
 Thlaspi 26.  
*Thymeleæ* 42.  
 Thymus 12.  
 Tilia 27.  
*Tiliaceæ* 27.  
 Torilis 19.  
 Tragopogon 8.  
 Trichera 9.  
 Trichophorum 53.  
 Trientalis 17.  
 Trifolium 38.  
 Triglochin 80.  
 Triodia 58.  
 Tripleurospermum 6.  
 Triticum 56.  
 Trollius 22.  
 Tulipa 49.  
 Turritis 25.  
 Tussilago 7.  
 Typha 82.  
*Typhaceæ* 82.

*Ulmaceæ* 42.  
 Ulmus 42.  
*Umbelliferæ* 19.  
 Urtica 43.  
*Urticaceæ* 42.  
 Utricularia 17.

Vaccinium 59.  
 Valeriana 9.  
*Valerianeæ* 9.  
 Valerianella 9.  
 Verbascum 18.  
 Veronica 16.  
 Viburnum 9.  
 Vicia 37.  
 Viola 29.  
*Violariææ* 29.  
 Viscaria 30.  
 Viscum 10.

Woodsia 60.

Zannichellia 32.  
 Zostera 82.



## BIHANG

till K. Fr. Thedenii förteckning öfver  
<sup>1</sup>  
Stockholmstraktens Phanerogamer och Ormbunkar,  
innefattande några kännetecken för nämnda trakts allmän-  
naste, såväl vilda, som odlade, växter.

### Fam. *Synanthereae*.

*Character: \**) Blommorna i blomkorg. Ståndarne fem, med knapparne sammanväxta till ett rör omkring pistillens stift. Frukten: en enfrölig skalfrukt med fröet utan fröhvite.

De skandinaviska växterna af denna stora familj äro örter med enkla, vanligen skiftevisa blad. Blommorna dels rörformiga, dels tunglika. Blomfodret fastväxt omkring frukten och vanligen nående öfver densamma, bildande en pensel eller hinnkant.

Alla *Synanthereae* tillhöra klassen Syngenesia. *N* 1—32 tillhöra Ordn. Polyclinia äfvensom Ordn. Polygamia superflua, utom Filago, som tillhör Polygamia necessaria. — *N* 33—75 tillhöra Polygamia æqualis, utom Centaurea, som tillhör Polygamia frustanea.

Afd. 1. *Corymbiferae*: De tvåkönade blommorna rörformiga med cylindriskt stift.

1. *Brunskära*. ☉\*\*), 1—2 fot hög. Bladen motsatta, tredelade. Blomkorgarne utan strålblommor. Frukthorster 2 eller 3. Blommorna gula. 7, 8\*\*\*). Stränder.
4. *Prestkrage*. 4, omkring alnshög. Stjelkladen skiftevisa, lancettlikt aflånga, sågade; rotbladen spadlika. Strålblommorna hvita. 7. Backar.
6. *Sölblomster*. ☉, fotshög. Bladen dubbelt parbladigt delade med trådsmla flikar. Blomfästet kägellikt, ihålligt bart. Strålblommorna hvita. 6. Åkrar.

\*) Alla i detta bihang upptagna kännetecken afse endast de svenska växterna.

\*\*) ☉ = Ettårig ört; ☉ = tvåårig ört; 4 = flerårig ört.

\*\*\*) Dessa siffror utmärka månaden, då växten blommar.

Stockholm

1857

7. *Surkulla*. ☉, 1—2 fot hög. Bladen som föregående. Blomfästet halfrundt, bart. Strålblommorna hvita. 6—8. Åkrar.
8. *Färgkulla*. ☿, alnshög. Bladen parbladigt delade. Blomfästet fjälligt. Blommorna gula. 6, 7. Backar.
12. *Backhumla*. ☿, fotshög eller högre. Bladen dubbelt parbladigt delade. Blomfästet fjälligt. Blomkorgarne små, i jemnhög qvast, med hvita strålblommor. 7—9. Backar.
13. *Rensfana*. ☿, alnshög. Bladen parbladigt delade. Blomkorgarne utan strålblommor, i jemnhög qvast, med gula blommor. 8, 9. Backar.
14. *Malört*. ☿, 1—2 alnar hög. Bladen tredubbelt parbladigt delade, gråfudna på båda sidor. Strålblommor saknas; diskblommorna gula. 8. Backar, gårdar.
15. *Gråbo*. ☿, 1—2 alnar hög. Bladen dubbelt parbladigt delade, under hvitfudna. Strålblommor saknas; diskblommorna gulbruna. 8. Backsluttningar, vägkanter.
20. *Boört*. ☉, fotshög. Bladen pardelade. Blomkorgarne utan strålblommor, lutande, med gula blommor. 6—10. Odlade ställen.
21. *Tofsblomster*. ☉, kvartershög. Bladen smalt lancettlika, hvitfudna. Blomkorgarne gyttrade i toppen och bladvecken, utan strålblommor. Blommorna bruna. 7, 8. Fuktiga ställen, dikes- och vägkanter.
22. *Tofsblomster*. ☿, fotshög. Bladen jemnbreda, under fudna. Blomkorgarne gyttrade i axform, utan strålblommor. Blommorna bruna. 8. Skogsbackar.
23. *Kattfot*. ☿, kvartershög. Rotbladen spadlika, stielkbladen jemnbreda, spetsiga, ulliga. Blomkorgarne dioica, utan strålblommor, i enkel qvast. Bl. röda eller hvita. 5, 6. Backar.
24. *Ullblomster*. ☉. Stielken grenig, fotshög. Bladen lancettlika, ulliga. Blomkorgarne gyttrade, ulliga. Blommorna gulaktiga. 6, 7. Backar. (Polyg. necessaria.)
27. *Strandaster*. ☿, fotshög. Bladen jemnbreda, köttiga. Blomkorgarne i qvast, med blå strålblommor. 7, 8. Hafsstränder.
28. *Binka*. ☿, fotshög. Stielkbladen jemnbredt lancettlika, rotbladen tunglika. Blomkorgarne i klase, med smala, rödletta strålblommor. 7. Backar.
29. *Guldريس*. ☿, alnshög. Bladen bredt lancettlika. Blomkorgarne i spira, med gula strålblommor. 7—9. Berg, lundar.
32. *Hästhof*. ☿, kvartershög. Bladen från roten, rundadt hjertlika. Stielken fjällig, enblomstrig, med gula strålblommor. 3—5. Leriga åkrar, dikeskanter.

Afd. 2. *Cynarocephalæ*: De tvåkånade blommorna rörformiga, med stiftet under märket uppsväldt till en knöl.

34. *Rödclint*. ☿, fotshög. Bladen lancettlika. Blommorna röda; kantblommorna större än diskblommorna, könlösa. 7, 8. Backar, åkerrenar. (Polyg. frustreauea.)

35. *Blåklint*. ☉, alnshög. Bladen jemnbreda. Blommorna blå, bildade som föreg. 6, 7. Åkrar.
37. *Spåmanstistel*. ☉, fotshög. Bladen lancettlika, flåkiga, tornbräddade. Blomkorgarnes inre holkfjäll jemnbreda, oväpnade, de yttre väpnade. Småblommorna brunaktiga. 7, 8. Backar.
39. *Krustistel*. ☉, alnshög. Bladen bredt lancettlika, fint tornbräddade. Blomkorgarne oväpnade. Skalkfrukterna med hårpensel. Blommorna violetta. 7, 8. Åkrar.
40. *Vägtistel*. ♀, alnshög. Bladen pardelade, med tvåklufna, tornspetsade flikar. Holkfjällen tornspetsade. Blommorna röda. 7, 8. Backar, vägkanter.
41. *Kärrtistel*. ♀, famnshög. Bladen nedlöpande, med små, tornspetsade flikar. Blommorna gylltrade, oväpnade. Skalkfrukterna med fjunpensel. Blommorna violetta. 7, 8. Fuktiga ångar.
42. *Åkertistel*. ♀, alnshög. Bladen lancettlika, tornbräddade. Blomkorgarne i qvasflik vippa, oväpnade. Skalkfrukterna med fjunpensel. Blommorna violetta. 7, 8. Åkrar.
44. *Kardborre*. ♀, 3 fot hög. Bladen hjertlikt äggrunda. Blomkorgarne nättulliga, med krokuddiga holkfjäll. Blommorna violetta. 7, 8. Gårdar. vägkanter.
46. *Kardborre*. ♀, 3 fot hög. Bladen som föreg. Blomkorgarne nästan glatta, med krokuddiga holkfjäll. Blommorna ljusröda. 7, 8. Gårdar, vägkanter.

Afd. 3. *Cichoriaceæ*: Alla blommorna tvåkönade och tunglika.

48. *Fettistel*. ☉, 3—4 fot hög. Bladen lancettlika, nedåt parflikiga. Holken glandelhårig. Blommorna gula. 7, 8. Åkrar.
49. *Mjölktistel*. ☉, alnshög. Bladen lyrformigt nedåt parflikiga eller pardelade. Holken ullig eller glatt. Blommorna gula. 7—9. Åkrar.
50. *Mjölktistel*. ☉, alnshög. Bladen äggrunda, styft tandade. Holken glatt eller ullig. Blommorna gula. 7, 8. Branta stränder, åkerrenar.
51. *Vildsallat*. ♀, alnshög. Bladen lyrformigt pardelade, tunna. Blomkorgarne semblommiga, med gula blommor. 7, 8. Lundar, bergsrötter.
52. *Tomtört*. ☉, alnshög. Bladen äggrunda. Frukten utan pensel, på bart fäste. Blommorna gula. 7—9. Odlade ställen.
53. *Salsofi*. ♀, alnshög. Bladen jemnbreda, kölade. Blomkorgarne stora. Frukten med skaftad fjunpensel. Blommorna gula, öppna på förmiddagarna. 6, 7. Ångsmark.
57. *Krepe*. ☉, fotshög. Bladen smalt lancettlika, vanl. tandade, med tillbakavikna kanter. Blomkorgarne i vippa. Holken med kort bylle. Blommorna gula. 6—9. Backar.
59. *Hökblomster*. ♀, kvartershög. Bladen lancettlika, under gråladna. Blomkorgen på enblomstrig stängel. Blommorna gula. 6, 7. Backar.
60. *Hökblomster*. ♀, kvartershög. Bladen lancettlika, glatta, hår-

- bräddade. Blomkorgarne 2—6 i flock på nästan bladlös stängel. Blommorna gula. 6, 7. Backar.
62. *Hundfötter*. 4, fotshög. Bladen smalt lancettlika, stråfbåriga. Blomkorgarne många i jemnhög qvast på lång, vanl. tvåbladig stjelk. Blommorna gula. 6, 7. Backar.
66. *Murnackel*. 4, fotshög. Bladen äggrunda, tandade, med tvär basis. Blomkorgarne i gles qvast på vanl. enbladig stjelk. Blommorna gula. 6, 7. Backar, murar.
68. *Skogsnackel*. 4, alnshög. Bladen lancettlikt ovala, tandade, afsmalnande emot basen. Blomkorgarne i gles qvast, på flerbladig stjelk. Blommorna gula. 6, 7. Skogsbackar.
71. *Nolanaber*. 4, alnshög. Bladen lancettlikt jemubreda, tandade. Blomkorgarne i flocklik vipa på mångbladig stjelk. Blommorna gula. 7—9. Backar, berg.
72. *Maskros*. 4, kvartershög. Bladen lancettlika, nedåt parflikiga. Blomkorgarne stora, på enblomstrig, ihålig stängel. Holken med slaka hyllefjäll. Blommorna gula. 5—9. Odlade ställen.
74. *Mjölklblomster*. 4, fotshög. Bladen lancettlika, parflikiga eller pardelade. Blomkorgarne 2—6 på långgrenig stängel. Blommorna gula. 7—9. Backar, betesmarker.
75. *Fibler*. 4, alnshög. Bladen omvänt äggrunda, tryckta till marken. Blomkorgarne stora, uppräta, på vanligen enblomstrig stängel. Blommorna gula. 7, 8. Backar.

### Fam. *Dipsacaceae*.

- Char.* Blommorna i blomkorg, tvåkönade. Ståndarne 4, fria. Frukten: en enfröig skalfrukt. Fröet med hvite.
- Örter med trinda stjelkar och motsatta, enkla blad utan stipler. Hvarje småblomma är omgifven af ett blomfoderlikt svepe. — Tillhöra Tetrandria, Monogynia.
76. *Åkervädd*. 4, öfver alnshög. Bladen djupt pardelade. Blomkorgarne med strålförmiga kantblommor. Blommorna blåaktiga. 7, 8. Backar, åkerrenar.
77. *Ångsvädd*. 4, alnshög. Bladen lancettlika, hela. Blommorna likförmiga, blå eller röda. 8, 9. Skogsängar.

### Fam. *Valerianaceae*.

- Char.* Blommorna i knippen. Ståndarne 5 eller 3, fria. Fruktämnet trerummigt, ehuru 2 rum stundom felslå. Märken 3.
- Buskar eller örter med motsatta blad.

Afd. 1. *Sambucineæ*: Buskar med bärlik frukt. — Tillhöra Pentandria, Trigynia.

79. *Olvon*. Hög buske. Bladen treklufna, med omvänt äggrund omkrets. Blomknippets kantblommor könlösa. Bären enfröiga. Blommorna hvita. 6, 7. Skogsängar, backar.

80. *Fläder*. Hög buske. Bladen parbladigt delade, med äggrunda likar. Bären trefröiga, svarta. Blommorna i femstråliga, jemnhöga knippen, hvitgula. 7. Lundar.

Afd. 2. *Valerianæ genuinæ*: Örtter med skalfrukt. — Tillhöra Triandria, Monogynia.

81. *Wendelört*. 4., alnshög och derutöfver. Bladen parbladigt delade med smalt lancettlika likar. Blomknippena trestråliga. Skalkfrukten med fjuppensel. Blommorna ljusröda. 7, 8. Grusiga stränder.

### Fam. *Rubiaceæ*.

*Char.* Blommorna i knippen eller vippor. Ståndarne 4. Fruktämnet tvårummigt, omslutet af blomfodret och öfvergående till en tvåknölig, af två nötlika frukter sammansatt frukt. Märken 2.

Örtter med ledade stjelkar och enkla, kraussittande, helbräddade blad. — Tillhöra Tetrandria, Monogynia.

84. *Myssmadra*. 4., 2, 3 kvarter hög. Bladen åtta i kräns, lancettlika. Skalkfrukterna stråfhåriga. Blommorna med hvita, trattlika blomkronor. 5—7. Lundar, bergsrötter.

85. *Hvit Jungfru Mariæ Sänghalm*. 4. Stjelken upprät, alnshög. Bladen 4 i krans, lancettlika. Blommorna i vippta, hvita. 7. Backar.

87. *Kärrmåra*. 4. Stjelken slak, fotslång. Bladen 4 i krans, smalt lancettlika. Blomkronorna fyrdelade, hvita. 6, 7. Kärr, stränder.

88. *Sträff Måra*. 4. Stjelken slankig, sträff, fotshög. Bladen 6 i krans, lancettlika, uddspetsiga. Blommorna hvita. 6, 7. Fuktiga ställen.

90. *Gul Jungfru Mariæ Sänghalm*. 4. Stjelken upprät, alnshög, smäluden. Bladen 8 i krans, jemnbreda. Blommorna gula. 7. Backar.

91. *Snärjgräs*. ☉. Stjelken snärjande, taggig, öfver alnslång. Bladen 8 i krans, smalt lancettlika. Blommorna hvitgula. 6—8. Odlade ställen.

### Fam. *Loranthaceæ*.

*Char.* Fruktämnet enfröigt, sluttigen bär. Ståndarne motsatta blomkronans likar. Märke 1.

Parasitiska, ständigt grönskande buskar med klynnedelade grenar och motsatta blad. — Tillhör Dioecia, Tetrandria.

92. *Mistel*. Alnshög parasitbuske, på grenarne af löfträd. Bladen lancettlika, läderartade. Bären hvita. Blommorna gulgröna. 5.

### Fam. *Caprifoliaceæ*.

*Char.* Fruktämnet genom radier från det centrala fröfästet 2—3-rummigt, slutt. bär eller fröhus, som stundom genom felslägning blifva enrummiga.



Buskar eller småbuskar med motsatta blad och vanligen parvisa blommor. — *Lonicera* tillhör Pentandria, Monogynia; *Linnæa* tillhör Didynamia, Angiosperma.

93. *Try.* Manshög buske. Bladen äggrunda. Blomskäften tvåblommiga. Frukten bär. Blommorna hvitgula. 6. Lundar.

94. *Torrvärksgräs.* Refvig småbuske med alnslånga, trådsmla, krypande grenar. Bladen äggrunda. Blommorna parvisa, hängande, med klocklika, rödletta kronor. 7. Skogar.

### Fam. *Campanulaceae.*

*Char.* Blomfodret till hälften vidväxt fruktämnet. Blomkronan regelbunden. Ståndarne 5. Frukten: ett flerrummigt fröhus med centrala fröfästen.

Örter med spridda blad. — Tillhöra Pentandria, Monogynia.

101. *Stor Blåklocka.* 4., 1—2 alnar hög. Rotbladen aflånga, stjelkbladen jemnbreda. Blommorna i klase, blå. 7, 8. Backar, lundar.

102. *Liten Blåklocka.* 4., fotsbög. Rotbladen rundade eller hjertlika, stjelkbladen jemnbreda. Blommorna i klase, blå. 7, 8. Backar.

103. *Monke.* ☉, fotsbög. Bladen jemnbreda. Blommorna i hufvud, blå. 7, 8. Backar, berg.

### Fam. *Lobeliaceae.*

*Char.* Blomfoder och frukt som föregåendes. Blomkronan oregelbunden. Ståndarne fem, med sammanväxta knappar.

Örter med skiftevisa blad. — Tillhör Pentandria, Monogynia (*Syngenesia*, *Monogamia* enl. Linné).

104. *Notblomster.* 4. Bladen jemnbreda, tvåtipiga, sittande i en rosett vid roten. Blommorna i klase på bladlös, alnshög stängel, ljusblå. 7, 8. Sjöar, floder.

### Fam. *Convolvulaceae.*

*Char.* Blomdelarne regelbundna, femtaliga. Frukten: ett fritt, 2—4-gömmigt fröhus med upräta frön.

Örter, med oledade, merändels slingrande stjelkar och skiftevisa, enkla blad. — *Convolvulus* tillhör Pentandria, Monogynia; *Cuscuta* tillhör Pentandria, Digynia.

105. *Åkervinda.* 4. Stjelken upplöst i alnslånga, nedliggande eller slingrande grenar. Bladen äggrundt pillika. Blommorna klocklika, rödletta. 7, 8. Åkerrenar, backar.

107. *Snarrefva.* ☉. Stjelken trådlik, alnshög, slingrande, bladlös, med sugvärtor. Blommorna i hufvud, rödletta. 7, 8. Parasit på Nässlor.

### Fam. *Boragineae.*

*Char.* Blommorna regelbundna med femtaliga delar. Frukten utgöres af fyra enfröiga smånötter med ett enkelt, gemensamt stift.

Örter med trinda, oledade stjelkar och spridda, enkla blad. Blommorna i ensidiga, före utvecklingen spiralformigt inrullade klasar. — Tillhöra Pentandria, Monogynia.

111. *Oxtunga*. ☿, fotshög. Bladen lancettlika, strårhåriga. Blommorna med rak kronpip, blå eller röda. 6, 7. Backar, åkerrenar.
112. *Rast*. ☉, fotshög. Bladen lancettlika, styvhåriga. Kronpipen krökt. Blommorna först röda, sedan blå. 6, 7. Åkrar.
113. *Förgüt mig ej*. ☿, fotshög. Bladen lancettlika. Fruktsodren rakhåriga. Blomkronorna blå, med i spetsen intryckta likar. 6—8. Stränder.
114. *Förgüt mig ej*. ☿, kvartershög. Bladen lancettlika. Fruktsodren rakhåriga, delade nedom midten. Kronflikarne rundade. Blommorna blå. 6—8. Fuktiga ställen.
115. *Förgüt mig ej*. ☉, fotshög. Bladen lancettlika. Fruktsodren krokhariga, kortare än skaften. Blommorna blå. 6—9. Backar, åkrar.
116. *Förgüt mig ej*. ☉, kvartershög. Bladen lancettlika. Fruktsodren krokhariga, utböjda, liklånga med skaften. Blommorna blå. 4, 5. Backar.
117. *Förgüt mig ej*. ☉, kvartershög. Bladen lancettlika. Fruktsodren krokhariga, uppräta, längre än skaften. Blommorna blå. 4, 5. Backar.
119. *Sminkrot*. ☉, 1—2 kvarter hög. Bladen lancettlika. Smånötterna ojemna, gråbruna. Blommorna hvita. 5, 6. Backar, åkrar.
122. *Hundtunga*. ☉, alnshög. Bladen smalt lancettlika, gråldudna. Smånötterna nedplattade, torutaggiga. Blommorna rødvioletta. 6—8. Backar.
124. *Paddfot*. ☉. Stjelken nedliggande, taggig, med fotslånga grenar. Bladen lancettlika. Fruktsodren hoptryckta, liknande en gåsfot. Blommorna ensamma i bladvecken, violetta. 5, 6. Vågkanter, gårdar.

#### Fam. *Labiatae*.

*Char.* Blomkronan oregelbunden. Ståndarne 4, tvåväldiga, eller stundom endast tvenne. Frukten som föregående.

Örter med fyrkantiga, knutiga stjelkar, motsatta grenar och motsatta, enkla blad. Blommorna uti bladvecken i små knippen, bildande skenbara kransar, stundom närmade i ax eller hufvud, då de öfra bladen sammandragas till blomskärmar. Blomkronan vanligen tvåläppig, gapande. — Tillhöra Didynamia, Gymnospermia, utom *Lycopus*, som tillhör Diandria, Monogynia.

126. *Hästmynta*. ☿, kvartershög. Bladen äggrunda. Fodertänderna korta. Blommorna i kransar, rödblå. 7, 8. Fuktiga ställen.
127. *Kloört*. ☿, fotshög. Bladen bredt lancettlika, flikigt sågade. Ståndarne två. Blommorna i kransar, hvita eller rødletta. 7; 8. Stränder, bland vass

128. *Dosta*. 4., nära alnshög. Bladen äggrunda. Blomskärmarne stora, färgade. Blommorna i tregreniga vippor, röda. 7, 8. Backar, åt solsidan.
129. *Backtimjan*. 4., med utbredda, kvarterslånga, i toppen uppböjda grenar. Bladen små, ovala. Blommorna i hufvud, röda. 6—8. Backar.
130. *Hartimjan*. ☉. Stjelken upprät, 1—2 kvarter hög. Bladen lancettlika. Blommorna i kransar, violetta med bukiga blomfoder. 6—8. Backar.
131. *Bergmynta*. 4., fotshög. Bladen äggrunda, hårliga. Blommorna i tätta, hufvudlika kransar i öfversta bladveckan, röda. 8. Berg, backar.
132. *Getnos*. 4., fotshög. Bladen hjertlikt lancettlika. Blomfodren med en puckel ofvanpå. Blommorna parvisa, stora, blå. 7, 8. Stränder.
134. *Skogshumle*. 4., kvartershög. Bladen äggrunda. Blomfodren tvåläpptiga, med öfverläppen tvärhuggen. Blommorna i hufvud, blå. 7, 8. Betesmarker, dikeskanter.
136. *Jordrefva*. 4. Stjelken refvig, med de blombarande grenarne uppstigande, kvartershög. Bladen hjertlikt njurlika, naggade. Ståndarknapparne bildande tvenne kors. Blommorna blå. 4—6. Backslutningar.
140. *Stinknässla*. 4., 3, 4 fot hög. Bladen hjertlika, skaffade. Blommorna i sexblommiga kransar, röda. 7, 8. Lundar. bergsrötter.
141. *Svinknyler*. 4., alnshög. Bladen hjertlikt lancettlika, oskaffade. Blommorna i kransar, röda. 8. Stränder.
142. *Hvit Blindnässla*. 4., 1—2 fot hög. Bladen hjertlika, spetsade, skaffade. Blommorna i mångblommiga kransar, hvita. 5—9. Vägkanter, diken.
143. *Röd Blindnässla*. ☉, fotshög. Bladen hjertlika, trubbiga, skaffade. Blommorna i fåblommiga kransar, röda. 4—9. Åkrar.
145. *Röd Blindnässla*. ☉, öfver kvartershög. Bladen njurlika, de öfra oskaffade. Blommorna röda. 6—8. Åkrar.
147. *Korsört*. ☉. Stjelken styfhårig, nära alnshög. Bladen äggrunda. Blomfoderlikaarne sylspetsade. Blommorna i kransar, röda. 7, 8. Åkrar, backar.
148. *Gul Blindnässla*. ☉. Stjelken styfhårig, nära alnshög. Bladen äggrunda. Blomkronan tre gånger längre än fodret, gul. 7, 8. Åkrar.
150. *Käringruka*. 4. Stjelken upprät, kvartershög. Bladen äggrunda; rotbladen störst. Blommorna i tätta kransar, bildande ett ax, blå. 5, 6. Betesmarker.

### Fam. *Ményantheae*.

*Char.* Frukten är ett tvåvalvligt, enrummigt fröhus med fröfästen på valvlerna. Blomkronans flikar i knoppen veckade.

Ört med spridda, trefingradt delade blad och regelbunden, femflikig krona. — Tillhör Pentandria, Monogynia.

151. *Vattenklöfver*. 4, fotsbög. Bladen trefingradt delade, med stora, äggrundaflikar. Blommorna i spira, med ljusröda eller nästan hvita och inuti hvithåriga blomkronor. 6. Vatten, invid stränderna.

### Fam. *Oleaceae*.

*Char.* Blomkronan regelbunden (stundom felsläende). Ståndarne 2. Frukten tvågömmig. Stiftet 1.

Träd eller buskar med motsatta grenar och blad. — *Syringa* tillhör Diandria, Monogynia; *Fraxinus* tillhör Polygamia, Dioecia.

*Syrén* (*Syringa vulgaris*). Hög buske med hjertlika blad och rika spiror bildande hvita eller gridelina blommor. 5, 6. Odlad.

152. *Ask*. Høgt träd. Bladen parbladigt delade med bredt lancettlikaflikar. Frukten: vingfrukt. Blommorna i vippa, utan hylle, violetta. 5. Lundar.

### Fam. *Contortae*.

*Char.* Blomkronan regelbunden, affallande med 1 knoppen vridnaflikar. Frukten: tvenne fröhölsor. Stift 2.

Örter (i varmare länder buskar och träd) med motsatta, enkla blad. — Tillhör Pentandria, Digynia.

153. *Tulkört*. 4, alnshög. Bladen hjertlikt äggrunda. Blommorna i flockar, hvita. 6, 7. Steniga backar.

### Fam. *Gentianeae*.

*Char.* Blomkronan regelbunden, vissnad qvarsittande, med 1 knoppen vridnaflikar. Frukten: en tvåskalig, enrummig kapsel med fröfästena långsefter skalens kanter, eller genom dessas invikning tvårummig med centrala fröfästen. Stift 2, vanligen förenade. — Örter med motsatta, helbräddade blad. — Tillhöra Pentandria, Monogynia.

154. *Ängssöta*. 4, kvartershög. Bladen äggrundt aflånga. Blomfodret fyrklufvet med tvåflikar större. Blommorna blå. 7, 8. Ängsbackar.

### Fam. *Solanaceae*.

*Char.* Blomkronan regelbunden, 1 knoppen veckad. Frukten tvårummig, med många frön, fästa midt på det centrala, radierande, skiljevägg bildande fästet. Stift 1.

Örter, med enkla, spridda blad. Blomdelar femtaliga. I allmänhet narkotiskt giftiga. — Tillhöra Pentandria, Monogynia.

159. *Quesved*. Mindre buske, med långa, svaga grenar. Bladen hjertlikt äggrunda, de öfra med spjutlik basis. Bären aflånga, röda. Blommorna violetta. 7, 8. Stränder.

160. *Trollbärsört*. ☉, fotsög. Bladen äggrunda, tandade. Bären klotrunda, svarta. Blommorna hvita. 7, 8. Odlade ställen.
- Potates* (*Solanum tuberosum*). ☿, alnshög. Bladen parbladigt delade. Bären stora, runda. Blommorna hvita eller violetta. 7, 8. Odlas allmänt. Härstammar från södra Amerika. Införd till Sverige 1723 af Jonas Alströmer.
161. *Bolmört*. ☉. Stjelken klubbhårig, alnshög. Bladen äggrundt aflånga, rikiga. Blommorna gulaktiga, svartblått ådriga. 7, 8. Gårdar, vägar.

### Fam. *Personatae*.

*Char.* Blomkronan oregelbunden, med i knoppen tegellagda likar. Frukt som föregående, sällan enrummig, i hvilket fall fröen äro fästa på sidoväggarna. Stift 1.

Örter med enkla, dels motsatta, dels spridda blad. Blomkronan oregelbunden, antingen tvåläppig, maskerad eller gapande, med tvåvåldiga ståndare, — eller ock endast olikformig, fem- eller fyrklufven med 5 eller 2 ståndare.

Afd. 1. *Verbasceæ*: Ståndarknapparne enrummiga. Fruktämnet tvårummigt. — *Verbascum* tillhör *Pentandria*, *Monogynia*; *Scrophularia* tillhör *Didynamia*, *Angiospermia*.

162. *Kungsljus*. ☉, 1—2 alnar hög. Hela växten ullig. Bladen skiftevisa, äggrundt lancettlika, nedlöpande på stjelken. Blommorna i ax, gula, med tre ståndarsträngar hvitludna. 7, 8. Backar.
163. *Kaltrumpa*. ☉, 1—2 alnar hög. Bladen hjertlika. Alla ståndarsträngarne violett ludna. Blommorna gula. 7, 8. Backar.
166. *Flenört*. ☿, 1—2 alnar hög. Bladen motsatta, äggrundt hjertlika, enkelt sågade. Blommorna i vippa i toppen, bruna. 7, 8. Bergsrötter, lundar.

Afd. *Antirrhineæ*: Ståndarknapparne tvårummiga, utan bibaug. Fröhuset tvårummigt. *Linaria* tillhör *Didynamia*, *Angiospermia*; *Veronica* tillhör *Diandria*, *Monogynia*.

168. *Flugblomster*. ☿, 1—2 fot hög. Bladen skiftevisa, smalt lancettlika eller jemnbreda. Blommorna i ax, gula, med lång sporre. 7. Backar, Åkerrenar.
171. *Ax-Veronica*. ☿, 1—2 kvarter hög. Bladen motsatta (såsom hos hela släktet), äggrundt lancettlika, sågade. Blommorna i tät ax i toppen, blå. 6, 7. Backar.
172. *Maj-Veronica*. ☿, kvartershög. Bladen äggrundt aflånga, trubbiga, naggade. Blommorna i axlik klase, blåstrimmiga. 5—7. Gräsmark, backslutningar.
173. *Ärenpris*. ☿. Stjelken nedliggande, kvarterslång, småluden. Bladen ovala. Blommorna i klasar i bladvecken, blå. 5, 6. Backar.
174. *Thé-Veronica*. ☿. Stjelken nppstigande, kvarters- fotslång, på tvenne sidor ullhårig. Bladen äggrunda, grofsågade. Blommorna i klasar i bladvecken, blå. 5, 6. Gräsmark.

175. *Bückböna*. 4. Stjelken oppstigande, fotslång och deröfver, glatt. Bladen äggrunda, tjocka. Blommorna i klasar i bladvecken, blå. 5—9. Bäckar, stränder.
177. *Dy-Veronica*. 4, quartershög. Bladen lancetlikt jemnbreda, bakvändt småsågade. Blommorna i fåblommiga klasar i bladvecken, blåstrimmiga. 5—7. Stränder, diken.
178. *Fält-Veronica*. ☉, quartershög. Bladen äggrunda, sågade. Blommorna ensamma, kortskafade, sittande i öfra bladvecken, ljusblå. 4, 5. Åkrar, backar, fält.
179. *Vår-Veronica*. ☉, 3—6 tum hög. Bladen flikiga. Blommorna nästan oskafade, ensamma i bladvecken, bildande ett glest ax, blå. 4, 5. Backar.
182. *Åker-Veronica*. ☉. Stjelken nedliggande, quarterslång. Bladen äggrunda, sågade. Blomfoderflikarue aflånga. Blommorna ensamma i bladvecken, långskafade, blå eller rödaktiga. 5—9. Åkrar, trädgårdsland.

Afd. 3. *Rhinanthaceæ*: Ståndarknappar tvårummiga, med borstlika bihang vid basen. Fröhuset tvårummigt.

186. *Ögontröst*. ☉, quartershög. Bladen motsatta, äggrunda, grofsågade. Blommorna i ax i toppen, med gul pipöppning. 6—8. Backar.
188. *Skallergräs*. ☉, fotshög. Bladen motsatta, aflångt jemnbreda. Blomskärmen blekgula. Kronpipen krökt. Blommorna gula. 6, 7. Ängar, åkrar.
189. *Skallergräs*. ☉, quartershög. Bladen motsatta, aflångt jemnbreda. Blomskärmen gröna. Kronpipen rak. Blommorna gula. 6, 7. Fuktig ängs- och skogsmark.
191. *Lievarg*. 4, 1—2 kvarter hög. Bladen motsatta, pardelade. Blommorna röda. 6, 7. Våta ängar.
194. *Natt och dag*. ☉, fotshög. Bladen motsatta. Blomskärmen hjertlika, spetsade, violetta. Blommorna i glesa ax, brandgula. 6, 7. Lundar.
195. *Kohvete*. ☉, quartershög. Bladen motsatta. Blomkronans nedra läpp rakt framskjutande. Blommorna ensamma i öfra bladvecken, vända åt en sida, blekgula. 7, 8. Skogsängar.
196. *Kohvete*. ☉, quartershög. Som föregående, men med kronan brandgul och nedra läppen nedböjd. 7, 8. Skogsängar.

Afd. 4. *Orobanchææ*: Ståndarknappar tvårummiga, utan tydligt bihang. Fröhuset enrummigt. — Bladlösa, fjälliga parasiter, tillhörande Didynamia, Angiospermia.

197. *Fjällrotsört*. 4, quartershög. Största delen af stjelken dold under jordbrynet. Fjällen tjocka, bredt äggrunda. Blommorna i ensidig klase, ljusröda. 5. Under hasselbuskar.

#### Fam. *Lentibulariaceæ*.

*Char.* Blomkronan oregelbunden, tvåläppig, med sporre. Ståndarne 2. Fröhuset enrummigt, mångfröigt, med fritt, centralt fröfäste. Stift. 1.

Örter tillhörande Diandria, Monogynia.

198. *Blåsört*. 4., fotshög. Bladen mångdelade, med hårfina, blås-bärande flikar. Blommorna i klase, på stängel, stora, gula. 7, 8. Diken, vikar af sjöar och floder.
201. *Felört*. 4., kvartershög. Bladen aflånga med inrullade kanter, klbbiga, alla från roten. Blommorna på enblommiga stänglar, blå. 6, 7. Fuktiga ställen.

Fam. *Primulaceae*.

*Char.* Blomkronan regelbunden. Ståndarne motsatta kronflikarne. Frukt som föregående familj. Stift och märke enkla.

Örter med enkla blad. — Tillhöra Pentandria, Monogynia utom *Trientalis*, som tillhör Heptandria, Monogynia.

202. *Dufkulla*. 4. Stjelken kvartershög, enkel, med bladen lancettlika, gytttrade i toppen. Blomhylllet dubbelt (såsom hos alla utom *Glaux*). Blomkronan djupt sjudelad, hvit. 6. Skogar.
203. *Lysing*. 4., 2—3 fot hög. Bladen lancettlika, vanligen 3 i krans. Blommorna i vippa i toppen, gula. 7, 8. Stränder.
205. *Vattenlysing*. 4., alnshög. Bladen smalt lancettlika. Blommorna sittande i smala blomspiror i bladvecken, små, med djupt delad, gul krona. 7. Stränder, i vattnet.
207. *Strandling*. 4., kvartershög. Bladen äggrundt aflånga. Blommorna ensamma i bladvecken, oskaftade, med enkelt, rött blomhyll. 7, 8. Hafsstränder.
209. *Guldvisfva*. 4., kvartershög. Bladen äggrunda, från roten. Blommorna i flock, på utdragen stängel, gula. 5. Ängsbackar.

Fam. *Plantagineae*.

*Char.* Blommorna regelbundna, fyrtaliga. Kronan blinnaktig. Ståndarne 4, med långa, i knoppen dubbelvikna strängar. Frukten vanligen ett kringskuret fröhus med centralt fröfäste. — Örter med enkla, i rosett vid roten sittande blad och blommor i ax på stängel. — Tillhöra Tetrandria, Monogynia (utom *Littorella*).

213. *Groblad*. 4., fotshög. Bladen skaftade, äggrunda, sjunerviga, nästan glatta. Blommorna i jemnbredt ax, med rödbruna ståndarknappar. 7, 8. Betesmarker.
214. *Släskümpar*. 4., fotshög. Bladen oskaftade, ovala, femnerviga, småludna. Blommorna i aflångt ax med hvita ståndarknappar. 6, 7. Backar.
215. *Smalbladigt Groblad*. 4., fotshög. Bladen smalt lancettlika. Blommorna i rundadt ax, med nästan hvita ståndare. 5—7. Backar.

Fam. *Fragulaceae*.

*Char.* Kronbladen i knoppen tegellagda eller veckade. Fruktämnet fierrumligt, insänkt inom disken, slutligen vanl. bärlik stenfrukt med enfröiga rum.

Buskar eller träd med enkla blad. — Tillhör Pentandria, Monogynia.

220. *Brakved*. 3—6 alnar hög buske. Bladen ovala, helbräddade. Bären svarta. Blommorna hvita. 6, 7. Skogsängar.

Fam. *Araliaceae*.

*Char*. Kronbladen i knoppen kantlagda. Frukten: ett flerrum-  
migt bär med enfröiga rum.

Buske med vanl. klängande grenar. — Tillhör Pentandria, Monogynia.

222. *Murgrön*. Buske med långa, rotsläende grenar, ständigt grön-  
skande, vinkligtflikiga blad och gröna blommor i flock.  
9, 10. Bergväggar, äfvensom allmänt odlad.

Fam. *Umbelliferae*.

*Char*. Kronbladen i knoppen inrullade. Frukttämnet beklädt  
af det vidväxta blomfodret och sammansatt af två hopväxta, mogna  
skiljbara, enfröiga delfrukter.

Örter med ledade stjelkar och spridda, enkla, vanligen djupt  
delade blad. Blommorna i dubbla (sällan enkla) blomflockar. —  
Tillhöra Pentandria, Digynia.

*Kyrfvel* (*Myrrhis odorata*). 4, alnshög. Bladen tredubbelt parbla-  
digt delade. Frukterna stora, lancetlikt syllika, kantiga.  
Blommorna hvita. 7, 8. Allmänt planterad och stundom  
förvildad.

226. *Hundloka*. 4. Stjelken fårad, alnshög. Bladen dubbelt par-  
bladigt delade. Frukterna syllika, släta. Hvita blommor.  
6, 7. Ängsmark.

228. *Morot*. ☉, alnshög. Bladen dubbelt parbladigt delade. Svepe-  
bladen pinndelade. Den vilda växtens rot smal och vit.  
Blommorna hvitaktiga. 7, 8. Åkerrenar.

230. *Björnfloka*. ☉. Stjelken omkring 2 alnar hög, stråfhårig.  
Bladen parbladigt delade med pardelade flikar. Blommorna  
gulaktiga. 7, 8. Torr ängsmark.

231. *Palsternacka*. ☉, alnshög. Bladen parbladigt delade, med  
äggrunda, inskurna eller flikiga flikar. Blommorna gula.  
7, 8. Odlade ställen.

*Dill* (*Anethum graveolens*). ☉, alnshög. Bladen dubbelt parbladigt dela-  
de med trådsmla flikar. Blommorna gula. 6, 7. Odlade ställen.

234. *Finsk Ingefära*. 4. Stjelken öfver alnshög, kantig. Bladen  
tredubbelt parbladigt delade. Blommorna hvita. 7, 8.  
Kärrängar.

237. *Vildpersilja*. ☉, fotsbög. Bladen dubbelt parbladigt delade.  
Enskilda svepena trebladiga, ensidiga. Blommorna hvita.  
6—9. Odlade ställen. (Giftig).

239. *Sprängört*. 4. Stjelken grof, omkring 2 alnar hög. Bladen  
dubbelt parbladigt delade, med lancetlika, sågade småflikar.  
Frukterna klotrunda. Blommorna hvita. 7, 8. Vatten. (Giftig).



- Persilja* (*Petroselinum sativum*). ☉, alnshög med smala grenar. Bladen dubbelt parbladigt delade med äggrunda flikar. Blommorna gröngula. 7, 8. Allmänt odlad och stundom förvildad.
- Selleri* (*Apium graveolens*). ☉, alnshög. De nedra bladen parbladigt, de öfra trefingradt delade, med vigglika flikar. Blommorna hvita. 7, 8. Odlad i trädgårdar.
240. *Kirskål*. ☿, öfver alnshög. Bladen dubbelt trefingradt delade. Bladflikarne äggrunda, med något hjertlik basis. Blommorna hvita. 7, 8. Lundar.
241. *Kummin*. ☉, alnshög. Bladen dubbelt parbladigt delade med jemnbreda flikar. Blommorna hvita eller rödleita. 6—8. Ångsmark.
242. *Bockrotsört*. ☿, 1—2 fot hög. Bladen parbladigt delade; rotbladens flikar äggrunda, stjelkladens nästan jemnbreda. Blommorna hvita. 6, 7. Backar, betesmarker.
243. *Sträta*. ☿. Stjelken 1—2 alnar hög. Bladen parbladigt delade med smalt lancettlika eller jemnbreda, sågade flikar. Blommorna hvita. 7. Vatten.

#### Fam. *Adoxeae*.

*Char.* Kronbladen vid basen sammanhängande, i knoppen kantlagda. Ståndarne dubbelt så många som kronbladen, med enrummiga knappar. Frukttämnet 4—5-rummigt, till hälften täckt af disken, slutl. bärlikt fröhus med ett frö i hvarje rum.

Ört med motsatta blad och blommor i hufvud. — Tillhör Octandria, Tetragynia.

245. *Desmansknopp*. ☿, kvartershög. Bladen dubbelt trefingradt delade. Blommorna gröna. 4, 5. Skuggiga ställen.

#### Fam. *Acerineae*.

*Char.* Kronbladen i knoppen tegellagda. Frukttämnet fritt, 2—3-rummigt, med 2 fröämnen i hvarje rum, slutl. vingfrukt eller läderartadt fröhus.

Träd med motsatta blad utan stipler. — *Acer* tillhör Polygamia, Dioecia; *Æsculus* tillhör Heptandria, Monogynia.

246. *Lönn*. Högt träd med stora, tunna, femflikiga blad och 2 hopsittande vingfrukter, hvilkas vingar äro utspärrade. Blommorna i jemnhög vippra, gula. 5. Lundar, parker.

*Hästkastanje* (*Æsculus Hippocastanum*). Högt träd med sjuflingrade blad och blommor i spira, sneda, hvita. 6. Allmänt planterad.

#### Fam. *Nymphaeaceae*.

*Char.* Kronbladen i flera kransar, utan bestämd gräns öfvergående i äfvenledes talrika ståndare. Frukten: ett läderaktigt, mångrummigt fröhus med fröfästen på väggarne.

Vattenväxter med krypande rotstockar och stora, långt skaftade, rundade, flytande blad. Blommorna stora, praktfulla, ensamma, långt skaftade. — Tillhöra Polyandria, Monogynia.

247. *Hvit Näckros*. 4. Bladen rundadt hjertlika. Blommorna stora, med 4 foderblad och många, hvita kronblad. 7. Sjöar, floder.
248. *Gul Näckros*. 4. Rotstocken ofta armtjock. Bladen ovalt hjertlika. Blommorna med 5 foderblad och många små, gula kronblad. 7. Sjöar, floder.

Fam. *Ranunculaceae*.

*Char.* Blomhylllet enkelt eller dubbelt, af skiffevisa, vid fruktmognaden affallande bylleblad. Ståndarne vanl. många. Frukten utgöres af flera fria karpeller (sällan en bärlik frukt).

Örter med vanligen delade, spridda blad. — Tillhöra *Polyandria*, *Polygynia* utom *Actæa* och *Delphinium*, som tillhöra *Monogynia*, *Aconitum* och *Aquilegia*, som tillhöra *Tri-Pentagynia* och *Myosurus*, som tillhör *Pentandria*, *Polygynia*.

250. *Ältgräs*. 4. Stjelken uppstigande, fotslång. Bladen hela, äggrundt lancettlika. Blommorna gula. 7. Fuktiga ställen.
251. *Solvifva*. 4. Stjelken fotshög, med knöl vid basen. Bladen djupdelade. Foderbladen nedböjda. Blommorna gula. 5, 6. Backar.
253. *Rüfjagräs*. 4. Stjelken fotshög, uppstigande, med refvor. Blomskäften refflade. Blommorna gula. 6—8. Fuktiga ställen.
254. *Tiggar-Ranunkel*. ☉, fots- alushög. Bladen trekluftna, med trubbiga likar. Fruktfästet utdraget. Blomkronan af fodrets längd, gul. 6—8. Fuktiga ställen.
255. *Smörblomma*. 4. Stjelken upprät, alushög. Bladen 3—5-delade. Blomskäften trinda. Kronbladen längre än fodret, gula. 6, 7. Ängsmark.
256. *Smörblomma*. 4. Stjelken upprät, 1—2 fot hög. Rotbladen njurlika. Stjelkbladen djupt delade, med jemnbreda likar. Blomskäften trinda. Blommorna gula. 5, 6. Ängsmark.
259. *Grodhår*. 4. Stjelken grenig, ofta famnslång. Alla bladen oskaftade, hårlöst delade, med rundad omkrets. Blommorna hvita. 6—8. Sjöar.
- Grodhår* (*Batrachium trichophyllum*). 4. Stjelken som föregående. Alla bladen skaftade, hårlöst delade, med oregelbunden omkrets. Blommorna hvita. 6—8. Sjöar, floder.
- Vattenranunkel* (*Batrachium heterophyllum*). 4. Stjelken som föregående. De öfra bladen flytande, njurlika, de nedra nästan oskaftade, findelade. Blommorna hvita. 6—8. Sjöar, floder.
261. *Korskål*. 4. Stjelken kvartershög, med många stjelkknölar vid basen. Blommorna gula med 8 kronblad. 5. Lundar, bäckstränder.
262. *Rättsvans*. ☉, fingerhög. Bladen jemnbreda. Blomfoderbladen med bihang. Fruktfästet långt utdraget, liknande en rättsvans. Blommorna gula. 5, 6. Backslutningar.
263. *Ängsruta*. 4, 2—3 fot hög. Bladen tredubbelt parbladiga med omvänt äggrunda småblad. Blomkalken enkel, fyrabladig. Ståndarne långa. Blommorna gulaktiga. 7 Fuktiga ängar.

265. *Hvilsippa*. 4., kvartershög. Bladen trefingradt delade. Svepet bladlikt, trebladigt. Kalken enkel med 6 aflånga, hvita blad. 5. Skogsängar, backar.
267. *Blåsippa*. 4., kvartershög. Bladen njurlika, treklufna. Svepet blomfoderlikt, trebladigt. Blomkalken enkel, blå. 4, 5. Skogsbackar.
269. *Kalfsleka*. 4., kvartershög. Bladen hjertlika eller njurlika. Kalken enkel, fembladigt, gul. 5. Kärr, stränder.
273. *Riddarsporre*. ☉, 1—2 fot hög. Bladen trefingradt delade, med jemnbreda likar. Blommorna med en sporre, violetta. 6, 7. Åkrar.

#### Fam. *Berberidene*.

*Char.* Foderblad, kronblad och ståndare motsatta hvarandra. Frukten: enrummig med fröfäste vid sidan.

Buskar med spridda blad. Frukten bär. — Tillhör Hexandria, Monogynia.

275. *Berberis*. Manshög buske med tornbärande grenar. Bladen omvänt äggrunda, tornsågade. Bären aflånga, röda. Blommorna i klasar, gula. 5, 6. Backar.

#### Fam. *Papaveraceae*.

*Char.* Blommorna regelbundna. Blomfodret tvåbladigt, snart affallande. Kronbladen 4. Ståndarne talrika, fria. Frukten: ett enrummigt, mångfröigt fröhus, med från valvlerna utgående ofullkomliga skiljevägar.

Mjölksaftiga örter med spridda blad. — Tillhöra Polyandria, Monogynia.

277. *Åkervallmo*. ☉, fotshög. Bladen dubbelt pardelade. Fröhuset aflångt, glatt. Blommorna röda. 6, 7. Åkrar, backar.
279. *Svalört*. 4., 2—3 fot hög. Bladen djupt pardelade, med äggrunda, likiga likar. Fröhusen skidlika. Blommorna gula. 5—8. Backar, stenrösen.

#### Fam. *Fumariaceae*.

*Char.* Blomfodret tvåbladigt, snart affallande. Blomkronan irregulier, med sporre. Ståndarne 6, diadelfiska, med enrummiga knappar. Frukten enrummig.

Örter med skiftevisa, mångdelade blad. Blommorna i klase med jordrökslik krona. — Tillhöra Diadelphia, Hexandria.

281. *Nunneört*. 4., 4—6 tum hög. Bladen dubbelt trefingradt delade. Frukterna skidlika. Blomskärmen hela. Blommorna röda. 4, 5. Backar.
282. *Jordrök*. ☉, fotshög, spenslig. Bladen dubbelt parbladigt delade. Frukterna nöllika, klotrunda, i toppen något intryckta. Blommorna röda. 6, 7. Åkrar.

Fam. *Cruciferae*.

*Char.* Blomfoder och krona reguliera, fyrbladiga. Ståndare 6, fyrväldiga. Frukten: skida.

Örter med trind, oledad stielk och skiftevisa, enkla blad utan stipler. Blommorna i kvast, som småningom genom axeln och blomskaftens förlängning öfvergår till klase. Blomkronan korsbladig. — Tillhöra Tetradyamia. Första afdelningen utgöres af ordningen Sillquosæ, den seduare af Siliculosæ.

Afd. 1. *Siliquosæ*: Skidans längd mera än tre gånger så stor som bredden.

*Rål* (Brassica oleracea). ☉. Bladen blågröna, glatta, de nedra lyrformiga, skäftade, de öfra aflånga, oskäftade. Blommorna hvitgula. Flera varieteter af denna art odlas allmänt, såsom Hvitkål, Blomkål o. s. v.

*Rofva* (Brassica Rapa). ☉. Bladen gröna och styfåriga; de nedra lyrformiga, de öfra äggrunda, spetsade, med hjertlik, omfattande basis. Blommorna gula. — Odlas allmänt och i flera varieteter.

287. *Åkersenap*. ☉. Stjelken stråfårig, öfver fotshög. Bladen äggrunda, groftadade. Skidorna trinda, knöliga, med kvadratisk stift, kortare än skidans fröbärande del. Blommorna gula. 6—8. Åkrar.

290. *Stillfrö*. ☉, alnshög. Bladen dubbelt parbladigt delade med jemnbreda flikar. Skidorna smala, utstående. Blommorna små, gula. 7. Gårdar, odlade ställen.

291. *Vägsenap*. ☉, 1—2 fot hög. Bladen nedåt parflikiga med äggrunda flikar. Skidorna kortskäftade, tryckta till stielken. Blommorna gula. 7—9. Vägkanter.

293. *Rym*. ☉, fotshög. Bladen lancettlika, Skidorna utstående, dubbelt längre än skäftet. Blommorna gula. 6—8. Odlade ställen.

295. *Hvillökskrasse*. ☉, 2—3 fot hög. Bladen hjertlika, skäftade. Blommorna hvita. 5, 6. Lundar.

297. *Ängskrasse*. 4., fotshög. Bladen parbladigt delade; rotbladens flikar rundade, stielkbladens lancettlika. Blommorna hvita eller gridelina. 5, 6. Fuktiga ångar.

304. *Glis*. ☉. Stjelken späd, quartershög. Bladen lancettlika; rotbladen bildande en rosett, stielkbladen spridda. Skidorna trådsmla. Blommorna hvita. 4, 5. Backar.

305. *Räckentraf*. ☉. Stjelken 1—2 alnar hög, rak och styf. Bladen lancettlika, med pillik, omfattande basis. Skidorna långa, uppräta. Blommorna hvitgula. 6, 7. Backar.

306. *Vinterkrasse*. 4., alnshög. Bladen parflikiga. Rotbladens ändflik stor, rundadt hjertlik. Skidorna uppräta, på utstående skäft. Blommorna gula. 6, 7. Åkerrenar, backslutningar.

307. *Vinterkrasse*. ☉, alnshög. Rotbladens ändflik aflångt äggrund. Stielkbladens sidoflikar små eller inga. Skidorna tilltryckta. Blommorna gula. 6, 7. Något fuktiga, odlade ställen.

308. *Pepparrot*. 4., 3—4 fot hög. Rotbladen äggrundt aflånga, hela. Stjelkladen lancettlika. Blommorna hvita. 6, 7. Vid dammar och diken, samt allmänt odlad.
311. *Vattenkrasse*. ☉, fotshög. Bladen pardelade. Skidorna aflånga, trubbiga. Kronbladen små, gula. 6—9. Stränder och dylga ställen.
- Rättika* (*Raphanus sativus*). ☉. Skidorna trinda, spetsade, knappt längre än skaftet, mogna bristande på tvären. Blommorna blekt violetta med mörkare ådror. Odlas allmänt i flera varieteter, t. ex. Rådisa, Sommar- och Vinter-Rättika o. s. v.
- Afd. *Siliculosæ*: Skidans längd mindre än tre gånger bredden.
313. *Långrofva*. 4. Stjelken öfver alnshög, mycket grenig. Bladen lyrformigt pardelade. Skidorna äggrunda, knöliga. Blommorna gula. 6, 7. Odlade ställen.
318. *Gatukrasse*. ☉, quartershög. Bladen parbladigt delade. Skidorna rundade, små. Ståndarne två. Blommorna utan kronblad, gröna. 5—9. Gator, backar.
319. *Lommegräs*. ☉, fotshög. Rotbladen pardelade. Stjelkladen hela, med pillik basis. Skidorna bredt vigglika, tvärhuggna. Blommorna hvita. 4—9. Odlade ställen.
320. *Penninggräs*. ☉, fotshög. Stjelkladen aflångt lancettlika med pillik basis. Skidorna rundade, vingade. Blommorna hvita. 6, 7. Odlade ställen.
329. *Rågblomma*. ☉, 1—5 tum hög. Bladen i rosett vid roten. Skidorna aflånga, på stängel. Blommorna hvita. 4, 5. Backar, åkrar.

#### Fam. *Polygaleae*.

*Char.* Foder och krona irreguliera. Ståndarsträngarne dieldiska, med enrummiga knappar. Fröhuset tvårummigt, med ett hängande frö i hvarje rum.

Örter med trinda stjelkar och spridda, enkla blad. Blommorna i klase. Tillhöra *Diadelphia*, *Octandria*.

332. *Fogelört*. 4., quartershög. Bladen lancettlika. Fröhusen kortare än de quarsittande foderbladen. Blommorna blå. 6, 7. Ängsbackar.

#### Fam. *Tiliaceae*.

*Char.* Blomfodret i knoppen kantlagdt, efter blomningen affallande. Kronbladen tegellagda. Ståndarne fria, talrika. Frukten flergömmig med centrala fröfästen.

Träd med enkla, spridda blad. Blommorna i kvast. — Tillhör *Polyandria*, *Monogynia*.

336. *Lind*. Hög träd. Bladen snedt hjertlika. Frukterna klotrunda. Blomqvastarne med ett stort skärblad. Blommorna hvitgula. 7. Lundar, parker.

Fam. *Malvaceae*.

*Char.* Blomfodret i knoppen kantlagdt. Kronbladen vridna. Ståndarne talrika, monadelphiska. Småfrukter flera, kranslikt sammanväxta omkring stiftets bas.

Örter med enkla, spridda blad, och blommorna i bladvecken. Kronbladen 5, nedtill sammanväxta vid ståndarsträngarnes pip. — Tillhöra Monadelphia, Polyandria.

338. *Kattost.* ☉. Stjelken utbredd med fotslånga grenar. Bladen rundadt njurlika. Kronan föga längre än fodret, hvit. 6—9. Gator, backar.

339. *Kattost.* ☉. Stjelken utbredd med alnslånga grenar. Bladen rundadt njurlika. Kronan dubbelt längre än fodret, blekröd. 7, 8. Gator, backar.

Fam. *Crinales*.

*Char.* Blomfodret i knoppen tegellagdt. Kronbladen vridna. Ståndarne 5—10, monadelphiska. Fröhuset flernummigt eller af 5, kransvisa karpeller.

Örter, tillhörande Monadelphia, deraf *Geranium* och *Oxalis* tillhöra Ordu. Decandria, *Erodium* och *Linum* tillhöra Ordu. Pentandria.

343. *Ormgräs.* 2, 3, 4 kvarter hög. Bladen rundade, fem—sjudelade med trubbigaflikar. Blomskäften enblommiga. Blommorna stora, röda. 6, 7. Berg, backar.

345. *Midsommarblomster.* 2, alnshög. Bladen vinkliga, 5—7-delade med spetsigaflikar. Blomskäften tvåblommiga. Blommorna stora, röda. 6, 7. Ängar, skogsbackar, lundar.

348. *Stinkande Storknäf.* ☉, kvarters- fotshög. Bladen parbladigt delade med pardeladeflikar. Blommorna små, röda. 7, 8. Berg, under buskar.

350. *Mjukhårig Storknäf.* ☉. Stjelken med nedliggande, kvarterslånga, mjukhåriga grenar. Bladen rundadt njurlika, handlikt mångklufna. Blommorna små, röda. 6, 7. Backar.

351. *Backnäf.* ☉. Stjelken kvartershög, småluden. Bladen rundadt njurlika, handlikt mångklufna. Blommorna små, röda. 5—9. Backar.

353. *Kamnäf.* ☉, kvartershög. Bladen parbladigt delade med pardeladeflikar. Blomskäften mångblommiga. Blommorna röda. 4—7. Berg, backar.

354. *Harsyra.* 2, kvartershög. Bladen från rotstocken, trefngrade, med omvänt hjertlika småblad. Blommorna på enblommiga stänglar, hvita. 5. Lundar, bäckstränder.

*Lin* (*Linum usitatissimum*). ☉, alnshög. Bladen spridda, lancetlika. Blommorna stora, blå. 7, 8. Allmänt odlad.

355. *Vildt Lin.* ☉. Stjelken 1—2 kvarter hög, klynnebild. Bladen motsatta, omvänt äggrunda — lancetlika. Blommorna hvita. 6, 7. Backar, betesmarker.

Fam. *Hypericineae*.

*Char.* Blomkronan regelbunden. Ståndarne många, polyadel-fiska. Stiften flera. Fröhuset enrummigt, eller flerrummigt af skalens invikna kanter, hvilka bära talrika frön.

Örter med motsatta, enkla, af inväxta glandler punkterade blad. Foder och krona fembladiga. — Tillhöra Polyadelphia, Polyandria.

358. *Mansblod*. 4. Stjelken alnshög, fyrkantig. Bladen äggrunda. Blommorna stora, gula. 7, 8. Backar.

359. *Jo hannisört*. 4. Stjelken alnshög, tvåkantig. Bladen aflånga, tydligen genomskinligt punkterade. Blommorna stora, gula. 7, 8. Backar.

Fam. *Cistineae*.

*Char.* Blomkronan regelbunden. Ståndarne många, fria. Stif-tet 1. Fröhuset enrummigt med fröfästen efter skalens midt, eller flerrummigt med centrala fröfästen.

Småbuskar med enkla, motsatta, glandellösa blad. Kronan och fodret fembladiga. De två yttre foderbladen mindre än de öfriga. — Tillhöra Polyandria, Monogynia.

360. *Solvända*. Qvartershög buske med uppstigande grenar. Bladen aflånga. Blommorna stora, gula. 7. Backar.

Fam. *Violarieae*.

*Char.* Blomkronan oregelbunden. Ståndarne 5 med sammanhångande knappar. Fröhuset enrummigt med fröfästen på skalen.

Örter med skiftevisa, enkla, stipeibärande blad och eusamma blommor i bladveckan. Blomfodret med bihang. Kronan fembladig med sporre. — Tillhöra Pentandria, Monogynia (Syngenesia, Monogamia enl. Linné).

362. *Luden Viol*. 4, 3—6 tum hög. Rotstocken grof. Bladen hjertlika, småludna. Blommorna på stängel, blå. 5, 6. Backar.

364. *Kärr-Viol*. 4, 3—6 tum hög. Bladen rundadt njurlika. Blommorna på stängel, blekt gridelina. 5, 6. Fuktiga ställen.

367. *Skogsviol*. 4, qvartershög. Bladen bredt hjertlika. Blommorna på stjelk, blå. 5—7. Skogsängar, lundar.

368. *Hundviol*. 4, qvartershög. Bladen aflångt hjertlika. Blommorna på stjelk, blå. 5—7. Backar.

370. *Styfmorsblomma*. ☉, qvartershög eller mera. Bladen äggrunda — aflånga med lyrformiga stipler. Blommorna på stjelk, mångfärgade, vauligen violetta och gula. 4—9. Berg och odlade ställen.

Fam. *Droseraceae*.

*Char.* Blomkronan regelbunden. Ståndarne till antalet bestämda (vanl. 5), fria. Stift flera. Fröhuset enrummigt eller ofullständigt flerrummigt, med fröfästen på skalen.

Örter med enkla, vid stjelkens bas rosettilikt hopade blad och femtaliga blomdelar. — Tillhöra Pentandria, deraf Parnassia Ordn. Tetragynia, Drosera Ordn. Pentagynia.

371. *Slätterblomma*. 4., 1—2 kvarter hög. Bladen hjertlika. Blommorna på enblommiga skaft, stora, hvita, med 5 mångstråliga honungsgömmen. 7, 8. Våta ängar.
372. *Daggört*. 4., kvartershög. Bladen långskaftade, med rundad, särdeles i kanten glandelhårig skifva. Blommorna i ensidig klase på stängel, hvita. 7. Kärr.

### Fam. *Silenaceae*.

*Char.* Blomfodret sambladigt, rörformigt, i toppen tandadt. Kronbladen 5, likformiga, med lång klo, jemte dubbla antalet ståndare fästa på ett under pistillen förlängdt fäste (torus). Fröhus af ett, eller flera ofullständiga, rum med fritt centralt fröfäste.

Örter med ledade stjelkar och motsatta, enkla blad. Blomkronan nejlikartad, ofta med bikronblad. Ståndarne 10, stiften 2, 3 eller 5. — Tillhöra Decandria, deraf Dianthus tillhör Ordn. Digynia, Silene Ordn. Trigynia och de öfriga Ordn. Pentagynia.

375. *Smällor*. 4., alnshög. Bladen lancettlika. Blomfodren uppblåsta, nätådriga. Blommorna hvita. 7, 8. Backar, åkerrenar.
376. *Klibbnejlika*. 4., 1—2 fot hög. Bladen lancettlika. Blomfodren cylindriska. Blommorna lutande, hvita. 6, 7. Backar.
381. *Tjärblomster*. 4. Stjelken fotsbög, med de öfra mellanlederna klibbiga. Bladen jemnbreda. Kronbladen hela eller urnupna, röda. 6, 7. Backar.
382. *Göklyst*. 4., alnshög. Bladen lancettlikt jemnbreda. Kronbladen med fyradelad skifva, röda. 7. Fuktiga ängar.
383. *Oxögon*. ☉, alnshög. Bladen jemnbreda. Blomfodren läderartade med långaflikar. Kronbladen med omvänt hjertlik skifva, röda. 7. Åkrar.
386. *Ängsnejlika*. 4., 1—2 kvarter hög. Bladen jemnbredt lancettlika. Blomfodren med holk af äggrunda blad. Kronbladen hela, naggade, röda. 7, 8. Ängsbackar.

### Fam. *Alsinaceae*.

*Char.* Blomfodret fribladigt. Kronbladen likformiga, med kort klo på nedtryckt fäste. Ståndarne af samma eller dubbelt så stort antal som föderbladen. Fröhuset med fritt, centralt fröfäste.

Örter med ledade stjelkar och motsatta, enkla blad. Blomkronan rosartad. Ståndarne vanligast 10, stundom 4 eller 5; stiften 3 eller 5. — Tillhöra Decandria, deraf Stellaria, Arenaria och Spergularia (Leptogonum) Ordn. Trigynia, Cerastium, Sagina och Spargula Ordn. Pentagynia.

389. *Narfgräs*. ☉. Stjelken svag, kvarters- fotslång, med en skiftevis mellan lederna gående långhårig strimma. Bladen äggrunda. Kronbladen kortare än fodret, tvådelade, hvita. 4—10. Odlade ställen.



390. *Kärr-Stjernört*. ☿. Stjelken nästan upprät, 2—3 kvarter hög. Bladen jemnbreda. Kronbladen längre än fodret, tvådelade, hvita. 6, 7. Stränder, våta ångar.
391. *Vanlig Stjernört*. ☿. Stjelken svag, 1—2 fot hög. Bladen jemnbreda. Foderbladen trenerviga. Kronbladen af fodrets längd, tvådelade, hvita. 6—8. Ångar, bland buskar.
392. *Långbladig Stjernört*. ☿. Stjelken svag, 1—2 fot hög. Bladen jemnbreda, med smalare, hårbräddad basis. Foderbladen med otydliga nerver. Kronbladen af fodrets längd, tvådelade, hvita. 6—8. Fuktig skogsmark.
394. *Hönstarmar*. ☉. Stjelken slak, småluden, 1—2 kvarter lång. Bladen aflånga. Kronbladen af fodrets längd, tvåklufna, hvita. 6—8. Backar.
396. *Hornört*. ☉. Stjelken upprät, 1—6 tum hög. Bladen ovala. Ståndarne 5. Kronbladen kortare än fodret, urnupna, hvita. 5. Backar.
398. *Sandling*. ☉. Stjelken upprät, månggrenig, 2—6 tum hög. Bladen bredt äggrunda, flernerviga, oskaftade. Kronbladen kortare än fodret, hela, hvita. 6, 7. Backar.
400. *Smånarf*. ☉. Stjelken nedliggande, med 3—6 tum långa grenar. Bladen jemnbredt sylrika. Ståndarne 4. Blommorna utan kronblad, med 4 blekgröna foderblad. 5—8. Fuktiga ställen.
401. *Spergel*. ☉. Stjelken svag, grenig, 1—3 kvarter hög. Bladen trådsmla, motsatta, med flera i bladveckan utvecklade grenblad, hvarigenom stjelken synes ega bladen i krans. Fröen med smal, ringformig, slät kant. Blommorna hvita. 7, 8. Åkrar.
403. *Fjällarve*. ☉. Stjelken nedliggande, med kvarterslånga grenar. Bladen trådsmla, något plattade, med hinnaktiga stipler. Blommorna röda. 6, 7. Backar, vägkanter.

### Fam. *Cucurbitaceae*.

*Char.* Blommorna skiljökönade med vanligen sammanväxta kronblad. Ståndarne fem, till en del hopväxta. Fruktämnet 3—5-rummigt, med fröfästen på väggarne, slutligen gurksfrukt.

Klängebarande örter med handlikt klufna, stråfhåriga, skiftevisa blad. — Tillhöra Monoecia, Polyadelphia.

*Gurka* (*Cucumis sativus*). ☉. Stjelken klängande. Bladen hjertlika, vinkluga, med spetsiga flikar. Frukten aflång. Blommorna gula. 6—8. Odlas allmänt.

*Melon* (*Cucumis Melo*). ☉. Stjelken klängande. Bladen hjertlika, vinkluga, med rundade flikar. Frukten klotrund eller oval. Blommorna gula. 6—8. Odlas.

### Fam. *Ribesiaceae*.

*Char.* Kronbladen och ståndarne vanl. 5, fria. Fruktämnet enrummigt, slutl. bär med 2 fröfästen på väggarne.

**Buskar med handnerviga, enkla, skiftevisa blad. — Tillhöra Pentandria, Monogynia.**

407. *Krusbärsbuske*. Omkring 2 alnar hög buske med tornbärande grenar (Tornarne bildade af förkrympta blad). Bladen bredt ägg-runda, treflikiga. Blomskäften ensamma, 1—3-blommiga. Blommorna brungröna. 4, 5. Bebyggda ställen, och allmänt odlad.
408. *Svart Vinbärsbuske*. Oväpnad, 3—4 fot hög buske. Bladen femflikiga, under hartsprickiga. Blommorna i klasar, klocklika, brungröna. 5. Bäckstränder, bergsrötter, äfvensom allmänt odlad.
409. *Röd Vinbärsbuske*. Oväpnad, 3—4 fot hög buske. Bladen femflikiga. Blommorna i klasar, skålförmiga, gula. 5. Lundar, äfvensom allmänt odlad.
410. *Måbärsbuske*. Oväpnad, 3—4 fot hög buske. Bladen treflikiga. Blomskärmen längre än blomskäften. Blommorna i klasar, gula. 5, 6. Skogsbackar.

**Fam. Saxifragaceae.**

*Char.* Blomfodret mer eller mindre vidväxt det tvåskaliga, 1—2-rummiga fruktämnets. Fröhusen öppnande sig i 2, af stiftet sprötspetsade skal.

Örter med enkla, vanligen spridda, blad. — Tillhör Decandria, Digynia.

411. *Stenbräcka*. 4, fotshög. Rotbladen skaftade, njurlika. Blommorna med dubbelt blomhülle, hvita. 6, 7. Backar.

**Fam. Crassulaceae.**

*Char.* Fruktämnena lika många som kronbladen, slutligen enrummiga, flerfröiga, fria fröhus (karpeller), hvarje med eget stift.

Saftiga örter med enkla blad. Kronbladen lika många som fodrets likar och skiftevisa med dem, stundom sammanhängande. — Sedum tillhör Decandria, Pentagynia.

414. *Hustök*. 4. Stjelken upprät, fotshög. Bladen stora, ägg-runda, platta, tjocka, sågade. Blommorna i tätta vippor, hvitgula. 8. Klippor, steniga backar.
416. *Fetknopp*. 4. Stjelken med nedliggande, fingerslånga grenar. Bladen skiftevisa, äggförmiga, trubbiga, glatta. Blommorna i greniga klasar, gula. 6, 7. Berg, backar.
417. *Hälleknoppar*. 4. Stjelken med nedliggande, kvarterslånga grenar. Bladen aflångt cylindriska, trubbiga. Blommorna i grenig vippa, hvita. 7, 8. Bergshällar.
418. *Bergknopp*. ☉, 2—4 tum hög. Bladen jemnbredt aflånga, halftrinda. Kronbladen föga längre än fodret, gula. 6, 7. Bergshällar.

**Fam. Lythraceae.**

*Char.* Blomfodren klock- eller bägarlika, af samväxta blad, tandade. Fröhusen fria, flerrummiga, mångfröiga med centralt fröfäste. Fröhvita saknas.

Örter med motsatta eller kraussittande, enkla blad. — *Lythrum* tillhör *Dodecandria*, *Monogynia*.

420. *Fackelblomster*. 4. Stjelken öfver alnshög med rikblommigt ax i toppen. Bladen aflångt lancettlika med något hjertlik basis, vanligen tre i krans. Blommorna röda. 7, 8. Stränder.

### Fam. *Onagraceae*.

*Char.* Blomfodret trattlikt, med pipen omgifvande och vidväxt det flerrummiga fruktämnet. Frukten: ett 2—4-rummigt fröhus med centralt fröfäste. Fröhvita saknas.

Örter med enkla, oftast motsatta blad. Blomfodrets bräm vanligen fyradeladt. Blomkronan oftast fyrabladig, krounbladen skiftevisa med foderflikarne. *Epilobium* tillhör *Octandria*, *Monogynia*.

423. *Mjölkört*. 4. Stjelken upprät, omkring 2 alnar hög. Bladen skiftevisa, lancettlika. Blommorna irreguliera, med nedböjda ståndare, röda. Backar, skogar.

426. *Backmjölke*. 4. Stjelken upprät, 1—4 kvarter hög. Bladen motsatta, kortskafade, äggrunda, sågtandade. Blommorna reguliera, röda. 7, 8. Skogsmark.

429. *Kärrmjölke*. 4. Stjelken trind, fluluden, 1—2 fot hög. Bladen motsatta, lancettlikt jemnbreda. Blommorna reguliera, röda. 7, 8. Kärr, stränder.

### Fam. *Hutorageae*.

*Char.* Blomfodret omgifvande och sammanväxt med fruktämnet, som är 1-flerrummigt med eufroliga, rum. Kronbladen flyktiga eller inga.

Örter med bladen vanligen i krans. Blommorna i bladvecken eller närmade i ax. — *Myriophyllum* tillhör *Monoecia*, *Polyandria*; *Hippuris* tillhör *Monandria*, *Monogynia*.

432. *Kamblad*. 4. Stjelken flera alnar lång, grenig. Bladen i krans, parbladigt delade, med trådsmala flikar. Alla blommorna i kransar, bildande bladlösa ax, hvita. 6, 7. Sjöar.

434. *Hästsvans*. 4, fotshög. Bladen i krans, jemnbreda. Blommorna i bladvecken, utan blomkrona. Ståndarknappen röd. 6—8. Stränder.

### Fam. *Pomaceae*.

*Char.* Blomfodret och kronan fembladiga, reguliera. Ståndarne omkring 20. Fruktämnen 1—flera, inväxta i och med fodrets basis slutligen bildande en äpplefrukt.

Träd eller buskar med spridda, vanligast enkla blad. Blommorna i qvastlika knippen eller flockar. — Tillhöra *Icosandria*, deraf *Pyrus* Ordn. *Pentagynia*, de öfriga Ordn. *Di-Tetragynia*.

435. *Päronträd*. Medelmåttigt högt träd. Bladen äggrunda, nästan helbräddade. Frukten afsmalnande emot skafet. Blommorna i qvast, hvita. 5, 6. Backslutningar, äfvensom allmänt odlad.

436. *Äppleträd*. Medelmåttigt högt träd. Bladen äggrunda, sågade. Frukten med intryckt basis. Blommorna i oskaftad flock, hvita eller rödletta. 5, 6. Ängsbackar, äfvensom allmänt odlad.
437. *Oxel*. Medelstort träd. Bladen äggrundt aflånga, inskuret sågade, under gråladna. Blommorna i tätta, qvastlika vippor, hvita. 6, 7. Lundar, backar.
438. *Rönn*. Medelstort träd. Bladen parbladigt delade med lancettlika, sågade flikar. Blommorna i jemnhöga vippor, gulhvita. 5, 6. Backar, bergiga skogar.
439. *Hagtorn*. 2—5 alnar hög buske. Bladen omvänt äggrunda, grundt treflikiga, med trubbiga flikar. Bären med benhårda fröhusrum. Blommorna i flocklik vippa, hvita. 5, 6. Backar, lundar.

Fam. *Senticosae*.

*Char*. Blommorna reguliera. Fruktämnena flera, fria, eller insänkta i fodrets bas, slutl. en- eller fåfröiga, åtskiljda småfrukter. Örter eller buskar, med spridda, enkla eller sammansatta, stipelbärande blad. Blomkronan rosartad. — Tillhöra Icosandria, Polygynia, utom Alchemilla, som tillhör Tetrandria, Monogynia och Agrimonia, som tillhör Dodecandria, Digynia.

443. *Nyponbuske*. 3—5 alnar hög buske. Grenarne kroktaggiga. Bladen parbladiga med ovala, enkelt sågade småblad. Nyponämnena aflånga, jemte skaften glatta. Blommorna röda. 6, 7. Backar.
446. *Nyponbuske*. 1—2 alnar hög buske. Taggarne raka. Småbladen rundadt ovala, dubbelsågade. Nyponämnena klotrunda med glandelhåriga skaft. Blommorna röda. 6, 7. Backar.
447. *Nyponbuske*. 1—3 alnar hög buske. Taggarne raka. Småbladen ovala, dubbelsågade. Nyponämnena rundadt elliptiska med glandelhåriga skaft. Blommorna röda. 6, 7. Backar.
449. *Åkermönja*. 4., alnshög. Bladen olikparigt parbladigt delade. Blommorna i långt ax i toppen, gula. 7. Åkerrenar, buskbeväxta backar.
451. *Daggkåpa*. 4., 1—2 kvarter hög. Bladen njurlika, 7—9-flikiga, med rundade flikar. Blommorna utan blomkrona, gröna. 5, 6. Ängsmark.
452. *Hallonbuske*. 1—2 alnar hög, med borsttaggiga grenar. Bladen parbladigt eller treflugradt delade, under hvita. Blommorna hvita. 6, 7. Backar, berg.
458. *Jungfrubär*. 4. Stjelken refvig, men alnslånga, sträfvä, krypande refvor. Bladen treflugradt delade. Blommorna hvita. 6. Steniga backar.
459. *Åkerbär*. 4. Stjelken kvartershög, utan refvor, 1—3-blommig. Bladen treflugradt delade. Blommorna röda. 6. Svedjeland, dikeskanter. Allmän i Norrland.
460. *Hjortron*. 4. Stjelken kvartershög, enblommig. Bladen njurlika, 5—7-flikiga. Blommorna tvåbyggare, hvita. 6. Skogskärr.

461. *Smultron*. 2. Stjelken 4—6 tum hög med trådsmla refvor. Bladen trefningradt delade. Fruktfästet uppsväldt, saftigt (smultron). Frukterna: enfröiga karpeller. Blommorna hvita. 5, 6. Backar.
463. *Jordgubbar*. 2, 4—6 tum hög. Bladen trefningradt delade med flikarnes uddtand kortare än sidotänderna. Pistillernas fäste hårigt. Fruktfäste och frukt som föreg. Blommorna hvita. 5, 6. Backar.
464. *Kråkklöfver*. 2, alnshög. Bladen parbladigt delade, under grågröna. Fruktfästet svampigt, torrt. Blommorna rödbruna. 6, 7. Kärr.
465. *Gåsgräs*. 2. Stjelken med fotslånga refvor. Bladen parbladigt delade, under hvita. Blommorna på enblommiga skaft från bladveckan, gula. 7, 8. Betesmarker, dikeskanter.
467. *Fingerört*. 2. Stjelken krypande, 1—3 fot lång. Bladen femfingradt delade, långskaftade. Blommorna ensamma i bladveckan, långskaftade, stora, gula. 7, 8. Backslutningar, åkerrenar.
468. *Femfingerört*. 2. Stjelken uppstigande, fotsög med blomvippa i toppen. Bladen femfingradt delade, under hvita. Blommorna med fem gula kronblad. 6, 7. Backar.
469. *Backguld*. 2. Stjelken 3—6 tum hög, långhårig. Rotbladen femfingradt, stjelkbladen trefningradt delade. Stiplerna lancettlika. Blommorna med 5 gula kronblad. 4, 5. Backar.
470. *Backguld*. 2. Stjelken 1—2 kvarter hög, småluden. Bladen som föreg. Stiplerna äggrunda. Kronbladen fem, gula, med en brandgul fläck vid basen. 5, 6. Backar.
471. *Blodrotsört*. 2, 1—3 kvarter hög. Bladen trefningradt delade. Blommorna med 4 gula kronblad. 6—8. Betesmarker, skogar.
472. *Nejlikört*. 2, 2—3 fot hög. Rotbladen parbladigt delade; stjelkbladen tredelade. Karpellerna med 1 spetsen klolikt krökta spröt. Blommorna gula, uppräta. 6, 7. Lundar, bergsrötter.
474. *Hummelblomster*. 2, 1—3 kvarter hög. Bladen och karpellerna som föreg. Blommorna lutande, klocklika, med blekgula kronblad. 5, 6. Fuktiga ängar.
476. *Älggräs*. 2, 1—2 alnar hög. Bladen olikparigt parbladigt delade, med äggrunda, dubbelsågade flikar. Karpellerna flerfröiga, vridna. Blommorna hvita. 6, 7. Fuktiga ängar.
477. *Brudbröd*. 2, alnshög. Bladflikarne lancettlika, parflikiga. Karpellerna flerfröiga, raka. Blommorna hvita. 7. Backar.

### Fam. *Drupaceae*.

*Char.* Blomman regler med rosartad krona. Fruktämnet fritt, inom blomman, slutl. enfrög stenfrukt.

Träd eller buskar med hela, spridda blad och affallande stipler. Blomfodret femklufvet, affallande. — Tillhöra Icosandria, Monogynia.

478. *Plommonträd*. 4—8 alnar högt. Bladen ovala. Blomskaffet

- parvisa. Frukterna elliptiska. Blommorna hvita. 5, 6. Gamla trädgårdar och allmänt planterad.
- Krikonträd* (*Prunus institia*). 4—8 alnar högt. Liknar föreg., men har frukterna klotrunda, daggbå. 5, 6. Odlas.
479. *Slänbuske*. 1—4 alnar hög. Bladen bredt lancettlika. Blomskäften ensamma. Frukterna klotrunda, daggbå, kärva. Blommorna hvita. 5. Backar.
480. *Körsbärsträd*. 4—8 alnar högt. Bladen ovala, glatta, utan glandler på skaftet. Blommorna i skaftad flock, hvita. 5. Odlas allmänt.
481. *Fogelbärsträd*. 4—8 alnar högt. Bladen vanl. ovala, med tvåglandlade skaft. Blommorna i oskaftad flock, hvita. 5. Ängsbackar, lundar.
482. *Hägg*. Medelstort träd. Bladen ovala. Blommorna i utdragna, mångblommiga klasar, hvita. 5. Ängsbackar, lundar.

### Fam. *Papilionaceae*.

*Char.* Blomkronan irregulär, fjärrlik. Frukten: balja. Fröen utan hvite.

Örter (i södra Sverige äfven buskar och i varmare länder träd) med spridda, vanl. sammansatta blad och stipler. — Tillhöra *Dia-*  
*delphia*, *Decandria*.

*Turkiska Bönor* (*Phaseolus vulgaris*). ☉,  $\frac{1}{2}$ —8 alnar hög. Småbladen äggrunda, spetsade. Blomklasarne skaftade, kortare än bladen. Baljorna hängande, nästan raka. 7, 8. Odlas i många varieteter.

*Grärter* (*Pisum arvense*). ☉, 1—3 fot hög. Bladen parbladiga med klängen. Fröen kantiga, gråspräckliga. Blommorna med ljus violett segel och purpurroda vingar. 6, 7. Odlas.

*Hvita Ärtor* (*Pisum sativum*). ☉, 1—2 alnar hög. Bladen som föreg. Fröen runda, hvita eller gröna. Blommorna hvita. 6, 7. Odlas allmänt.

486. *Gigalsärter*. 4., alushög. Bladen enpariga, med grenigt klänge. Blommorna gula. 7, 8. Ängar, åkerrenar.

488. *Kråkärter*. 4., 1—2 fot hög. Bladen trepariga, med äggrunda, spetsade småblad och syliskt klängeämne. Blommorna röda eller violetta. 5. Lundar.

489. *Gökmat*. 4., fotshög. Bladen trepariga, med lancettlika småblad. Blommorna röda. 5, 6. Lundar, backar.

494. *Tranärter*. ☉. Stjelken ulligt luden, öfver alushög, svag. Bladen mångpariga med smalt lancettlika småblad och grenigt klänge. De nedra blomfodertänderna trådmala. Blommorna i ensidiga, mångblommiga klasar, violetta. 7, 8. Åkrar.

495. *Tranärter*. 4. Stjelken kort småluden, alushög. Bladen som föreg. De nedra blomfodertänderna lancettlika. Blommorna i mångblommiga klasar, blå. 6—8. Åkrar och bland buskar.

496. *Buskvicker*. 4. Stjelken upprät, 1—2 fot hög. Bladen mångpariga med aflångt äggrunda, trubbiga småblad. Blom-

- morna i 3—5-blommiga, kortskaftade klasar, röda. 5, 6. Ängsbackar.
497. *Vicker*. ☉, omkring alshög. Bladen mångpariga med omvänt äggrunda, i spetsen intryckta småblad. Blommorna parvisa, röda. 7. Åkrar, hvarst den äfveu odlas.
- Bondbönor* (*Vicia Faba*). ☉. Stjelken upprät, 2—3 fot hög. Bladen 2—3-pariga med aflångt äggrunda, trubbade småblad och kort klänge. Blommorna i 2—4-blommiga klasar, hvita med svartfläckiga vingar. 6, 7. Odlas.
500. *Dufslins*. ☉. Stjelken spenslig, fotslång. Bladen 6—8-pariga med jemnbreda småblad och klänge. Baljorna tvåfröiga, ljdna. Blommorna på flerblommiga skaft, ljusblå. 6, 7. Åkrar, backar.
501. *Sparffslins*. ☉. Stjelken spenslig, fotslång. Bladen 3—4-pariga med jemnbreda småblad. Baljorna fyrfröiga, glatta. Blommorna på 1—3-blommiga skaft, ljusblå. 6—8. Backar.
503. *Küringtänder*. ☿. Stjelken nedliggande med 1—2 kvarter långa grenar. Bladen trefngrade med omvänt äggrunda småblad. Blommorna i omkr. femblommiga, skaftade hufvuden, gula. 5, 6. Backar.
506. *Gul Luzern*. ☿. Stjelken nedliggande med aloslånga, uppböjda grenar. Bladen trefngrade med smalt aflånga, i spetsen tandade småblad. Baljorna halfmånformiga. Blommorna i mångblommiga, skaftade hufvuden, gula. 6, 7. Backar, åkerrenar.
507. *Humleklöfver*. ☉, fotshög. Bladen trefngrade med omvänt äggrunda småblad. Baljorna njurlika. Blommorna i ovala, mångblommiga hufvuden, gula. 6—8. Åkerrenar, vägkanter.
511. *Hvitväpling*. ☿. Stjelken krypande, med 1—2 kvarter långa blomhufvudskäft från bladveckan. Bladen trefngrade, med omvänt äggrunda småblad. Blommorna hvita. 6—9. Ängsmark.
512. *Alsikeväpling*. ☿. Stjelken uppstigande, 1—2 fot hög. Bladen trefngrade med äggrunda småblad. Blommorna hvita eller rödletta. 7, 8. Fuktig ängsmark, dikeskanter.
518. *Harklöfver*. ☉, 1—2 kvarter hög. Bladen trefngrade, med n. jemnbreda småblad. Blommorna i mycket håriga hufvuden, rödletta. 6, 7. Backar.
519. *Skogsväpling*. ☿. Stjelken uppstigande, flerböjd, 2—3 kvarter hög. Bladen trefngrade med lancettlika småblad och jemnbreda stipler. Blommorna i stora, klotrunda hufvuden, röda. 6—8. Skuggig ängs- och skogsmark.
520. *Rödväpling*. ☿. Stjelken trefngrade med omvänt äggrunda småblad och äggrunda stipler. Blommorna i äggrunda hufvuden, röda. 6—8. Ängar.
523. *Räfklor*. ☿, fotshög. Bladen lyrformigt parbladiga. Blommorna i tvenne närsittande, mångblommiga hufvuden, gula. 7. Ängsbackar.

Fam. *Ericineae*.

*Char.* Blommorna tvåkönade. af 4—5 mer eller mindre sammanväxta eller fria kronblad. Frukten: ett flerrumligt, mångfröigt fröhus eller bär med centrala fröfästen. Stiftet enkelt.

Buskar eller småbuskar med hela, vanligen quarsittande och läderartade blad utan stipler. — Tillhöra Octandria och Decandria.

Afd. 1. *Vaccinææ*: Frukten bärartad, beklädd af blombodrets basis (=sittande under blomman). — Tillhöra Octandria, Monogynia.

524. *Blåbär*. 2—3 kvarter hög buske med kantiga grenar. Bladen äggrunda, sågade, affallande. Blommorna från bladvecken, med klotrund, rödlett krona. 5. Skogar.

525. *Odon*. Alnshög buske med trinda grenar. Bladen omvänt äggrunda, helbräddade, affallande. Blommorna från egna knoppar, med rundadt klocklik, hvit eller rödlett krona. 5. Skogskärr.

526. *Tranbär*. Refvig buske med trådlika, krypande, fotslånga grenar. Bladen äggrunda, med tillbakavikna, helbräddade kanter. Blommorna i smågrenarnes toppar, med hjulformig, fyrdelad, röd krona. 5, 6. Tufviga kärr.

527. *Lingon*. Nedliggande, ständigt grönskande buske med uppstigande, fotslånga grenar. Bladen omvänt äggrunda, under punkterade, med tillbakavikna, sågade kanter. Blommorna i klasar i toppen, med klocklika, hvita eller rödletta kronor. 5. Skogsbackar.

Afd. 2. *Ericææ*: Frukten fri, inom blomman (bär hos *Arctostaphylos*, fröhus hos de öfriga). Frön utan hylle. — Tillhöra Decandria, Monogynia, utom *Calluna*, som tillhör Octandria, Monogynia.

528. *Mjölön*. Nedliggande, ständigt grönskande buske, med alnslånga, utbredda grenar. Bladen omvänt äggrunda, helbräddade, under ådriga. Bären saftlösa, röda. Blommorna i klasar i smågrenarnes toppar, med äggformiga, rödletta kronor. 5. Skogshedar.

529. *Blomris*. 1—3 kvarter hög, ständigt grönskande buske. Bladen lancettlikt jemnbreda med tillbakavikna kanter, under gråhvit. Blommorna i grenarnes toppar, med äggformiga, rödletta kronor. 5, 6. Kärr.

530. *Ljung*. Fotsbög, ständigt grönskande buske. Bladen små, motsatta, oskaftade, med pillik basis. Blommorna i ensidiga klasar, med fyrklufna, röda kronor. 8. Hedar, skogar.

531. *Sqvattram*. Alnshög, ständigt grönskande buske. Bladen smalt aflånga med tillbakavikna kanter, under brunulliga. Blommorna i flock i toppen, med fembladig, hvit krona. 6. Skogskärr.

Afd. 3. *Pyrolææ*: Frukten: fritt fröhus. Fröen omgifna af ett aflångt hylle. — Tillhöra Decandria, Monogynia.

532. *Vanlig Vintergrön*. Buskartad, ständigt grönskande, kvartershög, blommande öfver fotsbög. Bladskifvan rundad, af bladskaflets längd. Blommorna i klase, med nedböjd pistill och fembladiga, hvita kronblad. 7, 8. Skogar.



535. *Vintergrön*. Buskartad, ständigt grönskande, blommande quartershög. Bladen rundade. Blommorna i klase, nästan klotrunda och tillslutna, med rakt, kort stift, hvita. 7, 8. Skogar.
536. *Ensidig Vintergrön*. Buskartad, ständigt grönskande, blommande quartershög. Bladen ovala, spetsiga, sågade. Blommorna i ensidig klase, grönhvita. 7, 8. Skogar.
537. *Enblommig Vintergrön*. Buskartad, ständigt grönskande, enblommig, blommande quartershög. Bladen bredt äggrunda, sågade. Blomman stor, hvit. 7. Fuktig skogsmark.
539. *Tallört*. 4., 1—2 kvarter hög. Stjelken bladlös, fjällig. Blomkrona i lutande klase, gula. 7, 8. Skogsmark.

Fam. *Empetreae*.

*Char.* Blommorna skiljdhönade med tretaliga delar. Fruktämnet fritt, niorummigt, slutligen bär, med lika många enfröiga rum.

Ljunglika buskar med helbräddade, barrlika blad och blommor i bladvecken. — Tillhöra Dioecia, Triandria.

540. *Kråkris*. Fotshög buske med nedliggande grenar. Bladen barrlika, jemnbredt aflånga, med en blek fåra på undre sidan. Blommorna små, mörkt violetta. 4, 5. Hedar, skogar.

Fam. *Euphorbiaceae*.

*Char.* Fruktämnet fritt, 2—3-rummigt med centralt fröfäste, slutligen 2—3-knöligt fröhus, uppspringande med lika många skal. Fröen hängande, 1—2 i hvarje rum.

Örter, vanligen innehållande en giftig mjölksaft. — Euphorbia tillhör Dodecandria, Trigynia.

543. *Rüfmjolk*. ☉, fotshög. Bladen omvänt äggrunda, vigglika. Blommorna i femstrålig flock i stjelkens topp, gula. 7—9. Åkrar, trädgårdsland.

Fam. *Paronychieae*.

*Char.* Blomfodret femdeladt. Stiften 2—3. Frukten: ett enrummigt, enfröigt fröhus med centralt fäste.

Örter med motsatta, helbräddade blad och hinnaktiga stipler. — Herniaria tillhör Pentandria, Digynia; Scleranthus tillhör Decandria, Digynia.

546. *Vägrört*. 4. Stjelken utbredd, med 3—6 tum långa, platta, nedtryckta grenar. Bladen aflånga, omvänt äggrunda, glatta. Blommorna talrika, gyttrade i öfra bladvecken, gulgröna. 7, 8. Backar, vägkanter, hedar.
547. *Hvit Knafvel*. ☉, fingerhög, blåaktig. Bladen syllika. Blomkalkens flikar bredt hinnkantade, trubbiga, hvarigenom blommorna synas grönhvita. 6. Backar.
548. *Grön Knafvel*. 4., fingerhög, ljusgrön. Bladen syllika. Blomkalkens flikar spetsiga, föga hinnkantade. Blommorna gröna. 6, 7. Backar, åkrar.

Fam. *Polygonace.*

*Char.* Blomhylllet 3—6-deladt eller 3—6-bladigt. Frukten enfröig, antingen en liten nöt eller hinnfrukt.

Örter med enkla, spridda blad och stipelslidor. — *Fagopyrum* och *Polygonum* tillhöra *Octandria*, *Trigynia*; *Rumex* tillhör *Hexandria*, *Trigynia*.

*Bohve* (*Fagopyrum esculentum*). ☉. Stjelken upprät, fotshög. Bladen pillformigt hjertlika. Blommorna i tätta klasar, rödletta. 7. Åkrar. Allmänt odlad i Skåne.

550. *Mortog*. ♀, fotshög. Bladen lancettlika. Blommorna i ax, hvita eller rödletta; de nedra blomknopparne öfvergående till knopplökar. 6, 7. Fuktig ängsmark.

551. *Vattennäfva*. ♀. Stjelken på den i vatten växande formen flera alnar lång. Bladen aflånga, flytande. Blommorna i aflånga ax, ljusröda. 7, 8. Sjöar och floder.

552. *Röknäfva*. ☉, alnshög. Bladen äggrundt lancettlika. Stipelslidorna med hårig yta, men hårlös kant. Axen tätblommiga, aflånga, med sträp prickiga skaft. Blommorna blekgula eller rödletta. 7, 8. Odlade och fuktiga ställen.

554. *Röknäfva*. ☉, alnshög. Bladen lancettlika. Stipelslidorna hårbräddade. Axen tätblommiga, aflånga, på glatta skaft. Blommorna hvita eller rödletta. 7, 8. Odlade och fuktiga ställen.

556. *Jungfrutvål*. ☉, alnshög. Bladen smalt lancettlika, vågiga. Axen glesblommiga. Blommorna sträp prickiga, rödaktiga. 8, 9. Diken, stränder.

557. *Trampgräs*. ☉. Stjelken nedliggande med ofta alnslånga grenar. Blommorna i bladveckan, oskaftade, hvita eller rödletta. 5—10. Gårdar, vägkanter.

558. *Binda*. ☉. Stjelken slingrande, alnslång eller mera. Bladen hjertlikt pillika. Blommorna i blomklasor i bladveckan, hvitgröna, utan vinge på fikarnes rygg. 7. Åkrar och backar.

561. *Vägsyra*. ♀, 3—6 fot hög. Bladen hjertlikt aflånga. Blomkransarne åtskilda. Fruktofoderbladen grynbarande. Blommorna tvåkånade, grönbruna. 7. Vägkanter, rännen.

563. *Strandsyra*. ♀, 2—4 alnar hög. Bladen lancettlika, platta. Blomklasarne tätblommiga. Fruktofoderbladen grynbarande. Blommorna tvåkånade, grönbruna. 7. Stränder.

566. *Svinsyra*. ♀, alnshög. Bladen lancettlika, vågiga. Blomklasarne tätblommiga. Fruktofoderbladen grynbarande. Blommorna tvåkånade, grönbruna. 7. Gårdar, vägkanter.

567. *Gårdsyra*. ♀, alnshög. Bladen aflångt lancettlika, vågiga. Blomklasarne tätblommiga. Fruktofoderbladen utan gryn. Blommorna tvåkånade, grönbruna. 7, 8. Gårdar, vägkanter.

568. *Hästsyra*. ♀, 3—6 fot hög. Bladen hjertlika. Blomklasarne tätblommiga. Fruktofoderbladen utan gryn. Blommorna tvåkånade, grönbruna. 7. Stränder.

569. *Ängssyra*. ☉, alnshög. Bladen lancettlikt äggrunda med pillik basis. Blommorna tvåbyggare, brungröna. 6, 7. Ängsmark.

570. *Bergssyra*. ☉, fotshög. Bladen lancettlikt jemnbreda med spjutlik basis. Blommorna tvåbyggare, grönbruna. 6, 7. Berg, backar.

Fam. *Thymelaeae*.

*Char.* Blomkalkens flikar i knoppen tegellagda. Ståndarne fästa i pipen, dubbelt så många, som kalkflikarne. Fruktämnet fritt inom kalken, enrummigt, med ett hängande frö.

Buskar med vanl. spridda, helbräddade blad utan stipler. — Tillhör Octandria, Monogynia.

571. *Tibast*. 3—4 fot hög buske, blommande på bar qvist. Bladen lancettlika. Frukten: röda stenfrukter. Blommorna oskafade, 3—5 tillsammans, röda. 4, 5. Skogsängar.

Fam. *Ulmaceae*.

*Char.* Blommorna tvåkönade. Fruktämnet fritt med två stift, slutt. enrummig, enfröig, platt vingfrukt.

Träd, med enkla, spridda, sträfvä, vid basen sneda blad. — Tillhör Pentandria, Digynia.

573. *Alm*. Stort träd, blommande på bar qvist. Bladen äggrunda, dubbelsågade. Frukten cirkelrund. Blommorna kortskaftade, brunaktiga. 5. Lundar.

Fam. *Urticaceae*.

*Char.* Blommorna skiljdkönade med ett stift. Frukten nötlik, enfröig.

Örter med vanl. motsatta, enkla, sträfvä eller brännande blad. Blomkalken foderlik. — *Urtica* tillhör Monoecia, Tetrandria; *Humulus* och *Cannabis* tillhöra Dioecia, Pentandria.

574. *Humle*. ♀. Stjelken flera samnar lång, slingrande. Bladen handlikt femflikiga. Hanblommorna i yfvig vippa, gulgröna; honblommorna i kottelika ax med tunna fjäll = humla. 7. Stenrös, men allmänare odlad.

*Hampa* (*Cannabis sativa*). ☉. Stjelken alnshög eller högre, upprät. Bladen djupt 5—7-delade, med lancettlika, grofsågade flikar. Blommorna i vippor i bladveckan och toppen. 7, 8. Sjelfsådd på sopbackar, men allmänare odlad.

575. *Eternüssla*. ☉, fotshög. Bladen motsatta, ovala, djupt sågade. Blommorna i parvisa vippor, gulgröna. 6—9. Odlade ställen.

576. *Bränn-Nüssla*. ♀, omkring 2 alnar hög. Bladen motsatta, hjertlika, spetsade, grofsågade. Blommorna i klaselika vippor. 6, 7. Vägkanter, bland buskar och stenrös.

Fam. *Chenopodiaceae*.

*Char.* Blomkalken foderlik, med ståndarne fästa i kalkens boten. Fruktämnet enrummigt, enfröigt, slutligen en nötlik frukt, omgifven af den quarsittande kalken.

**Örter med enkla blad utan stipler.** Blommorna dels en- dels tvåkönade. — *Atriplex* tillhör *Polygamia*, *Monoecia*; *Spinacia* tillhör *Dioecia*, *Tetrandria*; *Beta*, *Blitum* och *Chenopodium* tillhöra *Pentandria*, *Digynia*.

*Trädgårdsmålla* (*Atriplex hortensis*) ☉, 1—2 alnar hög. Bladen triangelformigt hjertlika, bugttandade, på båda sidor gröna. Blommorna gröna. 7, 8. Förvildad i trädgårdar och plantager; allmänt odlad.

579. *Vägmålla*. ☉, 1—2 fot hög, med utspärrade grenar. De öfra bladen lancettlikt jemnbreda, helbräddade, de nedra äggrundt lancettlika med två utdragna, något framåtriktade likar vid basen. Blommorna gröna. 6—9. Vägkanter, odlade ställen.

*Spensat* (*Spinacia oleracea*). ☉, 1—2 fot hög. Bladen aflångt äggrunda, stundom med spjutlik basis. Blommorna i gyttringar, gröna. 6—8. Odlas allmänt, och förekomma deraf två varieteter, som stundom anses såsom arter: *Spinacia inermis*, med obeväpnade frukter, och *Spinacia spinosa* med tornbärande frukter.

*Rödbeta* (*Beta vulgaris*). ☉. Stjelken 2—3 alnar hög, upprät. Roten tjock, enstjelkig. Rotbladen hjertlikt äggrunda, stjelkbladen rufformigt äggrunda. Blommorna i 2—3-blommiga blomgyttringar, bildande bladiga ax, grönaktiga. 7. Odlas allmänt och under olika former, deraf Hvitbetan är mycket bekant.

584. *Blåmålla*. ☉. Stjelken nedliggande med fotslänga grenar. Bladen aflånga, trubbiga, bugttandade, under blygrå. Blommorna i gyttringar, bildande bladlösa klasar, gröna. 7—9. Gator.

585. *Stolt Henrik*. 4. Stjelken upprät, alnshög. Bladen spjutlikt triangelformiga. Blomgyttringarne i tätt, grenigt ax, med gröna blommor. 6—8. Vägkanter, gårdar.

588. *Svinmålla*. ☉. Stjelken upprät, alnshög. De öfra bladen lancettlika, helbräddade, de nedra äggrunda, trubbtandade, oftast under hvitmjöligen. Blomgyttringarne i greniga ax med gula blommor. 7—9. Odlade ställen.

### Fam. *Cupuliferae*.

*Char.* Blommorna sambyggare. Honblommans hylle vidväxt det 2—6-rummiga fruktämnet. Frukten slutl. genom felslagning enrummig, enfröig nöt, mer eller mindre omsluten af ett bägarfoder, bildadt af hängesjällen.

Träd eller buskar med spridda, enkla blad och affallande stipler. Hanblommorna i hänge; honblommorna dels i hänge, dels i oskaftade gyttringar. — Tillhöra *Monoecia*, *Polyandria*.

591. *Ek*. Högt träd med aflångt omvänt-äggrunda, bugtlikiga blad. Ollonen skaftade, aflångt elliptiska. Blommorna i smala, glesblommiga hängen, grönaktiga. 5. Ängsbackar.

*Bok* (*Fagus sylvatica*). Högt träd med ovala eller omvänt äggrunda, glänsande, hårbräddade blad. Ollonen tvenne till-

sammans inom ett stort, fröhuslikt svepe. Blommorna i rundade, skaftade hängen, grönaktiga. 5. Bildar skogar i södra Sverige.

*Afvenbok* (*Carpinus Betulus*). Mindre träd eller stor buske med äggrunda, djupt och hvasst dubbelsågade blad. Nöten ensam, liten, omfattad af de vinglika hängefjällen. Blommorna i utdragna hängen, grönaktiga. 5. Växer i södra Sveriges löfskogar.

592. *Hassel*. 5—8 alnars hög buske med glandelhårliga grenar och blommor på bar qvist. Bladen rundade, smalspetsade, sågade, med hjertlik basis. Hanhängena cylindriska, gulgröna, honhängena knopplika. Nötterna med stora, likliga svepeblad. 4, 5. Ängsbackar, skogsängar.

### Fam. *Salicineae*.

*Char*. Tvåbyggare. Hängena af tegellagda, enkla fjäll, hysande i sin vinkel ett glandellikt eller strutlikt blombylle. Frukten enrummig, tvåskalig (fröbus), med fröfasten på skalen och talrika frön med fröfjun, utan hvita.

Träd eller buskar med spridda, enkla blad och dels qvarsittande, dels affallande stipler. Blommorna i hängen af enblommiga fjäll. — Tillhöra *Dioecia*, *Salix* Ordn. *Diandria*, *Populus* Ordn. *Polyandria*.

593. *Asp*. Høgt träd, blommande på bar qvist. Bladen trubbtandade, på båda sidor gröna, med från sidan plattade bladskäft. Blommorna i cylindriska, gråludna hängen. 4, 5. Backar, skogsängar.

*Svartpoppel* (*Populus nigra*). Høgt träd med utstående grenar, blommande på bar qvist. Bladen deltoidiska med n. tvärhuggen basis, spetsade, trubbsågade, på båda sidor mörkgröna. Blommorna i smala, nästan glatta, brung gröna hängen. 4, 5. Allmänt planterad vid vägar och i parker.

*Pyramidpoppel* (*Populus pyramidalis*). Høgt träd med n. uppräta grenar, blommande på bar qvist. Bladen deltoidiskt rutformiga, spetsade, på båda sidor gröna. Blommorna i cylindriska, nästan glatta hängen. 4, 5. Allmänt planterad på gårdar och i parker.

*Balsampoppel* (*Populus balsamifera*). Høgt träd med utstående grenar och hartslibbiga knoppar, blommande på bar qvist. Bladen äggrunda, under blekgröna. Hängena smala, glatta, brung gröna. 5. Allmänt planterad vid vägar.

594. *Jolsterpil*. Medelstort träd eller 3—5 alnar hög buske med blad och blommor liktidiga. Bladen aflånga — omvänt äggrunda, sågade, med kortelbärande skäft. Blommorna i aflångt cylindriska, gula hängen. Hanblommorna med 4—6 ståndare. 5. Skogsängar, stränder.

595. *Grön pil*. Medelstort träd eller 3—5 alnar hög buske med sköra grenveck samt blad och blommor samtidigt. Bladen

- lancettlika, snedspetsade, under isgrå. Hängena aflångt cylindriska, gula. Hanblommorna med 2 ståndare (såsom de följande). 5. Stränder och planterad vid vägar.
596. *Hvit pil*. Medelstort träd med blad och blommor samtliga. Bladen lancettlika, under hvitt silkeshåriga. Hängena upprätta, gula. 5. Planterad vid vägar och gårdar.
599. *Krypvide*. Fotshög- alnshög buske, blommande på bar qvist. Bladen aflånga — ovala, under hvitgrå. Hanhängena gula. 4, 5. Kärr.
600. *Vide*. 3—6 fot hög buske, blommande då bladen nyss börjat utvecklas. Bladen omvänt åggrunda, vågbräddadt sågade, lätt svartnande under torkning. Blommorna gula. 5. Skogsängar.
601. *Gråvide*. 2—5 alnar hög buske med glatta grenar och blommor på bar qvist. Bladen omvänt åggrunda, gråludna, med kort och tillbakaböjd spets. Blommorna gula. 4, 5. Skogsängar, berg.
602. *Sälg*. Medelstort träd eller större buske med glatta grenar och blommor på bar qvist. Bladen aflångt omvänt åggrunda, sågade, under gråludna. Blommorna gula. 4, 5. Skogar och skogsängar.
603. *Gråvide*. Större buske med blomning på bar qvist och de yngre grenarne ludna. Bladen lancettlika, under gråludna. Blommorna gula. 4, 5. Skogsängar.
604. *Korgvide*. Hög buske med vidjelika grenar och blomning på bar qvist. Bladen lancettlikt jemnbreda med helbräddade, tillbakaböjda kanter, under silfverglänsande silkeshåriga. Blommorna gula. 4, 5. Planterad på fuktiga ställen i parker och vid vägar.

### Fam. *Betulineae*.

*Char.* Sambyggare. Hanhängena af sammansatta, sköldlika fjäll, hysande 1—3 blommor. Honblommorna utan hylle. Fruktämnet tvårummigt, med ett frö i hvarje rum. Frukten nöttlik eller vingfrukt.

Träd eller buskar med spridda, enkla blad. — Tillhöra *Monocia*: *Betula* Ordn. *Polyandria*; *Alnus* Ordn. *Tetrandria*.

605. *Björk*. Høgt träd med blommor och blad samtliga, hvit näfver och ofta hängande smågrenar. Bladen åggrundt deltoidiska, dubbelsågade, spetsade. Frukthängesfjällenas sidoflikar rigtade utåt. 5. Skogar.
606. *Björk*. Medelstort träd med blommor, bark och smågrenar som föregående. Bladen åggrunda, enkelt sågade, spetsiga. Frukt-hänge-fjällens sidoflikar rigtade framåt. 5. Skogar.
607. *Al*. Träd, blommande på bar qvist. Bladen bredt omvänt åggrunda, dubbelsågade, i spetsen tvärhuggna eller något in-

tryckta. Honhängena öfvergående till kottar. 3, 4. Fuktig skogsmark, stränder.

Fam. *Myrtaceae*.

*Char.* Blommorna i hängen af enkla fjäll. Honblommorna med hylleämne af mycket små fjäll. Frukten i kotte af små, enfröiga stenfrukter.

Buske med spridda, hela, punkterade blad. — Tillhör Dioecia, Hexandria.

608. *Pors.* Alusbög buske, blommande på bar qvist. Bladen vigglikt lancettlika, i spetsen sågade. Hängena brunaktiga. 4, 5. Stränder, kärr.

Fam. *Coniferae*.

*Char.* Hanblommorna i korta hängen eller gyttningar utan hylle. Honblommorna gytttrade, slutligen bildande en fjällig eller bärlik kotte, innehållande enfröiga, nötliska frukter. 1

Barrträd eller buskar med barrlika blad. — Pinus tillhör Monoecia, Monadelphica; Juniperus och Taxus tillhöra Dioecia, Monadelphica.

609. *Tall.* Hög träd med de yngre grenarne i krans. Barren parvisa, fleråriga, halftrinda, af den äggrunda kottens längd. Hanblommorna gula, honblommorna röda. 5. Bildar skogar.

*Lärkträd* (Pinus Larix). Träd, som stundom uppnår stor höjd. Barren i knippe, platta, årligen affallande. Kotten äggrund. Blommorna som föreg. 5. Allmänt planterad.

610. *Gran.* Hög träd med på undra sidan plattade qvistar. Barren ensamma, fyrkantiga, fleråriga. Kotten anhängt cylindrisk. Blommorna som föreg. 5. Bildar skogar.

611. *En.* 3—10 fots hög buske. Barren tre i krans, jemnbredt syltlika, spetsiga. Kotten bärlik, blåaktig (Enbär). Blommorna i små, kottelika hängen. 6. Hedar, skogar.

612. *Idegran.* Mindre träd med platta greuar. Barren jemnbreda, platta, tvåsidigt fästa. Kotten bärlik, röd. 5. Sällsynt i södra och medlersta Sveriges skogar; oftare planterad i parker.

Fam. *Equisetaceae*.

*Char.* Ståndarne ofullständiga. Blommorna i toppax af kransvisa, sköldlika fjäll med frögömmen på undra sidan, innehållande talrika groddkorn, fästa vid 4 spiralvridna springtrådar (felslagna ståndare?).

Örter med krypande rotstockar, utskjutande ledade, bladlösa, slidförande stjelkar med kranssittande grenar. — Tillhöra Cryptogamia, Filices.

613. *Åkerfräken.* 4, med 1—2 kvarter höga, inuti flerpipliga stjelkar. Den axbärande stjelen grenlös, den ofruktsamma med enkla grenar. 4, 5. Fuktig åker- och ängsmark.

615. *Skogsfräken*. 4, med 1—2 fot höga stjelkar. Den axbärande stjelken med greniga kransgrenar. 5, 6. Skogsångar.
616. *Kärrfräken*. 4, med 1—3 kvarter höga, inuti flerpipliga stjelkar. Axbärande stjelken med enkla, upprätta kransgrenar. 6, 7. Stränder, kärr.
617. *Fräken*. 4, med 3—6 fot höga, inuti enpipliga stjelkar. Axbärande stjelken grenlös eller enkelt grenig, med syllika slidtänder. 6, 7. Sjöar, floder.
618. *Skäfte*. 4, med 1—3 fot höga, inuti enpipiga, öfvervintrande, grenlösa stjelkar. Slidorna med hinnaktiga, snart af-fallande tänder.

Fam. *Callitrichineae*.

*Char.* Ståndaren en med enrummig knapp. Fruktämnet fyra-knöligt, fyrrummigt, med ett frö i hvarje rum slutligen bildande fyra nötlika karpeller.

Örter med motsatta, helbräddade blad. — Tillhöra *Monoecia*, *Monandria*.

619. *Vattengröna*. ☉,  $\frac{1}{2}$ —3 kvarter lång. De öfra bladen aflångt spadlika, bildande en rosett på vattenytan. 5—9. Pölar, diken.

Fam. *Ceratophylleae*.

*Char.* Ståndarne många i hvarje blomma, utan strängar, med tvårummiga knappar. Blomhylla saknas; i dess ställe ett mångbladigt svepe. Fruktämnet enfröigt, med ett stift, slutligen bildande en nöt.

Örter med kranssittande, findelade blad.

622. *Flohår*. 4, med i vattnet nedsänkta, stundom flera alnar långa, upptill tätbladiga stjelkar. Bladen hårfint klyvdelade. Nötterna släta, vid basen med tornar. 7, 8. Dammar och pölar.

Fam. *Characeae*.

*Char.* Hanorganer: färgade klot, honorganer: spiralstrimmiga sporangier, fyllda med groddkorn.

Algartade växter med kranssittande grenar. — Tillhöra *Cryptogamia*, *Filices* (Algæ enl. Agardh).

625. *Kransslinka*. ☉. Stjelken 1—2 kvarter lång, trådsmal, vridet refflad, sträf, med 8—10 kransgrenar. 7, 8. Stil-lastående, sött vatten.

Fam. *Orchideae*.

*Char.* Blomkalken kronlik, irregulär, med en läppformigflik. Ståndarne 1—2, sammanväxta med pistillen till en könpelare. Frukt-ämnet under blomman, enrummigt, freskaligt, med fröfasten på väggarne.



Örter med slidförande blad. — Tillhöra Gynandria, Monandria (utom *Cypripedium*, som tillhör Ordn. Digynia).

631. *Fläderyxne*. 4. Stjelken 1—2 qvarter hög, med anånga, i spetsen klufna stjelknölar. Bladen lancettlika, de nedra bredare och trubbiga. Blommorna i äggrundt ax, hvitgula eller röda, med stora, tunna blomskärmar. 5, 6. Ängsbackar, lundar.
633. *Jungfru Marias hand*. 4. Stjelken alnshög med handlikt klufna stjelknölar. Bladen smalt lancettlika, fläckiga. Blommorna i långskaftadt, äggrundt ax, röda. 6, 7. Fuktig ängs- och skogsmark.
636. *Nattviol*. 4. Stjelken 3—4 qvarter hög, nedtill tvåbladig och med odelade stjelknölar. Bladen ovalt lancettlika. Blommorna i långt, glest ax, hvita, med trådluk sporre. 6, 7. Ängsbackar.
646. *Mossyxne*. 4. Stjelken kvartershög, smal, tvåbladig. Bladen motsatta, hjertlikt deltoidiska. Blommorna i smalt, fåblommigt ax, brungula. 6, 7. Skogar, på mossor.

#### Fam. *Irideae*.

*Char.* Blomkalken kronlik. Ståndarne 3 med utåt uppbristande knappar. Fröhuset trerummigt, mångfröigt med centrala fröfästen.

Örter med rotstockar eller löknölar. — Tillhöra Triandria, Monogynia.

651. *Svärdslilja*. 4. Stjelken 3—5 fot hög med tvåsidigt omslindande, svärdlika blad. Blommorna stora, gula, med olikformiga kalkblad och kronbladlika märken. 6, 7. Stränder.

#### Fam. *Narcissineae*.

*Char.* Blomkalken kronlik med sexdeladt bräm. Ståndarne sex med inåt uppbristande knappar. Frukten som föregående familj.

654. *Hvit Narcissa*. 4. Stängeln 1—2 qvarter hög, eublommig. Bladen jemnbreda. Blommorna hvita med skällik bikrona. 5, 6. Allmänt odlad och stundom förvildad.

*Snödroppe* (*Galanthus nivalis*). 4. Stängeln 4—8 tum hög, enblommig, med två jemnbreda, kölade blad vid basen. Blomman vit, hängande, med hvarannan kalkflik mindre. 3, 4. Allmänt odlad och stundom förvildad.

#### Fam. *Hydrocharideae*.

*Char.* Blommorna skiljtkönnade med tre kronbladlika och tre foderbladlika kalkblad. Frukten flerrummig med fröfästen på väggarna.

Vattenväxter med blommor inom hölster och sexbladig kalk. — *Hydrocharis* tillhör Dioecia, Enneandria.

656. *Dyblad*. 4. Bladen flytande, tumsbreda, runda med hjertlik basis. Blommorna hvita. 7. Stillastående vatten.

Fam. *Liliaceae*.

*Char.* Blomkalken kronlik, liljeartad. Ståndarknapparne öppnande sig inåt. Stiftet ett eller intet. Frukten treskalig, tregömmig, mångfrölig med centrala fröfästen.

Örter med vanligen skiftevisa blad.

Afd. 1. *Tulipeæ*: Kalken sexbladig. Fröen platta med hinnaktigt, blekt skal. — Lökväxter, tillhörande Hexandria, Monogynia.

*Tulpan* (*Tulipa Gesneriana*). 4. Stängeln fotsbög, enblommig. Bladen aflångt lancettlika. Blomman klocklik, sexbladig, med trubbiga, röda, gula eller annorlunda färgade kalkblad, bildande en liljeartad blomkalk. 5. Allmänt odlad.

659. *Dampselstilja*. 4. Stjelken fotsbög, vanl. enblommig. Bladen skiftevisa, jemnbreda, rännformiga. Blommorna dampselrutiga, bruna eller hvita. 5, 6. Fuktiga ångar.

660. *Brandgul Lilja*. 4. Stjelken 2—3 alnar hög, mångblommig, med knopplökar i bladveckan. Bladen spridda, jemnbredt lancettlika. Blommorna brandgula, invändigt sträsprickiga. 6, 7. Allmänt odlad och stundom förvildad.

661. *Rejsarkrona*. 4. Stjelken 2—3 fot hög, mångblommig. Bladen i krans, äggrundt lancettlika. Blommorna med tillbakarullade kalkblad, röda, brunfäckiga. Allmänt odlad, men förvildad i gamla parker.

Afd. 2. *Asphodeleæ*: Kalken sexbladig. Frukten: Fröhus med frön omgifna af ett tjockt, mörkt skal.

665. *Ängslök*. 4. Stjelken alnsbög. Bladen halftrinda. Blomflocken med aflånga knopplökar. Blommorna röda eller brungula. 7, 8. Ängsbackar.

666. *Gräslök*. 4. Stjelken 1—2 kvarter hög. Bladen trinda, ihåliga. Blomflockarne klotrunda, utan knopplökar. Blommorna röda. 6, 7. Hafsclippor.

*Rödlök* (*Allium Cepa*). Stjelken 1—2 fot hög, nedtill bladig och uppblåst. Bladen trinda, ihåliga och uppblåsta. Blomflocken klotrund. Blommorna hvitaktiga. 6, 7. Odlas allmänt.

670. *Vårfrudagslök*. 4. Stängeln kvartersbög, med glesblommig flock i toppen. Örtbladet ensamt, lancettlikt jemnbredt, utgående från löken. Blommorna gula, med trubbiga kalkblad. 4, 5. Ängsmark.

671. *Kräklök*. 4. Stängeln kvartersbög med gles flock i toppen. Bladet från löken ensamt, jemnbredt. Blomkalken gul, med sex smalspetsade kalkblad. 4, 5. Backar.

Afd. 3. *Asparageæ*: Blomkalken sambladig. Frukten bär. — Fleråriga örter med rotstock. — *Asparagus* och *Convallaria* tillhöra Hexandria, Monogynia, *Majanthemum* tillhör Tetrandria, Monogynia och *Paris* Octandria, Tetragynia.

*Sparris* (*Asparagus officinalis*). 4. Stjelken 3—6 fot hög med spåda grenar. Bladen knippevisa, trådsmala. Blommorna i

- bladveckan, grön gula. 7, 8. Allmänt odlad; vild förekommer den på grusiga hafsstränder, ehuru sällsynt.
673. *Liljekonvalje*. 4., quartershög. Bladen från rotstocken, ovals lancettlika. Blommorna i ensidig klase på stängel, klocklika, hvita. 5, 6. Skogs- och ängsbackar.
674. *Getrams*. 4. Stjelken fotshög, mångbladig, kantig. Bladen skiftevisa, äggrundt lancettlika. Blommorna smalt klocklika, hvitgröna. 5, 6. Berg, backar.
676. *Ekorrbär*. 4. Stjelken quartershög, tvåbladig. Bladen hjertlika. Blommorna i klase, hvita. 6, 7. Lundar, fuktig skogsmark.
677. *Ormbärsört*. 4. Stjelken 1—2 fot hög, enblommig, fyrbladig. Bladen ovals lancettlika, kranssittande. Blomman grön. 5, 6. Lundar.

### Fam. *Alismaceae*.

*Char.* Blomkalken sexbladig, de tre yttre foderbladlika. Frukten: flera mer eller mindre fria karpeller, hvarje med sitt stift eller märke.

Vattenväxter med rotstock. — *Batomus* tillhör *Enneandria*, *Hexagynia*, *Alisma* tillhör *Hexandria*, *Polyandria*, *Triglochin* *Hexandria*, *Hexagynia* och *Sagittaria* *Monocelia*, *Polyandria*.

679. *Blomvass*. 4., med 3—4 fot hög stängel och stor blomflock i toppen. Bladen jembreda. Blommorna rödletta. 7. Sjöar, floder.
680. *Svalting*. 4., med 1—3 fot hög stängel och yfvig, kransgrenig vippa i toppen. Bladen skaftade, äggrunda. Blommorna hvita. 7. Stränder.
681. *Pilört*. 4., med 1—4 fot lång stängel och gles, kransgrenig vippa i toppen. Bladen pillika, långskaftade. Blommorna hvita. 7, 8. Sjöar, floder.
683. *Hufssälling*. 4., 1—2 fot hög. Bladen groft trådlika. Blommorna i jembredt ax, gröna, med sex märken. 6, 7. Hafsstränder.
684. *Kärrsälling*. 4., 1—3 kvarter hög. Bladen trådlika. Blommorna i jembredt ax, gröna, med tre märken. 6, 7. Kärrängar.

### Fam. *Juncaceae*.

*Char.* Blomkalken sexbladig, foderlik. Stiffet ett med tre märken. Fröhuset trerummigt, mångfröigt eller enrummigt och trefröigt.

Gräslika örter med knutiga stjekar och slidomsfattande blad. — Tillhöra *Hexandria*, *Monogynia*.

685. *Knapptåg*. 4. Sträet 2—3 fot högt, bladlöst, med hufvudlik blomvippa nära toppen. Blommorna grönbruna. 7. Diken, stränder.
686. *Veketåg*. 4. Sträet 2—3 fot högt, bladlöst, med utbredd vippa nära toppen. Blommorna gröna. 7. Diken, stränder.

687. *Trådtåg*. 4. Strået svagt, fotsbög, bladlöst, med gles vippa nära midten. Blommorna gröna. 6, 7. Stränder.
688. *Skogståg*. 4. Strået upprätt, 2—4 fot högt, bladigt, med 2—3 gånger sammansatt vippa i toppen. Bladen trinda, tydligt ledade. Blomkalken grönbrun, med alla kalkbladen uddspetsiga. 6, 7. Stränder.
689. *Skogståg*. Strået uppsligande, fotsbög, bladigt, med något sammansatt vippa i toppen. Bladen hoptryckta, tydligt ledade. Blomkalken grönbrun, med de inre kalkbladen trubbad. 6, 7. Fuktiga ställen.
690. *Skogståg*. 4. Strået upprätt, fotsbög, bladigt, med föga sammansatt vippa i toppen. Bladen otydligt ledade. Blomkalken grönbrun, med alla kalkbladen trubbiga. 6, 7. Fuktiga ställen.
692. *Stubbtåg*. 4. Strået upprätt, fotsbög, bladigt, med tät vippa i toppen. Bladen oledade, rännformiga. Blomkalken brun, med rundadt trubbiga kalkblad, kortare är det klotrunda fröhuset. 7. Fuktig gräsmark.
693. *Grodttåg*. 4. Strået grenigt, bladigt, 1—8 tum högt. Bladen rännformiga. Fröhuset aflångt, trubbigt, kortare än de spetsade, brungröna kalkbladen. 7. Fuktiga ställen.
694. *Illåg*. 4. Strået 1—2 kvarter högt, upprätt, bladigt, med glesblommig vippa i toppen. Bladen lancettlika, håriga. Blommorna brunröda. 4, 5. Lundar, skogar.
695. *Knippetåg*. 4. Strået 1—2 kvarter högt, upprätt, bladigt, med flera äggrunda ax i toppen. Bladen lancettlika, håriga. Blommorna grönbruna. 4—6. Betesmarker, skogar.

#### Fam. *Aroidene*.

*Char.* Blommorna gytttrade utan skaft på ett köttigt fäste, bildande en blomkolf. Frukten affallande oöppnad.

Örter med rotstock, tillhörande Hexandria, Monogynia.

696. *Missne*. 4, 1—2 kvarter hög. Bladen hjertlika, skaftade. Blomkolfven aflång, med äggrundt, hvitt hölster. Blommorna utan bylle. 6. Stränder, i vattnet.
697. *Kalmus*. 4, 3—5 fot hög. Bladen svärdlika. Blomkolfven cylindrisk, fingerlång, gröngul, utan hölster. Blomhylllet sexbladigt, foderlikt. 7, 8. Sjöstränder.

#### Fam. *Lemnaceae*.

*Char.* Blommorna insänkta inom den bladlika, flytande stammen, med enbladigt hylle. Frukten: fröblåsa.

Små vattenväxter, utan skiljda blad, med en eller flera enkla rottrådar, som icke nå botten, utan nedhånga i vattnet. — Tillhöra Diandria, Monogynia.

698. *Andmat*. ☉. Stambladen rundade, plattade, hvarje med flera rottrådar. 7, Djupa sjöar.

699. *Andmat.* ☉. Stambladen rundade, under uppsvällda, med en rottråd under hvarje. 6—8. Mädre vattensamlingar.  
 700. *Andmat.* ☉. Stambladen rundade, platta, med en rottråd under hvarje. 6—8. Pölar, diken.  
 701. *Andmat.* ☉. Stambladen lancettlika, skaftade. 6, 7. Sjöar.

Fam. **Potamogetoneae.**

*Char.* Blommorna vanligen i en axlik blomkolf. Ståndarne 1—4. Frukttännen 3—6, hvarje med sitt märke, slutligen nötlika karpeller.

Vattenväxter med knutiga stjelkar och slidlikt omfattande blad. — Potamogeton tillhör Triandria, Tetragynia.

702. *Güddnate.* ♀. Stjelken flera alnar lång, grenig. Bladen flytande, läderaktiga, ovala. Axen tätblommiga. Blommorna grönaktiga. 7. Sjöar.  
 710. *Älzate.* ♀. Stjelken flera alnar lång, grenig. Bladen likformiga, hjertlikt äggrunda-lancettlika, helbräddade, tunna. Axen tätblommiga, grönaktiga. 7. Sjöar, floder.  
 719. *Härnate.* ♀. Stjelken lång, trådsmal, grenig. Bladen jemnbreda, enrummiga. Axen med glest sittande blomkransar, grönaktiga. 7. Sjöar.

Fam. **Typhaceae.**

*Char.* Blommorna i axlik eller klotrund blomkolf, med fjälllika eller borstlika kalkblad. Frukten nötlik, med ett hängande frö.

Örter med rotstock och jemnbreda blad. — Tillhöra Monoecia, Triandria.

725. *Kafveldun.* ♀. Stjelken 3—4 alnar hög. Bladen smalt svärdlika. Axen cylindriska, åtskiljda, med grönbruna blommor. 7. Sjöar, floder.  
 726. *Igelknoppar.* ♀, 2—3 fot hög. Bladen jemnbreda med treeggad basis. Axen klotrunda i grenig vippa. Blommorna grönaktiga. 7. Stränder.  
 727. *Pölvass.* ♀, 1—3 fot hög. Bladen jemnbreda med treeggad basis. Axen klotrunda, hanaxen oskaftade, honaxen skaftade. Blommorna grönaktiga. 7. Kärr, stränder.  
 728. *Pölvass.* (Sparg. minimum). ♀, 1—2 kvarter hög. Bladen jemnbreda, platta. Hanaxet ensamt, oskaftadt, honaxen skaftadt. Blommorna grönaktiga. 7, 8. Kärr, stränder.

Fam. **Cyperaceae.**

*Char.* Blommorna i ax af ensamma, tegellagda skärnfjäll. Pistillen bar eller omgifven af ett inre fjäll, borst eller hår. Frukten: en nöt med upprätt frö.

Gräslika örter (Halfgräs) med oledadt, inuti svampaktigt strå och omslidande, jemnbreda blad med hela slidor.

Afd. 1. *Scirpeæ*: Blommorna tvåkönade. Skärnfjällen på alla sidor tegellagda. — Tillhöra Triandria, Monogynia.

734. *Kålvass*. 4. Strået bladlöst, trindt, 3—5 alnar högt. Blommorna i ax, bildande en vippa i stråets topp. Axen brungröna. 7. Sjöar, floder.
736. *Kärrsuf*. 4. Strået bladlöst, trindt, alnshögt. Axet aflångt, ensamt i toppen, brungrönt. 5, 6. Stränder, kärr.
737. *Nålsuf*. ☉. Strået bladlöst, nållint, kantigt, 1—3 tum högt. Axet äggrundt, ensamt i toppen, brungrönt. 6—8. Stränder.
739. *Smalbladig Ängsull*. 4. Strået 1—2 fot högt, bladigt. Bladen jemnbreda, kölade. Axen flera, på glatta skaft, brungröna. Fruktarna omgifna af långa hår. 5, 6. Kärrängar.
741. *Späd Ängsull*. 4. Strået 1—2 fot högt, bladigt. Bladen trekantiga. Axen flera, på sträfvä skaft, brungröna. Frukten som föreg. 6. Kärrängar.
742. *Slälförande Ängsull*. 4. Strået 1—2 fot högt, bladigt. Bladen rännformiga. Axet ensamt, äggrundt, brungrönt. Frukten som föreg. 4, 5. Skogskärr.
- Afd. 2. *Cariceæ*: Blommorna enkönade. — Tillhöra *Monocela*, *Triandria*. — Alla kallas *Starr*; få hafva egna namn, hvilka då anföras.
744. *Lappskostarr*. 4. Strået 1—3 fot högt, skarpt tresidigt. Bladen kölade. Honaxen aflångt cylindriska, ljusgröna, med glatta fruktgömmen. 6. Stränder, kärr.
745. 4. Strået 1—3 fot högt, trubbkantigt. Bladen rännformiga. Honaxen smalt cylindriska, ljusgröna, med glatta, uppblåsta fruktgömmen. 6. Stränder, kärr.
747. 4. Strået 2—3 fot högt, trindt. Bladen rännformiga. Honaxen lancettlikt cylindriska, brungröna, med småludna fruktgömmen. 6. Kärr, stränder, i vattnet.
748. 4. Strået 1—3 kvarter högt. Bladen platta, kölade, hårliga. Honaxen långt åtskiljda, med hårliga fruktgömmen. 6. Lundar, ängsmark.
750. 4. Strået 1—3 fot högt. Bladen platta, breda, glatta. Honaxen cylindriska, hängande, med utspärrade, glatta fruktgömmen. 6. Kärr, stränder, i vattnet.
752. 4. Strået 1—2 fot högt. Bladen finhårliga. Honaxen aflånga, lutande, med tilltryckta, glatta fruktgömmen. 6. Ängar.
753. 4. Strået 1—3 kvarter högt, tresidigt. Bladen kölade med utvikna kanter. Honaxen närsittande, ovala, gulaktiga, med sprölspetsade fruktgömmen och nedböjda spröt. 6. Kärrängar.
758. 4. Strået 3—12 tum högt, tresidigt. Bladen kölade med invikna kanter. Honaxen närsittande, aflånga, gulaktiga, med raksprötade fruktgömmen. 6. Stränder.
759. 4. Strået 1—2 fot högt, trubbkantigt. Bladen kölade, blågröna. Honaxen åtskiljda, glesblommiga, med uppblåsta fruktgömmen. 6. Fuktiga ängar.
763. 4. Strået kvartershögt. Bladen kölade. Honaxen närsittande, aflånga, med ludna fruktgömmen. Axskärmen syllika, med gröna slidor. 5. Backar.

764. 4. Strået kvartershögt. Bladen kölade. Honaxen närsittande, rundadt aflånga, med ludna fruktgömmen. Axskärmen fjäll-  
lika med svarta slidor. 5. Backar.
765. 4. Strået 1—2 kvarter långt, svagt. Bladen smala, gröna. Honaxen något närsittande, klotrunda, med ludna fruktgömmen. Axskärmen utan slidor. 6. Backar.
766. 4. Strået 1—2 kvarter högt. Honaxet öfvermående hanaxet, glest mångblommiga, mörka. Fruktgömmena omvändt äggrunda, flnhåriga. 5, 6. Lundar.
770. 4. Strået 1—2 alnar högt, skarpt tresidigt. Hanaxen flera. Honaxen cylindriska. 6. I vatten, nära stränderna.
772. 4. Strået 1—3 kvarter högt, stråft. Bladen rännformiga. Hanaxen 1—2. Honaxen något närsittande, cylindriska. 5, 6. Fuktig ängsmark.
774. *Tufstarr*. 4. Strået 1—4 kvarter högt, stråft. Bladen kölade, smala. Hanaxet ensamt. Honaxen aflånga, närsittande. 5, 6. Fuktiga ängar, bildande tufvor.
777. 4. Strået alnshögt, lutande, tresidigt. Bladen platta, smala. Axen tvåkönade med hanblommor vid basen, aflånga, bildande ett sammansatt ax. 7. Vid stränder, i vattnet.
778. 4. Strået 1—2 kvarter högt. Bladen smala. Axen tvåkönade med hanblommor vid basen, klotrunda, taggiga af de utspärrade fruktgömmena. 6. Kärr.
779. 4. Strået 2—3 kvarter högt. Bladen smala. Axen tvåkönade med hanblommor vid basen, aflånga, med tilltryckta fruktgömmen. 5, 6. Kärr, stränder.
782. 4. Strået 1—3 kvarter högt. Bladen platta. Axen tvåkönade med hanblommor vid basen, ovala. Fruktgömmena bredt hinnkantade, tilltryckta. 5, 6. Skogar.
783. 4. Strået 1—2 fot högt, tresidigt. Bladen platta, breda. De öfversta och nedersta axen tvåkönade med hanblommor i toppen, de mellersta hanax. 5, 6. Stränder.
785. 4. Strået 1—3 fot högt, treeggadt, groft. Bladen platta, breda. Alla axen tvåkönade med hanblommor i toppen. 6. Stränder, diken.
786. 4. Strået 1—2 fot högt, tresidigt, stråft, lutande. Bladen platta, smala. Axen som föregående, men med utspärrade fruktgömmen. 5, 6. Gräsmark.
788. 4. Strået 1—3 fot högt, spensligt. Bladen smala. Axen tvåkönade med hanblommor i toppen, bildande ett cylindriskt, sammansatt ax. 5, 6. Stränder, i vattnet.
792. *Nålstarr*. 4. Strået kvartershögt, med ett enda enkönadt ax i toppen. Fruktgömmena med uthöjdt spröt. 5, 6. Kärr.

#### Fam. *Gramineae*.

*Char*. Blommor med ofullständig kalk, i dess ställe försedda med tvåsidigt och skiftevis sittande blomskärmar. Ståndarne vanl. tre. Pistillen med två stift eller märken. Frukten: hinnfrukt.

Gräs, med ledadt och mellan lederna ihåligt strå samt slidomfattande, jemnbreda blad med klufna slidor och bladsnärp. — Tillhöra Triandria, Digynia, utom Nardus, som tillhör Triandria, Monogynia och Anthoxanthum, som tillhör Diandria, Digynia.

793. *Quickhvet*. 4. Strået 1—3 alnar högt med vidt omkring krypande rotstockar (hvitrot). Axet platt, med mångblommiga småax, vändade sidan mot fästet. Borsten kort eller ingen. 6, 7. Odlade ställen.

*Hvete* (*Triticum vulgare*). ☉. Strået 1—2 alnar högt, ända upp till axet ihåligt. Axet med småax som föreg. och tvåra blomfjäll. 6. Odlas allmänt i flera varieteteter.

*Råg* (*Secale cereale*). ☉. Strået 2—4 alnar högt. Axet platt med tvåblommiga småax, vändande sidan emot fästet. Borsten mer eller mindre lång. 6. Odlas allmänt.

*Korn* (*Hordeum vulgare*). ☉. Strået 1—2 alnar högt. Axet med enblommiga småax, tre tillsammans i hvarje axled, hvarigenom uppkomma fyra utstående och två tilltryckta rader. Borsten mycket lång, upprät. 6. Odlas allmänt. Äfven andra arter af *Hordeum* odlas stundom.

798. *Renrepe*. 4. Strået 1—2 fot högt. Axet platt med mångblommiga, borstlösta småax, vändande kanten mot fästet. 6, 7. Backar, vägkanter. Kallas äfven Engelskt Raygräs.

802. *Hundexing*. 4. Strået 1—2 alnar högt. Vippan ensidig, delad uti skaftade gyttringar af flerblommiga småax med yttre blomfjället kort borstspetsadt. 6, 7. Odlade ställen.

804. *Strandsvingel*. 4. Strået 3—6 fot högt. Bladen platta. Vippan utbredd, lutande, med bredt lancettlika, borstlösa småax. 7. Hafsstränder.

805. *Ängssvingel*. 4. Strået 1—2 alnar högt. Bladen platta. Vippan utbredd, med jemnbreda, borstlösa småax. 6. Ängar.

806. *Rödsvingel*. 4. Strået 1—2 fot högt med platta blad. Rotbladen borslika. Vippan något ensidig med lancettlika småax. 6. Skogsängar.

808. *Fårsvingel*. 4. Strået 1—2 kvarter högt. Alla bladen borstlika. Vippan smal, ensidig, med aflånga småax. 6. Backar.

811. *Taklost*. ☉. Strået 1—3 kvarter högt. Bladen platta, mjukhåriga. Vippan lutande, med lancettlika, borstbärande småax. 6, 7. Torftak, backar.

812. ☉. Strået 1—2 alnar högt. Bladen glatta. Vippan något lutande, med äggrundt aflånga, glatta, vanl. borstlösta småax. 6, 7. Åkrar.

813. *Renlost*. ☉. Strået 1—2 alnar högt. Bladslidorna småludna. Vippan lutande, med smalt lancettlika, långborstiga småax. 6. Åkrar.

814. *Luddlost*. ☉. Strået 1—3 fot högt. Blad och slidor mjukludna. Vippan upprät, äggrund, med äggrundt aflånga, borstbärande, vanl. ludna småax. 6, 7. Backar.



815. *Darrgräs*. 4. Strået omkring fotshögt. Vippans grenar utspärrade, med hängande, nästan hjertlika småax. 6, 7. Ängsbackar.
816. *Ängsgröe*. 4. Strået 1—3 fot högt, trindt. Bladen platta, med kort snärp. Vippan utbredd, äggrund, borstlös, med glatta grenar. 6, 7. Ängar.
817. *Bergsgröe*. 4. 1—2 fot högt, hoptryckt. Vippan liten, ensidig, borstlös. 6. Berg, murar.
818. *Betesgröe*. 4. Strået 1—3 fot högt, trindt. Bladen platta, med långt snärp. Vippan utbredd, med sträfva grenar och treblommiga, borstlösa småax. 6, 7. Fuktiga ängar.
819. *Strandgröe*. 4. Strået 1—3 fot högt, trindt. Bladen smala, med långt snärp. Vippan utbredd, med sträfva grenar och 4—6-blommiga, borstlösa, tvåfärgade småax. 7, 8. Stränder, fuktiga ängar.
820. *Lundgröe*. 4. Strået 1—3 fot högt, spensligt, med nakna, svarta leder. Bladen smala med omärkligt snärp. Vippan utbredd, gles. 6, 7. Lundar.
822. *Hvitgröe*. ☉. Strået quartershögt, något plattadt, mjukt. Vippan äggrund, något ensidig, utan borst. 4—9. Odlade ställen.
823. *Mannagräs*. 4. Strået alnslångt kulliggande. Bladen platta, flytande, med utdraget snärp. Vippan ensidig, gles, med jemnbreda småax. 7. Vatten. Fruktarna gifva Mannagryn.
829. *Tandsvingel*. 4. Strået 1—2 kvarter långt, mer eller mindre nedliggande. Vippan enkel, klaselik, af 4—8 fåblommiga, äggrunda småax. 6, 7. Skogar, betesmarker.
- Hafre* (*Avena sativa*). ☉. Strået 3—5 fot högt. Vippan utbredd, med tvåblommiga småax. Blommorna glatta, den nedra borstbärande. 7, 8. Odlas allmänt.
831. *Landhafre*. ☉. Strået 2—3 fot högt. Vippan utbredd, med slaka grenar, 2—3-blommiga små-ax samt alla blommorna håriga och borstbärande. 6, 7. Åkrar. Liknar Hafre.
832. *Rnylhafre*. 4. Strået 1—2 alnar högt. Vippan grenig, med polygama, tvåblommiga, enborstiga småax. 6, 7. Ängar. Kallas äfven Fransyskt Raygräs.
833. *Luddhafre*. 4. Strået 1—3 fot högt. Bladslidorna mjukludna. Vippan smal, med 2—3-blommiga småax och alla blommorna borstbärande. 6, 7. Ängsbackar.
834. *Ängshafre*. 4. Strået 1—3 fot högt. Bladslidorna glatta eller sträfva. Vippan nästan axlik, med 4—5-blommiga småax och alla blommorna borstbärande. 6, 7. Ängsbackar.
836. *Tuftåtel*. 4. Strået 1—2 alnar högt. Bladen platta. Vippan utbredd, stor, med tvåblommiga småax och borst af blomfjällets längd. 6, 7. Fuktiga ängar.
837. *Kruståtel*. 4. Strået 1—2 fot högt. Bladen trådlika. Vip-

- pan utbredd, med flerböjda grenar och långt utskjutande borst. 6, 7. Backar.
840. *Slokgräs*. 4. Strået 1—2 fot högt. Småaxen i ensidig, lutande klase, brunviolett. 5, 6. Backar, berg.
842. *Bladvass*. 4. Strået 3—5 alnar högt. Bladen nästan lancettlika. Vippan yfvig, stor. 7, 8. Sjöar, floder.
843. *Pipphen*. 4. Strået 3—4 fot högt. Vippan upprät, öppen, med långa borst. 6. Steniga backar.
844. *Berghven*. 4. Strået 2—3 alnar högt, sträfft. Vippan upprät, med inneslutna borst. Skärmsjällen sylspetsade. 7. Skogsbackar, berg.
846. *Kärr-rör*. 4. Strået 1—2 fot högt, vanligen glatt. Vippan upprät, smal, med korta borst. 6, 7. Fuktiga ängar, kärr.
847. *Grenrör*. 4. Strået 3—4 fot högt, spensligt. Vippan utbredd, lutande, med korta borst. 7. Stränder.
848. *Åkerhven*. ④. Strået 2—5 fot högt. Vippan yfvig, lutande, med ytterst långa borst. 7. Åkrar.
849. *Krypphen*. 4. Strået uppstigande, 1—5 fot högt, spensligt. Bladen platta, med utdraget snärp. Vippan pyramidformig med sträffa grenar. 6, 7. Stränder, fuktiga ängar.
850. *Rörhven*. 4. Strået uppstigande, 1—2 fot högt, spensligt. Snärpet kort. Vippan äggrund med nästan glatta grenar. 6, 7. Ängar.
851. *Brunhven*. 4. Strået 1—3 kvarter högt. Rotbladen trådsmla, hopvikna. Vippan med sträffa grenar. Inre blom-sjället felas. 6, 7. Fuktiga ängar.
855. *Ängskafle*. 4. Strået 2—3 fot högt, upprätt. Vippan axlik med hårflna borst. 6, 7. Ängar.
856. *Kärrkafle*. 4. Strået 1—3 kvarter högt, knäböjdt. Vippan axlik, liten. 6, 7. Fuktiga ställen.
858. *Timothey*. 4. Strået 1—4 fot högt, upprätt. Vippan axlik, taggig af de gaffellika blomfodren (skärmsjällen). 6, 7. Ängar.
860. *Rörflen*. 4. Strået 2—3 alnar högt, bredbladigt. Vippan yfvig, rödlett, med enblommiga, bortslösa småax. 7, 8. Stränder.
862. *Vårbrodd*. 4. Strået 1—2 kvarter högt. Vippan lancettlik, axlik, borsibärande, med treblommiga småax, hvaraf endast mellersta blomman är försedd med befruktningsorganer. 5, 6. Ängar. (Diandria, Digynia).

### Fam. *Polypodiaceae*.

*Char*. Fröedningen på baksidan af stambladet, som före utvecklingen är snäckformigt inrulladt. Fröhusen (sporangier) omgifna af en elastisk ring.

Fleråriga örter med rotstock och stjelkarne eller grenarne sammanväxta med de bladartade delarne till ett bladlikt stamblad. — Tillhöra *Cryptogamia*, *Filices*.

864. *Stensöta*. 4. Rotstocken krypande, grenig. Stambladet quartershögt, pardeladt, lancettlikt jemnbredt, med frukterna förenade till runda, bara fruktplättar. 6, 7. Berg.
865. *Skogsbräken*. 4. Stambladet fotshögt, parbladigt deladt, med nedersta fikparet nedböjdt. 8, 9. Skogar.
866. *Skogsbräken*. 4. Stambladet 1—2 kvarter bögt, dubbelt parbladigt deladt med treangelformig omkrets. 7, 8. Skogar.
868. *Träjonbräken*. 4. Stambladet 1—3 fot högt, lancettlikt, parbladigt deladt, med trubbsågade flikar. 7, 8. Skogar.
870. *Skogsbräken*. 4. Stambladet 1—2 fot högt, dubbelt parbladigt deladt, med hvass-sågade flikar. 7, 8. Skogsmark.
871. *Stenbräken*. 4. Stambladet 1—2 kvarter högt, lancettlikt, parbladigt deladt, spensligt, sprödt. 7, 8. Bergsspringor.
872. *Klippbräken*. 4. Stambladet quartershögt, lancettlikt jemnbredt, parbladigt deladt, under brunludet. 7. Bergsspringor.
873. *Skogslånke*. 4. Stambladet 2—3 fot högt, lancettlikt, dubbelt parbladigt deladt. Fruktplättarne aflånga, krökta. 7, 8. Skogsmark.
874. *Berglånke*. 4. Stambladet quartershögt, jemnbredt, parbladigt deladt, med rundade flikar. 7. Bergsspringor.
877. *Berglånke*. 4. Stambladet 4—8 tum högt, i toppen 2—3-flikadt, med jemnbreda flikar. 6, 7. Bergsspringor.
878. *Ormbunke*. 4. Stambladet 2—3 fot högt, triangelformigt, tredubbelt parbladigt deladt, med fruktplättarne längs kanten. 8, 9. Skogsmark, hedar.

#### Fam. *Lycopodiaceae*.

*Char.* Blommor otydliga. Fröhus (Sporangier) i bladens eller axfjällens vinkel, enrummiga, 2—3-väggiga, uppbristande med tväremna. Groddkornen 4 och 4 sammanhängande.

Fleråriga, kryptogama, ständigt grönskande växter, med krypande stielk, täckt af enkla, platta blad. — Tillhöra Cryptogamia, Filices (Musci enl. Linné).

884. *Refgräs*. 4. Stielken alnslång eller mera, med uppräta, quartershöga grenar och ensamma oskaftade ax. Bladen lancettlika med udd. 6—8. Skogar.
885. *Matlumner*. 4. Stielken 2—3 alnar lång, med uppstigande grenar och parvisa, skaftade ax. Bladen lancettlikt jemnbreda, hårspetsade. 7, 8. Skogar.

## Skol-Botanikens Musci och Homonemeae.

### Fam. *Bryaceae*.

*Char.* Blommorna små, utan blomkalk, skyddade af skärmblad. Fröhuset före mognaden täckt af en mössa, moget vanligen öppnande sig medelst ett affallande lock, hvarunder oftast en enkel eller dubbel tandrad döljes.

Ständigt grönskande örter med oskaftade, enkla och af endast celler bestående blad. Blommorna oskaftade, i bladvecken eller toppen, dels enkönade, dels tvåkönade. Ståndarne utan sträng, eurummig. — Tillhöra Cryptogamia, Musci.

*Toppalstrande Väggmossa.* (*Hypnum proliferum*). 4. Stjelken uppstigande, 1—2 kvarter lång, dubbelt pargrenig, med frukt på sidan. Bladen äggrunda. Fruktskafften flera tillsammans, hvarje med ett äggformigt fröhus, försedd med lock och derunder dold dubbel tandrad. 6—8. Skogar.

*Björnmossa* (*Polytrichum commune*). 4. Stjelken upprät, 1—3 kvarter hög, enkel, tvåbyggare med frukt i toppen. Bladen jemnbredt lancettlika, sågade, med slidlik basis. Fruktskafftet ensamt, ofta kvarterslångt. Fröhuset kubiskt-äggformigt, med enkel tandrad, lågt lock och långhårig mössa. 6, 8. Skogar.

*Takmossa* (*Tortula ruralis*). 4. Stjelken upprät, 1—3 tum hög, grenig, med frukt i toppen. Bladen aflånga, hårspetsade. Fruktskafftet ensamt, tumslångt. Fröhuset aflångt, cylindriskt, med enkel tandrad och mössa. 6—8. Tak, klippor, backar.

### Fam. *Sphagnaceae*.

*Char.* Blommorna små, utan blomkalk, skyddade af skärmblad. Fröhuset kortskaftadt, utan egentlig mössa, moget öppnande sig medelst ett platt lock, men saknande tandrad.

Fleråriga örter med oskaftade, bleka, nervlösa, konkava, fleråriga blad, byggda af nätådriga celler. — Tillhöra Cryptogamia, Musci.

*Hvitmossa* (*Sphagnum acutifolium*). 4. Stjelken 1—3 kvarter hög, grenig, med spetsade grenar och frukter i toppen. Stjelkbladen ovala, grenbladen aflångt lancettlika. 7—9. Kärr, bergväggar.

*Hvitmossa* (*Sphagnum cymbifolium*). 4. Stjelken 1—2 kvarter hög, grenig, med trubbiga grenar. Stjelkbladen bredt ovala, trubbiga, grenbladen ovala. 7—9. Kärr.

Fam. *Lichenes*.

*Char.* Rot, stam och blad förenade till en bål, bestående af trenne skiljda cell-lager, hvaraf det mellersta är grönt. Sporidierna inneslutna i groddsäckar (asci) inom lafhus.

Fleråriga kryptogamer, hvilkas lif förmodas hvilat då luften är torr. De fortplantas både genom frön (sporidier) och knoppar (gonidier), och förekomma på berg, träd och på marken, men icke i vatten. — Tillhöra Cryptogamia, Algæ.

*Asklaf* (*Ramalina calicaris*). 4. Lafbålen 1—6 tum lång, grönaktigt gråhvit, bladlik, delad i många jemubreda flikar, bärande vanligen på sidorna, stundom i toppen, sittande cirkelrunda, kortskäftade lafhus, af samma färg som lafbålen. Växer på stammar och grenar, vanl. af lösträd, och bär frukt hela året om.

*Islandslaf* (*Cetraria islandica*). 4. Lafbålen 3—6 tum hög, gråbrun, undertill blekare, upprät, buskliskt grenig, med grenarne oordentligt rännformiga, flikiga och i kanten borsttandade. Lafhusen sköldlika, bruna, snedt fastväxta vid öfra sidan af grenflikarnes spetsar. Växer på marken i skogar, på hedar och berg, och har frukt under hela året.

*Torsklaf* (*Peltigera aphthosa*). 4. Lafbålen bladlik, utbredd, bestående af flera breda, från en medelpunkt utåt tillväxande, ofvan gröna, vartfulla, undertill tätludna flikar. Lafhusen sköldlika, cirkelrunda, rödbruna, fästa på öfra sidan af bålens flikar. Växer i skogar och har frukt under våren och sommaren.

*Vägglaf* (*Parmelia parietina*). 4. Lafbålen bladlik, rundad, horisontal, tillväxande utåt, ofvan gul, under hvitgul, i kanten flikig, med omvänt åggrunda, trubbnaggade flikar. Lafhusen plattadt skålllika, gula, med uppböjd kant af lafbålens färg och samlade mot lafbålens midt. — Växer på trädstammar, träväggar och stenar. Frukten träffas under hela året.

*Renlaf* (*Cladonia rangiferina*). 4. Lafbålen upprät, buskliskt grenig, med ihålliga, hvitgröna, 3—6 tum höga grenar och fingerlikt delade smågrenar. Lafhusen dynlika, bruna, sittande på de öfra smågrenarnes toppar, och förekommande hela året om. Växer på berg och klippor.

*Tuschlaf* (*Umbilicaria pustulata*). 4. Lafbålen bladlik, brungrön, horisontalt utbredd, af flera tums storlek, tunn, ojemn, fäst vid klippan med en låg fot, utgående från bålens midt. Lafhusen knapplika, med svart disk, fästa på bålens öfra sida, förekommande under hela året. Växer på stenar och klippväggar.

Fam. *Fucaceae*.

*Char.* Hafsalger med sporidier, icke inneslutna inom groddsäckar. — Tillhöra Cryptogamia, Algæ.

**Blåstång** (*Fucus vesiculosus*). Bladstammen upprät, 1—4 fot hög, upprepadt tvågrenig, gulgrön, med blåsbärande grenar. Fruktsamlingarne i bladstamblikarnes toppar, elliptiska. Frukten mognar under Juli och Augusti. — Växer på bafsbotten, på stenar och klippor.

### Fam. *Diatomaceae*.

**Char.** Vattenalger begränsade af räta linier, fortplantande sig genom delning. Mikroskopiska växter, tillhörande Cryptogamia, Algæ. — Arterna torde kunna förbigås.

### Fam. *Hymenomyces*.

**Char.** Svampar, med fruktlagret utbreddt till en egen hinna (hymenium), som bekläder hela svampens yta eller, om hatt finnes, deennes undre sida. Sporidierna i groddsäckar och vid mognaden affallande. — Tillhöra Cryptogamia, Fungi.

**Champignon** (*Agaricus campestris*). Hatten kullrig, plattadt half-rund, med cirkelrund kant, ofvan smutsigt hvit, inuti köttig och undertill försedd med radierande, olikstora, rödaktiga lameller. Foten cylindrisk 4—8 tum hög, hvit. 8, 9. Fält, skogar, trädgårdsland, som icke blifvit omgrädda på våren.

**Flugsvamp** (*Agaricus muscarius*). Hatten kullrig, halft klotrund, klabbig, rödaktig, hvitfläckig af vårtlika lemmingar efter slöjan, undertill försedd med radierande lameller. Foten cylindrisk, 4—12 tum hög, hvit, med ring ofvan midten. 7—9. Fält, skogar.

**Chanterell** (*Cantharellus cibarius*). Hatten ofvanpå konkav, i kanten bugtig, invändigt hvit och köttig, undertill försedd med greniga, trubbiga lameller, nedlöpande på den 4—6 tum höga foten. 7—9. Skogar, skogsängar.

**Ätlig Pipsvamp** (*Boletus edulis*). Hatten kullrig, dynlik, mörkbrun, undertill försedd med ett af otaliga rör bildadt fruktlager, som är skildt från foten, hvilken är upprät, 4—6 tum hög. 8, 9. Skogar.

**Tunderticka** (*Polyporus ignarius*). 4. Svampen utan fot och med den hästhoflika och sleråriga hattens ena sida fastväxt vid den trädstam, hvarpå svampen förekommer. Fruktlagret utgöres af en stor mängd sammanväxta rör, som på inre sidan utveckla sporidier. — Växer på löfträdssammar.

**Klubbsvamp** (*Clavaria*). Deraf förekomma flera arter, t. ex. *Clavaria pistillaris*, med klubborna (den sammanflytne hatten och foten) 3—6 tum höga, smalt omvänt-äggrunda, gulbruna, sinsemellan åtskilda — förekommande under hösten i löfskogar;

*Clavaria ligula*, med klubborna, 2—3 tum höga, smalt omvänt äggrunda, blekgula, flera växande tätt tillsammans, och under hösten förekommande i granskogar;

*Clavaria inæqualis*, med klubborna omkring 2 tum höga,

cylindriska, gula, uppåt något tillspetsade, flera växande tätt tillsammans och under hösten förekommande på ängsmark.

Fam. *Discomycetes*.

*Char.* Svampar, med fruktlagret utbredd till en uppåtvänd skifva eller disk, från hvilken groddsäckarne elastiskt utkasta groddkornen. — Tillhörande Cryptogamia, Fungi.

*Murkla* (*Morchella conica*). Hatten omkring 2 tum hög, kägellik, invändigt ihållig, utvändigt grågul, med nätligt fördelade, bruna åsar. Foten tumshög, cylindrisk, ihållig. Träffas på skogsängar och i skogar under våren.

Fam. *Gasteromycetes*.

*Char.* Svampar, med groddkornen liggande, utan att bilda något tydligen skiljdt fruktlager, i svampens midt eller inblandade i dess massa. — Tillhöra Cryptogamia, Fungi.

*Röksvamp* (*Lycoperdon Bovista*). Frukten ung päronformig, derefter klotrund, efter uppbristandet formad och stor som en stor thekopp, med oregelbundet sönderbrustna kanter. — Träffas under sommaren och hösten på fält och bara fläckar i skogarne.

Tillägg och Rättelser:

pag.	1 r. 16	<i>står:</i> tillhöra	<i>läs:</i> tillhöra	Ordn. Monoclinia äfvensom Ordn.
"	3 " 20	" Gårdar.	" Gårdar,	
"	4 " 39	" Buskar	" Buskar (sällan örter)	
"	7 sista raden	" vass	" vass.	
"	9 r. 18	" affallande	" affallande,	
"	— " 38	" Örter,	" Örter eller buskar	
"	11 " 18 tillägges:	— Tillhöra	Didynamia, Angiospermia.	
"	20 " 9	<i>står:</i> Jo hannisört,	<i>läs:</i> Johannisört.	
"	24 " 15	efter «röda» tillägges:	7, 8.	
"	25 " 40	<i>står:</i> men,	<i>läs:</i> med	
"	27 " 32	" Baden	" Bladen	
"	28 " 14	" Sparffins,	" Sparffins	
"	39 " 8	" Stängeln	" Stjälken	
"	41 sista raden	" Djupa	" Dyga	
"	42 r. 33	" oskaffade	" oskaffade	
"	43 tillägges: 757.	q. Strået 1—3	kvarter högt, tresidigt. Bladen kölade,	
			med utvikna kanter. Honaxen närsittande, ovala, gulaktiga, med sprötspetsade fruktgömmen och nedböjda spröt.	
"	45 r. 7	<i>står:</i> vändade	<i>läs:</i> vändande	6. Kärrängar.
"	— " 39	" 812,	" 812.	Råglosta.

# Register öfver Svenska namn och Naturliga Familjer.

<i>Acerineae</i>	pag. 14.	Bolmört	10.	Ekorrbär	40.
<i>Adoxeae</i>	14.	Bondbönor	28.	<i>Empetreae</i>	30.
Afvenbok	34.	<i>Boragineae</i>	6.	En	36.
<i>Alismaceae</i>	40.	Boört	2.	Babblommig Vintergrön	39.
Alm	32.	Brakved	13.	Ensidig Vintergrön	30.
Alsikeväpling	28.	Brandgul lilja	39.	<i>Equisetaceae</i>	36.
<i>Alecinaceae</i>	21.	Brudbröd	26.	<i>Ericineae</i>	29.
Andmat	41, 42.	Brunhven	47.	Etternässla	32.
<i>Araliaceae</i>	13.	Brunskära	1.	<i>Euphorbiaceae</i>	30.
<i>Aroideae</i>	41.	<i>Bryaceae</i>	49.	Exing, Hund-	45.
Ask	9.	Bräken	48.	Fackelblomster	24.
Askaf	50.	Bränn-nässla	32.	Femfingerört	26.
Asp	34.	Baskvicker	27.	Fotknopp	23.
Ax-Veronica	10.	Bäckböna	11.	Fot-tistel	3.
Bäckguld	26.	Böna	11, 28.	Fotört	12.
Bäckhumla	2.	<i>Callitrichineae</i>	37.	Fibler	4.
Bäckmjölke	24.	<i>Campanulaceae</i>	6.	Fingerört	26.
Bäcknäs	19.	<i>Caprifoliaceae</i>	5.	Finsk Ingefära	13.
Bäcktimjan	8.	<i>Ceratophylleae</i>	37.	Fjällarve	22.
Balsampoppel	34.	Champignon	51.	Fjällrotsört	11.
<i>Berberideae</i>	16.	Chanterell	51.	Flen	47.
Berberis	16.	<i>Characeae</i>	37.	Flenört	10.
Bergbven	47.	<i>Chenopodiaceae</i>	32.	Flohår	37.
Bergknopp	23.	<i>Cistineae</i>	20.	Flugblomster	10.
Berglänke	48.	<i>Coniferae</i>	36.	Flugsvamp	51.
Bergmynta	8.	<i>Coniortae</i>	9.	Fläder	5.
Bergsgrö	46.	<i>Convolvulaceae</i>	6.	Fläderyxne	38.
Bergsyra	32.	<i>Crassulaceae</i>	23.	Fogelbärsträd	27.
Betosgrö	46.	<i>Cruciferae</i>	17.	Fogelört	18.
<i>Betulineae</i>	35.	<i>Cucurbitaceae</i>	22.	<i>Frangulaceae</i>	12.
Binda	31.	<i>Cupuliferae</i>	33.	Fräken	36, 37.
Binka	2.	<i>Cyperaceae</i>	42.	<i>Fucaceae</i>	50.
Björnfloka	13.	Daggkäpa	25.	<i>Fumariaceae</i>	16.
Björnmossa	49.	Daggört	21.	Färsvingel	45.
Bladvass	47.	Dampelslilja	39.	Fält-Veronica	11.
Blindnässla	8.	Darrgräs	46.	Färgkulla	2.
Blodrotsört	26.	Desmansknopp	14.	Förgät-mig-öj	7.
Blomris	29.	<i>Diatomaceae</i>	51.	<i>Gastromycetes</i>	52.
Blomvass	40.	Dill	13.	Gatukrasse	18.
Blåbär	29.	<i>Dipsaceae</i>	4.	<i>Gentianeae</i>	9.
Blåklint	3.	<i>Discomycetes</i>	52.	Getnos	8.
Blåklöcka	6.	Dosta	8.	Getrams	40.
Blåmålla	33.	<i>Droseraceae</i>	20.	Gigalsärter	27.
Blåsippa	16.	<i>Drupaceae</i>	26.	Glis	17.
Blåstäng	51.	Dufkulla	12.	<i>Gramineae</i>	44.
Blåört	12.	Dufins	28.	Gran	36.
Bookrotsört	14.	Dyblad	38.	Grenrör	47.
Bohvete	31.	Dy-Veronica	11.	Groblad	12.
Bok	33.	Ek	33.	Grodhår	15.



Grodftåg	41.	Hästhof	2.	Kyrsvel	13.
<i>Gruinales</i>	19.	Hästkastanje	14.	Kål	17.
Gräbo	2.	Hästmynta	7.	Kålvass	43.
Grävide	35.	Hästsvans	24.	Käringruka	8.
Gråfarter	27.	Hästsyra	31.	Käringtänder	28.
Gräslök	39.	Häskblomster	3.	Kärrfräken	37.
Gröe	46.	Hönstarmar	22.	Kärrkuffe	47.
Grön Knafvel	30.	Idogran	36.	Kärrmjöskä	24.
Grön Pil	34.	Igelknoppar	42.	Kärrmåra	5.
Gul Blindnäsala	8.	Illtåg	41.	Kärr-rör	47.
Gul Jungfru Marie Säng-		Ingefära, Finsk	13.	Kärr-stjernnört	22.
halm	5.	Johannisört	20.	Kärrsif	43.
Gul Luzern	28.	Jolsterpil	34.	Kärrsälting	40.
Gul Näckros	15.	Jordgubbar	26.	Kärrtistel	3.
Guldria	2.	Jordrofa	8.	Kärr-Viol	20.
Guldvisfa	12.	Jordrök	16.	Kärrbärsträd	27.
Gurka	22.	<i>Irideae</i>	38.	<i>Labiatae</i>	7.
Grädsyra	31.	Islandslaf	50.	Lundhafre	46.
Gågräs	26.	<i>Juncaceae</i>	40.	Lappskostarr	43.
Gäddnate	42.	Jungfrubär	25.	<i>Leonticulariaceae</i>	11.
Göklyst	21.	Jungfru Marie Sänghalm	5.	<i>Lichenes</i>	50.
Gökmat	27.	Jungfru Marias hand	38.	Lievarg	11.
Hafre	46.	Jungfrutvål	31.	Lilja, Brandgul	39.
Hafst-sälting	40.	Kafveldun	42.	<i>Liliaceae</i>	39.
Hagtorn	25.	Kalfleka	16.	Liljekonvalje	40.
Hallonbuske	25.	Kalmus	41.	Lin	19.
<i>Haloragaceae</i>	24.	Kamblad	24.	Lind	18.
Hampa	32.	Kamnif	19.	Lingon	29.
Harklöfver	28.	Kardborre	3.	Liten Blålocka	6.
Harsyra	19.	Kastanje, Häst-	14.	Ljung	29.
Hartimjan	8.	Kattfot	2.	<i>Lobeliaceae</i>	6.
Hassel	34.	Kattost	19.	Lommegräs	18.
Hjortron	25.	Kattrumpa	10.	<i>Loranthaceae</i>	5.
Hörnört	32.	Kojsarkrona	39.	Lota	45.
Humle	32.	Kirskål	14.	Luddhafre	46.
Humleklöfver	28.	Klibbnejlika	21.	Luddlosta	45.
Hummelblomster	26.	Klippbräken	48.	Luden Viol	20.
Hundexing	45.	Klint	2, 3.	Lumner	48.
Hundfötter	4.	Kloört	7.	Lundgröe	46.
Hundloka	13.	Klubbavamp	51.	Luzern, Gul	28.
Hundtunga	7.	Klöfver	26, 28.	<i>Lycopodiaceae</i>	48.
Hund-Viol	20.	Knafvel	30.	Lysing	12.
Huslök	23.	Knapptåg	40.	<i>Lythraeae</i>	23.
Hven	47.	Knippetåg	41.	Långbladig Stjernnört	22.
Hvete	45.	Knythafre	46.	Långrofa	18.
Hvita Ärtor	27.	Kohvete	11.	Länko	48.
Hvit Blindnäsala	8.	Korn	45.	Lärkträd	36.
Hvitgröe	46.	Korskål	15.	Lök	23, 39.
Hvit Jungfru Marie Säng-		Korsört	8.	Lönn	14.
halm	5.	Kranselinka	37.	Maj-Veronica	10.
Hvit Knafvel	30.	Krasse	17, 18.	<i>Malvaceae</i>	19.
Hvitlöskrasse	17.	Krepe	3.	Malört	2.
Hvitmossa	49.	Krikonträd	27.	Mannagräs	46.
Hvit Narcissa	38.	Krushärsbuske	23.	Mansblod	20.
Hvit Näckros	15.	Krustistel	3.	Maskros	4.
Hvit Pil	35.	Krustitel	46.	Mattlumner	48.
Hvitsippa	16.	Kryphven	47.	Melon	22.
Hvit Väpling	28.	Krypvide	35.	<i>Menyanthes</i>	8.
<i>Hydrocharideae</i>	38.	Kräkklöfver	26.	Midommarblomster	19.
<i>Hymenomyces</i>	51.	Kräklök	39.	Missne	41.
<i>Hypericineae</i>	20.	Kräkris	30.	Mistel	5.
Härnate	42.	Kräkfarter	27.	Mjukhårig Storknä	3.
Hägg	27.	Kummin	14.	Mjölklomster	4.
Hälleknoppar	23.	Kungsljus	10.	Mjölktistel	3.

Mjölkkört	24.	<i>Potamogetonaceae</i>	42.	Släskämpar	12.
Mjölön	29.	<i>Potates</i>	10.	Slätterblomma	21.
Monko	6.	<i>Prestrage</i>	1.	Smalbladigt Gröblad	12.
Morot	13.	<i>Primulaceae</i>	12.	Smalbladig Ängsull	43.
Mortog	31.	<i>Pyramidpoppel</i>	34.	Sminkrot	7.
Mossyxne	38.	<i>Päronträd</i>	24.	Smultrot	26.
Murggrön	13.	<i>Pölvass</i>	42.	Smånarf	22.
Murkla	52.	<i>Qvesved</i>	9.	Smällor	21.
Murnackel	4.	<i>Qvickhyete</i>	45.	Smörhblomma	15.
Mynta	7.	<i>Ranunculaceae</i>	15.	Snarrefva	6.
<i>Myricaceae</i>	36.	<i>Ranunkel</i>	15.	Snödroppe	38.
Myskmadra	5.	<i>Rast</i>	7.	Snärjgräs	5.
Måbärsbuske	23.	<i>Rofgräs</i>	48.	<i>Solanaceae</i>	9.
Målla	33.	<i>Renfana</i>	2.	Solvifva	15.
Måra	5.	<i>Renlaf</i>	50.	Solvända	20.
Narcissa	38.	<i>Renlota</i>	46.	Sparflins	28.
<i>Narcissineae</i>	38.	<i>Rehrope</i>	45.	Sparria	39.
Narfgräs	21.	<i>Ribesiacae</i>	22.	Spenat	33.
Nato	42.	<i>Riddarsporre</i>	16.	Spergel	22.
Natt och dag	11.	<i>Rofva</i>	17.	<i>Sphagnaceae</i>	49.
Nattviol	38.	<i>Rubiaceae</i>	5.	Sprängört	13.
Nejluka	21.	<i>Rym</i>	17.	Spämanstistel	3.
Nejlikört	26.	<i>Räg</i>	45.	Späd Ängsull	43.
Nolanaber	4.	<i>Rägblomma</i>	18.	Squatram	29.
Notblomster	6.	<i>Räglota (812)</i>	45.	Starr	43.
Nuaneört	16.	<i>Rättavana</i>	15.	Stenbräcka	23.
<i>Nymphaeaceae</i>	14.	<i>Räckenraf</i>	17.	Stenbräken	48.
Nyponbuske	25.	<i>Räffjagras</i>	15.	Stensöta	48.
Nålstarr	44.	<i>Räfflor</i>	28.	Stjernört	22.
Nålsaf	43.	<i>Räfmjolk</i>	30.	Stillfrö	17.
Näckros	15.	<i>Rättika</i>	18.	Stinkande Storknäf	19.
Näf	19.	<i>Rödbeta</i>	38.	Stinknäsla	8.
Näsla	32.	<i>Röd Blindnäsla</i>	8.	Stolt Henrik	33.
Odon	29.	<i>Rödlök</i>	39.	Stor Bläcklocka	6.
<i>Oleaceae</i>	9.	<i>Rödsvingel</i>	45.	Storknäf	19.
Olvon	4.	<i>Röd Vinbärsbuske</i>	23.	Strandaster	2.
<i>Onagraceae</i>	24.	<i>Rödväpling</i>	28.	Strandgrö	46.
<i>Orchideae</i>	37.	<i>Röknäfva</i>	31.	Strandling	12.
Ormbunke	48.	<i>Röksvamp</i>	52.	Strandsvingel	45.
Ormbärsört	40.	<i>Rönn</i>	25.	Strandsyra	31.
Ormgräs	19.	<i>Rör</i>	47.	Sträf Måra	5.
Oxel	25.	<i>Rörflen</i>	47.	Strätta	14.
Oxtunga	7.	<i>Rörhven</i>	47.	Stubbtäg	41.
Oxögön	21.	<i>Salicineae</i>	34.	Styfmorsblomma	20.
Paddfot	7.	<i>Salsofi</i>	3.	Surkulla	2.
Palsternacka	13.	<i>Sandling</i>	22.	Svalting	40.
<i>Papaveraceae</i>	16.	<i>Saxifrageae</i>	23.	Svalört	16.
<i>Papilionaceae</i>	27.	<i>Selleri</i>	14.	Svartpoppel	34.
<i>Paronychiaceae</i>	30.	<i>Senticosae</i>	25.	Svart Vinbärsbuske	23.
Penninggräs	18.	<i>Silenaceae</i>	21.	Svingel	45.
Pepparrot	18.	<i>Sippa</i>	16.	Svinknyler	8.
Persilja	14.	<i>Skallergräs</i>	11.	Svinmålla	33.
<i>Personatae</i>	10.	<i>Skogsbräken</i>	48.	Svinsyra	31.
Pil	34, 35.	<i>Skogsfräken</i>	37.	Svärdslilja	38.
Pilört	40.	<i>Skogshumle</i>	8.	<i>Synanthereae</i>	1.
Pipphen	47.	<i>Skogslänke</i>	48.	Syra	19, 31.
<i>Plantagineae</i>	12.	<i>Skogsackel</i>	4.	Syrén	9.
Plommonträd	26.	<i>Skogståg</i>	41.	Sif	43.
<i>Polygaleae</i>	18.	<i>Skogs-Viol</i>	20.	Sälg	35.
<i>Polygonaceae</i>	31.	<i>Skogsväpling</i>	28.	Sälting	40.
<i>Polypodiaceae</i>	47.	<i>Skäfte</i>	37.	Sötblomster	1.
<i>Pomaceae</i>	24.	<i>Slidförande Ängsull</i>	43.	Taklota	45.
Poppel	34.	<i>Sloggräs</i>	47.	Takmossa	49.
Pors	36.	<i>Slämbuske</i>	27.	Tall	36.

Tallört	30.	<i>Typiaceae</i>	42.	Vägtistel	3.
Tandvingel	46.	Ullblomster	2.	Väört	30.
The-Veronica	10.	<i>Ulmaceae</i>	32.	Väpling	28.
<i>Thymelaeae</i>	32.	<i>Umbelliferae</i>	13.	Yxne	38.
Tibast	32.	<i>Urticaceae</i>	32.	Älnate	42.
Tiggår-Ranunkel	15.	<i>Valerianaceae</i>	4.	Äkerbär	25.
<i>Ullaceae</i>	18.	Vanlig Stjernört	22.	Äkerfräken	36.
Timjan	8.	Vass	40, 43, 47.	Äkerhven	47.
Timothey	47.	Vattengröna	37.	Äkermönja	25.
Tistel	3.	Vattenklöfver	9.	Äkersenap	17.
Tjärblomster	21.	Vattenkrasse	18.	Äkertistel	3.
Tofsbloster	2.	Vattenlysing	12.	Äker-Vallmo	16.
Tomtört	3.	Vattennäfva	31.	Äker-Veronica	11.
Toppalstrande Väggröna	49.	Vattenranunkel	15.	Äkervinda	6.
Torrvärkgräs	6.	Vekotåg	40.	Äkervädd	4.
Torsklaaf	50.	Vendelört	5.	Älggräs	26.
Trampgräs	31.	Veronica	10, 11.	Ältgräs	15.
Tranbär	29.	Vicker	28.	Ängsgrö	46.
Tranärter	27.	Vido	35.	Ängshafre	46.
Trollbärsört	10.	Vildpersilja	13.	Ängskaffe	47.
Try	6.	Vildsallat	3.	Ängskrasse	17.
Trädtåg	41.	Vildt Lin	19.	Ängslök	39.
Trädgårdsmälla	33.	Vinbärsbuske	23.	Ängsejlika	21.
Träjonbräken	48.	Vintergrön	29, 30.	Ängsruta	15.
Tufstarr	44.	Vinterkrasse	17.	Ängsvingel	45.
Tuftistel	46.	Viol	20.	Ängsaya	31.
Tulkört	9.	<i>Violarieae</i>	20.	Ängsöta	9.
Tulpan	39.	Vårbrodd	47.	Ängsull	43.
Tundericka	51.	Vårfrudagslök	39.	Ängsvädd	4.
Turkiska Bönor	27.	Vår-Veronica	11.	Äppleträd	25.
Tåg	40, 41.	Vägglaaf	50.	Ärenpris	10.
Tåg	51.	Vägmälla	33.	Ärter	27.
Tätel	46.	Vägsenap	17.	Ätlig Pipsvamp	51.
Taschlaaf	50.	Vägsyra	31.	Ögontröst	11.



Pris: 16 skillingar banko.









